

13. přednáška: DŮKAZ VĚTY O JKT

Dodatek k minulé přednášce

Ukáželi jsme si, že u podobnosti matic

$$A = P B P^{-1}$$

plyne podobnost

$$A^n = P B^n P^{-1}$$

Protože e^A a e^B definujeme pomocí maticového řádku, pak odkud plyne také podobnost

$$e^A = P e^B P^{-1}$$

Je-li tedy J Jord. kan. tvar matice A tedy, že

$$A = P J P^{-1}$$

pak řešení soustavy rovnic

$$x'(t) = A x(t)$$

$$x(0) = x_0$$

je funkce $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^n$: $x(t) = e^{At} x_0 = P e^{Jt} P^{-1} x_0$.

Přitom e^{Jt} spočítáme pomocí reálných funkcí $e^{\lambda t}$ a konečného řádku matic.

Věta o JKT: Necht' $\varphi: U \rightarrow U$ je lin. operátor. Předpokládejme, že násobit. alg. nadrovnání jeho vlastních čísel je roven $\dim U$. Potom v U existuje báze α taková, že

$$(\varphi)_{\alpha, \alpha} = J$$

je matice v JKT. Tento tvar je určen jednoznačně,

ač na poradí kniežk.

Úplný dôkaz najdete v učebniciach, materiáloch
v bak. práci Ivany Bacharej, skrátenou
verziou prák v textu pred. Slovníka Lin. algebra
v kapitole 5.

Nové pojmy Nilpotentní operátor : $\exists k \in \mathbb{N} \quad \varphi^k = 0$.

Koreňový podprostor skalárneho čísla λ lineárneho
operátora $\varphi : U \rightarrow U$ je vektorový podprostor

$$R_\lambda = \{ u \in U, \exists k \in \mathbb{N}, (\varphi - \lambda \text{id})^k(u) = 0 \}$$

Matkovičovi novéto podprostorom

- ① R_λ je vektorový podprostor, keď $(\varphi - \lambda \text{id}) \in R_\lambda$.
- ② R_λ je invariantní vůči každému lineárnímu
mu operátoru $\psi : U \rightarrow U$, který komutuje
s φ . Speciálně je invariantní vůči
 $\varphi - \lambda \text{id}$
- ③ Je-li $\lambda \neq \mu$, pak $(\varphi - \mu \text{id})|_{R_\lambda} : R_\lambda \rightarrow R_\lambda$
je izomorfismus.
- ④ $(\varphi - \lambda \text{id})|_{R_\lambda} : R_\lambda \rightarrow R_\lambda$ je nilpotentní.

Důkaz: ② Necht' $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$, necht' $v \in R_\lambda$, kde $(\varphi - \lambda \text{id})^k(v) = 0$. Pak

$$(\varphi - \lambda \text{id})^k(\psi(v)) = \psi(\varphi - \lambda \text{id})^k(v) = \psi(0) = 0$$

Tedy $\psi(v) \in R_\lambda$.

③ Necht' $v \in R_\lambda$ je liché, ať $(\varphi - \lambda \text{id})^{k-1}(v) \neq 0$ a $(\varphi - \lambda \text{id})^k(v) = 0$. Pak

$$(\varphi - \mu \text{id})(v) = (\varphi - \lambda \text{id})(v) + (\lambda - \mu)(v).$$

Když $(\varphi - \mu \text{id})(v) = 0$, pak by $(\varphi - \lambda \text{id})v = (\mu - \lambda)v$

$$\begin{aligned} (\varphi - \lambda \text{id})^k(v) &= (\varphi - \lambda \text{id})^{k-1}(\varphi - \lambda \text{id})(v) = (\varphi - \lambda \text{id})^{k-1}(\mu - \lambda)v \\ &= (\mu - \lambda)(\varphi - \lambda \text{id})^{k-1}(v) \neq \vec{0}, \text{ spor.} \end{aligned}$$

④ R_λ má konečnou dimenzi, je tedy generováno prvky v_1, \dots, v_s lichémi, ať

$$(\varphi - \lambda \text{id})^{k_i}(v_i) = 0.$$

Položme $k = \max\{k_1, k_2, \dots, k_s\}$. Pak pro nějakou $v \in R_\lambda$ je $v = \sum_{i=1}^s a_i v_i$

$$\text{a } (\varphi - \lambda \text{id})^k(v) = \sum_{i=1}^s a_i (\varphi - \lambda \text{id})^k(v_i) = \sum_{i=1}^s a_i \vec{0} = \vec{0}.$$

Příklad: Necht' $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(x) = Jx$,
kde $\lambda_1 \neq \lambda_2$ a

$$J = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \lambda_1 & & \\ & & & & \lambda_2 & 1 \\ & & & & 0 & \lambda_2 \\ & & & & & & \lambda_2 \end{array} \right)$$

$$R_{\lambda_1} = [e_1, e_2, e_3, e_4]$$

$$R_{\lambda_2} = [e_5, e_6, e_7]$$

Důkaz věty o JKT má dva kroky

1. krok

Věta: Ze předpokladů Jordanovy věty

je

$$U = R_{\lambda_1} \oplus R_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}$$

a

$$\dim R_{\lambda_i} = \text{alg. násobnost vlastního čísla } \lambda_i$$

Důležité počítat více podprostorů

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k = \{ v_1 + v_2 + \dots + v_k \in U, v_i \in V_i \}$$

Součet je direktní (píšeme $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k$),
jenkolineární platí $\forall v_i \in V_i$:

$$v_1 + v_2 + \dots + v_k = \vec{0} \Rightarrow v_1 = v_2 = \dots = v_k = \vec{0}.$$

Dákov, se sačet R_{λ_i} je direktní, indukcií podle k (sačet R_{λ_i}).

Pro $k=1$ saejme. Nechtí $R_{\lambda_1} + \dots + R_{\lambda_{k-1}}$ je direktní. Nesmeeme

$$v_i \in V_i, \quad 1 \leq i \leq k$$

a nechtí

$$(*) \quad v_1 + v_2 + \dots + v_k = \vec{0}$$

Aplikujeme na tuto rovnici operátor

$$(\varphi - \lambda_k \text{id})^k$$

salonj, aě $(\varphi - \lambda_k \text{id})^k v_k = \vec{0}$. Podle

$$\underbrace{(\varphi - \lambda_k \text{id})^k (v_1)}_{u_1 \in R_{\lambda_1}} + \dots + \underbrace{(\varphi - \lambda_k \text{id})^k (v_{k-1})}_{u_{k-1} \in R_{\lambda_{k-1}}} = \vec{0}$$

Tedy na sumu $u_1 + u_2 + \dots + u_{k-1} = \vec{0}$, kde $u_i \in R_{\lambda_i}$ aplikujeme ind. předpoklad a dostaneme

$$u_1 = u_2 = \dots = u_{k-1} = \vec{0}$$

Podle $(\varphi - \lambda_k \text{id})^k$ je izomorfiismus na

podprostor R_{λ_i} , $1 \leq i \leq k-1$, je rovní

$$v_1 = v_2 = \dots = v_{k-1} = \vec{0}$$

a odtud $v_k = \vec{0}$. Dokázali jsme, se sačet $R_{\lambda_1} + \dots + R_{\lambda_k}$ je direktní.

Díkas, než sačítat $R_{\lambda_1} + \dots + R_{\lambda_k} = U$ se de la' pomocí věty:

Pomočná věta: Za předpokladu^o Jordana věty existuje v U báze B taková, že

$$(\varphi)_{B,B} = \begin{pmatrix} T_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & T_1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & T_2 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & T_k \end{pmatrix} \quad *$$

je lamí kvadrátní matice.

jei dešas je relativně na pojmu kvocient vektorový prostor (viz v algebre pojmu faktorená grupa). Pouse naznačíme.

Nechť U je vekt. prostor a $V \subseteq U$ jeho podprostor.
Nechť $\varphi: U \rightarrow U$ je lin. operator a V je jeho invariantní podprostor. Definujeme

(1) vektorový prostor $U/V = \{u+V, u \in U\}$ množina podmnožin

s operacemi

$$(u_1+V) + (u_2+V) := (u_1+u_2)+V$$

$$a(u+V) := au+V$$

(2) Lineární operátor $\tilde{\varphi}: U/V \rightarrow U/V$

$$\tilde{\varphi}(u+V) = \varphi(u) + V.$$

Důkaz pomocí věty: Indukcí podle $\dim U = n$.

Necht věta platí pro operátory dimenze $\leq n-1$.

Pro $n=1$ evidentně platí.

Necht $\varphi: U \rightarrow U$. φ má vlastní číslo λ_1
a vlastní m. vektor v_1 . Položíme
 $V = [v_1]$, $\tilde{\varphi}: U/V \rightarrow U/V$.

$U/V = U/[v_1]$ má dimenzi $n-1$

Necht $\gamma = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ je nějaká báze
prostoru U . Pak

$$(\varphi)_{\gamma, \gamma} = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & D \\ \hline 0 & \\ 0 & \\ \vdots & \\ 0 & C \end{array} \right)$$

Char. polynom φ je roven $(\lambda_1 - \lambda)^n$ del $(C - \lambda E)$.

Dále $\tilde{\varphi}$ má n bází

$$\tilde{\gamma} = (u_2 + V, u_3 + V, \dots, u_n + V)$$

matici

$$(\tilde{\varphi})_{\tilde{\gamma}, \tilde{\gamma}} = C.$$

Proto del $(C - \lambda E)$ má rucel alg. ne'obratní
hořimů roven $n-1$. Na $\tilde{\varphi}: U/V \rightarrow U/V$
můžeme aplikovat indukční předpoklad.

Proba existuje báre maticu $U|V$

$$\tilde{\beta} = (N_2 + V, N_3 + V, \dots, N_m + V)$$

kalomá, $\tilde{\alpha}$

$$(\tilde{\varphi})_{\tilde{\beta}, \tilde{\beta}} = \begin{pmatrix} \lambda_{i_2} & & & * \\ & \lambda_{i_3} & & \\ & & \dots & \\ 0 & & & \lambda_{i_m} \end{pmatrix}$$

Paž $\beta = (N_1, N_2, \dots, N_m)$ je báre maticu U a plati

$$(\varphi)_{\beta, \beta} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \dots & \\ 0 & & & \lambda_{i_m} \end{pmatrix}.$$

Důkaz, že $R_{\lambda_1} + \dots + R_{\lambda_k} = U$. Především musí být, že $\begin{pmatrix} 0 & // & // & // \\ & \lambda & & \\ & & // & // \\ & & & 0 \end{pmatrix}^a = 0$.

$\dim R_{\lambda_i} =$ počet λ_i na diagonále = alq. ná's. λ_i .

$$\begin{aligned} \text{Proba } \dim (R_{\lambda_1} \oplus R_{\lambda_2} \dots \oplus R_{\lambda_k}) &= \sum_{i=1}^k \dim R_{\lambda_i} \\ &= \sum_{i=1}^k \text{alq. ná's. } \lambda_i = n. \end{aligned}$$

Tedy
a
Proba

$$\begin{aligned} R_{\lambda_1} \oplus R_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k} &\subseteq U \\ \dim (R_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k}) &= \dim U. \end{aligned}$$

$$R_{\lambda_1} \oplus R_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus R_{\lambda_k} = U.$$

2. krok

Budeme se zabývat pouze operátorem φ - λ_i id na R_{λ_i} . Označíme

platí, že $\psi = \varphi - \lambda_i \text{id}$, $R_{\lambda_i} = V$.

po vhodné λ , tedy $\psi^2 = 0$ je nilpotentní.

Cyklický operátor

Operátor $\psi: V \rightarrow V$ je cyklický, pokud existuje báze $B = (v_1, v_2, \dots, v_s)$ prostou V taková, že

$$\psi(v_1) = \vec{0}, \quad \psi(v_2) = v_1, \quad \psi(v_3) = v_2, \quad \dots, \quad \psi(v_s) = v_{s-1}$$

(v_1, v_2, \dots, v_s je řada keřec se vl. čísla 0!).

Speciálně, každý cyklický operátor je nilpotentní!

Věta: Nechtě $\psi: V \rightarrow V$ je nilpotentní. Pak existuje rozklad prostou V na direktní součet invariantních podprostorů

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_p$$

takový, že $\psi|_{V_i}$ je cyklický.

V každém V_i vezmeme příslušnou cyklickou bázi. Dokončady d'rají bázi B a platí

$$(\varphi)_{\beta, \beta} = \begin{pmatrix} J_{k_1}(0) & & & \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \dots & \\ & & & J_{k_p}(0) \end{pmatrix}$$

Důkaz existenci vlastní vlny a JKT pomocí předchozí vlny:

Platí, že v \mathbb{R}^n máme vlnu β_i a

$$(\varphi - \lambda_i \text{id})_{\beta_i, \beta_i} = \begin{pmatrix} J_{k_1}(0) & & & \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \dots & \\ & & & J_{k_p}(0) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Polo} \quad (\varphi)_{\beta_i, \beta_i} &= (\varphi - \lambda_i \text{id})_{\beta_i, \beta_i} + (\lambda_i \text{id})_{\beta_i, \beta_i} \\ &= \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_i) & & & \\ & J_{k_2}(\lambda_i) & & \\ & & \dots & \\ & & & J_{k_p}(\lambda_i) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Uděláme-li to pro všechny koreňové hodnoty, dostaneme vlnu

$$\alpha = (\beta_{11}, \beta_{21}, \dots, \beta_n) \quad \text{a} \quad (\varphi)_{\alpha, \alpha} = J \text{ v } JKT.$$

Důkaz věty o nulovém derivátu

• Nechť $\psi^s = 0$ na V .

$$0 = \text{im } \psi^s \subseteq \text{im } \psi^{s-1} \subseteq \dots \subseteq \text{im } \psi^2 \subseteq \text{im } \psi \subseteq \text{im id} = V$$

$$0 = P_s \subseteq P_{s-1} \subseteq P_2 \subseteq P_1 \subseteq P_0$$

Nikde nenastane rovnost ! a $P_{i+1} = P_i \neq 0$
plyne $P_s = P_{s-1} = \dots = P_{i+1} = P_i \neq 0$.

• Vyberme bázi P_{s-1} $e_1^{s-1}, e_2^{s-1}, \dots, e_{l_1}^{s-1}$

jejich obrazy u ψ jsou nulové. Vezmeme
vektory $e_1^{s-2}, e_2^{s-2}, \dots, e_{l_1}^{s-2}$ báze, se

$$\psi(e_i^{s-2}) = e_i^{s-1}$$

Není třeba dále, se
 $e_1^{s-1}, e_2^{s-1}, \dots, e_{l_1}^{s-1}, e_1^{s-2}, e_2^{s-2}, \dots, e_{l_1}^{s-2}$

jeou lineárně nezávislé. Doplňme je na
bázi celého P_{s-2} vektory
 $\bar{e}_{l_1+1}^{s-2}, \bar{e}_{l_1+2}^{s-2}, \dots, \bar{e}_{l_2}^{s-2}$


platí $\psi(\bar{e}_j^{s-2}) = \sum_i a_i e_i^{s-1}$. Když
uděláme modifikaci

$$e_j^{s-2} = \bar{e}_j^{s-2} - \sum_i a_i e_i^{s-1}$$

dostaneme novou bázi P_{s-2}

$l_1^{s-1} \dots l_{l_1}^{s-1}, l_1^{s-2} \dots l_{l_1}^{s-2}, l_{l_1+1}^{s-2} \dots l_{l_2}^{s-2}$
 laloru, re $\psi(l_j^{s-2}) = \vec{0} \quad l_i+1 \leq j \leq l_2.$

(Nem' te'ile' to doba'at!) Takto pducime dale. Dokazame baze perou $P_{s-1}, P_{s-2}, P_{s-3}, \dots$



$$V_1 = [l_1^0, l_1^1, \dots, l_1^{s-1}] \text{ ad}$$

Tim dokazeme sklad na podmatery V_i na nich' je qerata ψ cyklichy.

Jednanačnat JKT.

Skáí' ulá'rat, že počet kuzích, velikosti q po vlastní úšle λ nesá'risí na nábe' báze v R_λ .

Podí'nejme se na tabulku na předchozí straně:

Počet kuzích velikosti s je $l_1 = \dim P_{s-1}$
 $= \dim \text{Im } \psi^{s-1}$

Počet kuzích velikosti $s-1$ je $l_2 - l_1 =$
 $= \dim P_{s-2} - 2 \dim P_{s-1}$

Počet kuzích velikosti $s-2$ je $l_3 - l_2 =$
 $= \dim P_{s-3} - 2 \dim P_{s-2} + \dim P_{s-1}$

Přítom $\dim P_{s-i} = \dim \text{Im } \psi^{s-i}$ se'niní pouze na ψ .