

Aplikace Riemannova integrálu

Hlavně geometrické

Petr Liška

Masarykova univerzita

26.03.2024

Geometrické aplikace v \mathbb{R}^2

Definice

Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je nezáporná funkce, kde $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. *Podgrafem* funkce f na intervalu $[a, b]$ rozumíme množinu

$$S(f; a, b) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\} .$$

Věta

Nechť $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je nezáporná a integrovatelná funkce. Obsah S podgrafu funkce f je dán určitým integrálem

$$S = \int_a^b f(x) dx .$$

Věta

Nechť je funkce f integrovatelná na intervalu $[a, b]$. Obsah plochy ohraničené grafem funkce f , přímkami $x = a$, $x = b$ a osou x je dán určitým integrálem

$$S = \int_a^b |f(x)| dx .$$

Věta

Nechť funkce f a g jsou integrovatelné na intervalu $[a, b]$. Obsah plochy ohraničené grafy funkcí f , g a přímkami $x = a$, $x = b$ je dán určitým integrálem

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx .$$

Věta

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$ se spojitou derivací f' na intervalu (a, b) . Potom délka l grafu funkce f na intervalu $[a, b]$ je dána určitým integrálem

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx .$$

Geometrické aplikace v \mathbb{R}^3

Věta

Nechť funkce f je spojitá a nezáporná na intervalu $[a, b]$. Pak objem tělesa v \mathbb{R}^3 , které vznikne rotací podgrafu funkce f kolem osy x , je dán určitým integrálem

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) \, dx .$$

Věta

Nechť je funkce f spojitá a nezáporná pro $x \in [a, b]$, kde $0 \leq a$. Pak objem tělesa v \mathbb{R}^3 , které vznikne rotací podgrafu funkce f kolem osy y , je dán určitým integrálem

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) \, dx .$$

Objem i pro nekulatá tělesa - naivní přístup

Nechť T je těleso v \mathbb{R}^3 , které leží mezi rovinami $x = a$ a $x = b$. Nechť $A(x)$ je obsah řezu tělesa T rovinou, která je kolmá na osu x . Je-li $A(x)$ spojitá funkce, potom objem tělesa T je

$$V = \lim_{\nu(D) \rightarrow 0} i(D, A, V) = \int_a^b A(x) dx .$$

Věta

Nechť f je nezáporná funkce mající spojitou derivaci na intervalu $[a, b]$. Pak obsah pláště tělesa v \mathbb{R}^3 , které vznikne rotací podgrafu funkce f kolem osy x , je dán určitým integrálem

$$S_{pl} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx .$$

Pappova-Guldinova věta

Věta

Nechť \mathcal{R} je část roviny o obsahu A , která leží celá v jedné polorovině určené přímkou l . Objem tělesa, které vznikne rotací množiny \mathcal{R} kolem přímky l , je roven součinu obsahu A a vzdálenosti d , kterou urazí těžiště množiny \mathcal{R} .

Ještě jednou a parametricky

Nyní budeme místo funkce f a jejího grafu uvažovat tzv. *křivku zadanou parametricky* rovnicemi

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]. \quad (1)$$

Věta

Mějme křivku zadanou parametricky rovnicemi (1), přičemž φ a ψ jsou spojitě diferencovatelné a platí $\varphi'(t) \neq 0$ pro všechna $t \in (\alpha, \beta)$. Potom obsah plochy vymezené zadanou křivkou, přímkami $x = \varphi(\alpha)$, $x = \varphi(\beta)$ a osou x je dán určitým integrálem

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) |\varphi'(t)| dt.$$

Věta

Nechť C je křivka s parametrizací (1). Mají-li funkce $\varphi(t)$ a $\psi(t)$ spojitou derivaci na intervalu $[\alpha, \beta]$, má křivka konečnou délku a platí

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

Věta

Nechť je rovinná křivka daná rovnicemi (1), přičemž φ a ψ jsou spojitě diferencovatelné a platí $\psi(t) \neq 0$ pro všechna $t \in [\alpha, \beta]$. Pak objem, resp. obsah pláště, tělesa v \mathbb{R}^3 , které vznikne rotací plochy ohraničené danou křivkou a přímkami $x = \varphi(\alpha)$, $x = \varphi(\beta)$ kolem osy x je dán určitým integrálem

$$V = \pi \int_{\alpha}^{\beta} \psi^2(t) |\varphi'(t)| dt, \quad \text{resp.} \quad S_{pl} = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$$