

7. HODNOST MATICE, INVERZNÍ MATICE A ZMĚNA BÁZE

Jan Paseka

Masarykova Univerzita Brno

Abstrakt přednášky

V této kapitole zavedeme pojem ***inverzní matice*** k dané čtvercové matici a dáme jej do souvislosti s pojmem inverzního lineárního zobrazení.

Dále se naučíme počítat inverzní matice a matice přechodu z jedné souřadné báze do druhé.

Nakonec prozkoumáme vliv změny báze na matici lineárního zobrazení.

Přednáška začne pojmem ***hodnosti matice***, který nám umožní rozhodnout o existenci inverzní matice.

V celé kapitole K označuje pevné těleso, m, n, p jsou kladná celá čísla.

Obsah přednášky

Obsah

7	Hodnost matice a inverzní matice	4
7.1	Hodnost matice	4
7.2	Inverzní matice	12
7.3	Realizace ERO a ESO	16
7.4	Výpočet inverzní matice	19
7.5	Matice přechodu	26
7.6	Mat. lin. zobr. vzhl. na různé báze	34

Hodnost matice I

7 Hodnost matice, inverzní matice a změna báze

7.1 Hodnost matice

V této části je potřebné rozlišovat mezi vektorovými prostory řádkových resp. sloupcových vektorů. Prostor řádkových vektorů budeme značit $K^{1 \times n}$ a prostor sloupcových vektorů $K^{n \times 1}$.

Hodnost matice II

$\mathbf{r}_i(\mathbf{A}) \in K^{1 \times n}$ označuje i -tý řádek a
 $\mathbf{s}_j(\mathbf{A}) \in K^{m \times 1}$ j -tý sloupec matice $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$.
Tuto matici můžeme zapsat blokově jako

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1(\mathbf{A}) \\ \mathbf{r}_2(\mathbf{A}) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m(\mathbf{A}) \end{pmatrix} = (\mathbf{s}_1(\mathbf{A}), \mathbf{s}_2(\mathbf{A}), \dots, \mathbf{s}_n(\mathbf{A})).$$

Hodnost matice III

Řádkovou hodností $h_r(\mathbf{A})$ matice \mathbf{A} nazýváme dimenzi lineárního podprostoru vektorového prostoru $K^{1 \times n}$ generovaného řádky matice \mathbf{A} .

Podobně, **sloupcovou hodností** $h_s(\mathbf{A})$ matice \mathbf{A} nazýváme dimenzi lineárního podprostoru vektorového prostoru $K^{m \times 1}$ generovaného sloupci matice \mathbf{A} . Tedy

$$h_r(\mathbf{A}) = \dim[\mathbf{r}_1(\mathbf{A}), \mathbf{r}_2(\mathbf{A}), \dots, \mathbf{r}_m(\mathbf{A})],$$

$$h_s(\mathbf{A}) = \dim[\mathbf{s}_1(\mathbf{A}), \mathbf{s}_2(\mathbf{A}), \dots, \mathbf{s}_n(\mathbf{A})].$$

Hodnost matice IV

Označme $\varphi : K^{n \times 1} \rightarrow K^{m \times 1}$ lineární zobrazení dané předpisem $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ pro $\mathbf{x} \in K^{n \times 1}$.

Hodností lineárního zobrazení φ nazýváme dimenzi jeho obrazu, t. j. $h(\varphi) = \dim \operatorname{Im} \varphi$.

Zřejmě platí $h(\varphi) = h_s(\mathbf{A})$, protože lineární podprostor $\operatorname{Im} \varphi \subseteq K^{m \times 1}$ je generovaný sloupci matice \mathbf{A} .

Hodnost matice V

Lemma 7.1.1 *Necht' $A \in K^{m \times n}$.*

(a) *Necht' matice B vznikne z matice A provedením jedné elementární řádkové operace (ERO). Pak*

$$[\mathbf{r}_1(\mathbf{A}), \mathbf{r}_2(\mathbf{A}), \dots, \mathbf{r}_m(\mathbf{A})] = [\mathbf{r}_1(\mathbf{B}), \mathbf{r}_2(\mathbf{B}), \dots, \mathbf{r}_m(\mathbf{B})].$$

(b) *Necht' matice C vznikne z matice A vykonáním jedné elementární sloupcové operace (ESO). Pak*

$$[\mathbf{s}_1(\mathbf{A}), \mathbf{s}_2(\mathbf{A}), \dots, \mathbf{s}_n(\mathbf{A})] = [\mathbf{s}_1(\mathbf{C}), \mathbf{s}_2(\mathbf{C}), \dots, \mathbf{s}_n(\mathbf{C})].$$

Hodnost matice VI

Tvrzení 7.1.2 Pro každou matici $\mathbf{A} \in K^{m \times n}$ platí $h_r(\mathbf{A}) = h_s(\mathbf{A})$.

Společnou hodnotu řádkové a sloupcové hodnoty budeme nyní značit $h(\mathbf{A})$ a nazývat **hodností matice** \mathbf{A} . Zřejmě pro $\mathbf{A} \in K^{m \times n}$ je $h(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$.

Tvrzení 7.1.3 Necht' $\mathbf{A} \in K^{m \times n}$. Potom $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A}^T)$.

Hodnost matice VII

Tvrzení 7.1.4 *Nechť $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n \in K^{m \times 1}$ jsou libovolné vektory a $\mathbf{A} \in K^{m \times n}$ je matice taková, že $s_j(\mathbf{A}) = \mathbf{u}_j$ pro $1 \leq j \leq n$. Potom*

- (a) $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ jsou lineárně nezávislé právě tehdy, když $h(\mathbf{A}) = n$;
- (b) $[\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n] = K^{m \times 1}$ právě tehdy, když $h(\mathbf{A}) = m$.

Případ (a) může nastat tehdy, když $n \leq m$; naopak, (b) může nastat jedině za předpokladu $m \leq n$.

Hodnost matice VIII

Tvrzení 7.1.5 *Necht' $\mathbf{A} \in K^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in K^{n \times p}$.
Potom*

$$h(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \leq \min(h(\mathbf{A}), h(\mathbf{B})).$$

Inverzní matice I

7.2 Inverzní matice a inverzní lineární zobrazení

Nechť $A \in K^{n \times n}$, t. j. A je **čtvercová** matice typu $n \times n$. **Inverzní maticí** k matici A rozumíme matici $B \in K^{n \times n}$ tak, že

$$A \cdot B = I_n = B \cdot A.$$

Zřejmě k dané čtvercové matici A existuje nanejvýš jedna inverzní matice. Tuto matici (pokud existuje) budeme značit A^{-1} .

Inverzní matice II

Věta 7.2.1 *Nechť U, V jsou vektorové prostory nad tělesem K a $\dim U = \dim V = n$. Nechť dále α, β jsou nějaké báze v U , resp. ve V a $\mathbf{A} = (\varphi)_{\alpha, \beta}$ je matice lineárního zobrazení $\varphi : V \rightarrow U$ vzhledem na báze β, α . Potom k matici \mathbf{A} existuje inverzní matice \mathbf{A}^{-1} právě tehdy, když k zobrazení φ existuje inverzní zobrazení φ^{-1} . V tomto případě \mathbf{A}^{-1} je maticí lineárního zobrazení $\varphi^{-1} : U \rightarrow V$ vzhledem na báze α, β , t. j.*

$$\mathbf{A}^{-1} = ((\varphi)_{\alpha, \beta})^{-1} = (\varphi^{-1})_{\beta, \alpha}.$$

Inverzní matice III

Říkáme, že čtvercová matice $A \in K^{n \times n}$ je **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice A^{-1} ; v opačném případě A je **singulární**.

Věta 7.2.2 Matice $A \in K^{n \times n}$ je regulární právě tehdy, když $h(A) = n$.

Věta 7.2.3 Pro libovolné $A, B \in K^{n \times n}$ platí $A \cdot B = I_n$ právě tehdy, když $B \cdot A = I_n$.

Inverzní matice IV

Tvrzení 7.2.4 *Necht' $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in K^{n \times n}$ jsou regulární matice. Potom i matice \mathbf{A}^{-1} , $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ a \mathbf{A}^T jsou regulární a platí:*

$$(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}, (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1}, (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$$

Realizace ERO a ESO I

7.3 Realizace ERO a ESO pomocí násobení matic

Tvrzení 7.3.1 *Nechť $A \in K^{m \times n}$.*

- (a) *Nechť $B \in K^{m \times n}$ vznikne z A provedením jedné ERO. Označme E matici, která vznikne z matice I_m provedením stejné ERO. Potom $B = E \cdot A$.*

Realizace ERO a ESO II

(b) *Nechť $C \in K^{m \times n}$ vznikne z A provedením jedné ESO. Označme F matici, která vznikne z matice I_n provedením stejné ESO. Potom $C = A \cdot F$.*

Realizace ERO a ESO III

Čtvercové matice $E \in K^{n \times n}$, které vzniknou z jednotkové matice I_n provedením jediné ERO nebo ESO, nazýváme ***elementární matice***.

Libovolnou ERO (ESO) na matici A můžeme realizovat vynásobením matice A vhodnou elementární maticí E (F) zleva (zprava).

Výpočet inverzní matice I

7.4 Výpočet inverzní matice

Návod na výpočet inverzní matice k dané čtvercové matici $A \in K^{n \times n}$:

$$(A \mid I_n) \xrightarrow{\text{ERO}} (I_n \mid A^{-1}).$$

Tvrzení 7.4.1 *Nechť $A \in K^{n \times n}$ a $E_1, E_2, \dots, E_k \in K^{n \times n}$ jsou elementární matice tak, že $E_k \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = I_n$. Potom $A^{-1} = E_k \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1$.*

Výpočet inverzní matice II

K stejnému cíli vede též postup reprezentovaný schématem:

$$\left(\begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \hline \mathbf{I}_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{ESO}} \left(\begin{array}{c} \mathbf{I}_n \\ \hline \mathbf{A}^{-1} \end{array} \right).$$

Tvrzení 7.4.2 *Matice $\mathbf{A} \in K^{n \times n}$ je regulární právě tehdy, když ji můžeme rozložit na součin $\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \dots \cdot \mathbf{E}_k$ konečného počtu elementárních matic $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_k \in K^{n \times n}$.*

Výpočet inverzní matice III

Tvrzení 7.4.3 *Pro libovolné $A, B \in K^{m \times n}$ platí:*

- (a) *A je řádkově ekvivalentní s B právě tehdy, když existuje regulární matice $P \in K^{m \times m}$ tak, že $A = P \cdot B$;*
- (b) *A je sloupcově ekvivalentní s B právě tehdy, když existuje regulární matice $Q \in K^{n \times n}$ tak, že $A = B \cdot Q$.*

Výpočet inverzní matice IV

Tvrzení 7.4.4 *Nechť $A \in K^{m \times n}$, $P \in K^{m \times m}$, $Q \in K^{n \times n}$, přičemž P , Q jsou regulární matice. Potom*

$$h(A) = h(P \cdot A) = h(A \cdot Q) = h(P \cdot A \cdot Q).$$

Výpočet inverzní matice V

Násobení libovolné matice vhodného rozměru maticí A^{-1} (pokud existuje) zleva resp. zprava

Bud' $A \in K^{n \times n}$ regulární a $B \in K^{n \times m}$, $C \in K^{m \times n}$ libovolné. Pak

$$(A \mid B) \xrightarrow{\text{ERO}} (I_n \mid A^{-1} \cdot B)$$

a

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ESO}} \begin{pmatrix} I_n \\ C \cdot A^{-1} \end{pmatrix}.$$

Výpočet inverzní matice VI

Řešení soustavy lineárních rovnic

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) \xrightarrow{\text{ERO}} (\mathbf{B} \mid \mathbf{c}),$$

které má pro regulární $\mathbf{A} \in K^{n \times n}$ tvar

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) \xrightarrow{\text{ERO}} (\mathbf{I}_n \mid \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}).$$

Výpočet inverzní matice VII

Tvrzení 7.4.5 *Necht' $A \in K^{n \times n}$, $b \in K^n$. Je-li A regulární, tak soustava $A \cdot x = b$ má jediné řešení $x = A^{-1} \cdot b$.*

Maticе přechodu I

7.5 Maticе přechodu

Nechť V je vektorový prostor nad tělesem K a $\alpha = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$, $\beta = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ jsou jeho dvě báze.

Maticí přechodu z báze β do báze α nazýváme matici identického zobrazení $\text{id}_V : V \rightarrow V$ vzhledem na bázi β, α , kterou značíme $P_{\alpha, \beta}$.

Tedy

$$P_{\alpha, \beta} = (\text{id}_V)_{\alpha, \beta}.$$

Matice přechodu II

Sloupce matice přechodu $\mathbf{P}_{\alpha,\beta}$ jsou tvořeny souřadnicemi vektorů báze β vzhledem na bázi α , t. j. $s_j(\mathbf{P}_{\alpha,\beta}) = (\mathbf{v}_j)_\alpha$ pro $1 \leq j \leq n$.

Tedy

$$\mathbf{P}_{\alpha,\beta} = ((\mathbf{v}_1)_\alpha, (\mathbf{v}_2)_\alpha, \dots, (\mathbf{v}_n)_\alpha),$$

a tato matice je jednoznačně určena podmínkou transformace souřadnic

$$(\mathbf{x})_\alpha = \mathbf{P}_{\alpha,\beta} \cdot (\mathbf{x})_\beta$$

pro libovolné $\mathbf{x} \in V$.

Maticе přechodu III

Pokud do rovnosti $\mathbf{x} = \boldsymbol{\alpha} \cdot (\mathbf{x})_{\boldsymbol{\alpha}}$ budeme za \mathbf{x} postupně dosazovat vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ bázi $\boldsymbol{\beta}$, s využitím vztahu pro sloupce součinu matic dostaneme

$$\mathbf{v}_j = \boldsymbol{\alpha} \cdot (\mathbf{v}_j)_{\boldsymbol{\alpha}} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{s}_j(\mathbf{P}_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}}) = \mathbf{s}_j(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P}_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}})$$

pro každé $1 \leq j \leq n$. Tedy

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P}_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta}.$$

Maticе přechodu IV

Tvrzení 7.5.1 *Nechť α, β jsou báze n -rozměrného vektorového prostoru V nad tělesem K . Potom pro libovolnou matici $P \in K^{n \times n}$ jsou následující podmínky ekvivalentní:*

- (i) $P = (\text{id}_V)_{\alpha, \beta}$, t. j. P je matice přechodu z báze β do báze α ;
- (ii) $(\mathbf{x})_{\alpha} = P \cdot (\mathbf{x})_{\beta}$ pro každé $\mathbf{x} \in V$;
- (iii) $\alpha \cdot P = \beta$.

Matice přechodu V

Tvrzení 7.5.2 *Necht' α, β, γ jsou báze konečně rozměrného vektorového prostoru V nad tělesem K . Potom*

$$\begin{aligned} P_{\alpha,\alpha} &= I_n, & P_{\beta,\alpha} &= P_{\alpha,\beta}^{-1}, \\ P_{\alpha,\beta} \cdot P_{\beta,\gamma} &= P_{\alpha,\gamma}. \end{aligned}$$

Z druhé z uvedených podmínek vidíme, že matice přechodu $P_{\alpha,\beta}$ je vždy **regulární**.

Naopak, každá regulární matice $P \in K^{n \times n}$ je maticí přechodu mezi vhodnou dvojicí bazí.

Maticе přechodu VI

Tvrzení 7.5.3 *Nechť V je n -rozměrný vektorový prostor nad K a $\mathbf{P} \in K^{n \times n}$ je libovolná regulární matice. Nechť $\alpha = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ je nějaká báze ve V . Položme $\mathbf{v}_j = \alpha \cdot \mathbf{s}_j(\mathbf{P})$, $\mathbf{w}_j = \alpha \cdot \mathbf{s}_j(\mathbf{P}^{-1})$ pro $1 \leq j \leq n$, a dále*

$$\beta = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \alpha \cdot \mathbf{P}, \quad \gamma = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) = \alpha \cdot \mathbf{P}^{-1}.$$

Potom \mathbf{P} je maticí přechodu z báze β do báze α a zároveň z báze α do báze γ , t. j.

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\alpha, \beta} = \mathbf{P}_{\gamma, \alpha}.$$

Maticie přechodu VII

Speciálně, P je maticí přechodu z báze $(s_1(P), \dots, s_n(P))$ do báze $\varepsilon = (e_1, \dots, e_n)$ v K^n a taktéž z báze ε do báze $(s_1(P^{-1}), \dots, s_n(P^{-1}))$.

Tvrzení 7.5.4 *Nechť $\alpha = (u_1, \dots, u_n)$, $\beta = (v_1, \dots, v_n)$ jsou dvě báze sloupcového vektorového prostoru K^n . Potom $P_{\alpha, \beta} = \alpha^{-1} \cdot \beta$.*

Maticie přechodu VIII

Návod na výpočet matice přechodu pro báze α, β vektorového prostoru K^n

$$(\alpha \mid \beta) \xrightarrow{\text{ERO}} (\mathbf{I}_n \mid \mathbf{P}_{\alpha, \beta}) = (\varepsilon \mid \alpha^{-1} \cdot \beta).$$

MLZ vzhledem na různé báze I

7.6 Matice lineárního zobrazení vzhledem na různé báze

Věta 7.6.1 *Nechť V_1, V_2 jsou konečně rozměrné vektorové prostory nad tělesem K , $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ je lineární zobrazení, α_1, β_1 jsou dvě báze prostoru V_1 a α_2, β_2 jsou dvě báze prostoru V_2 . Potom*

$$(\varphi)_{\beta_2, \beta_1} = \mathbf{P}_{\beta_2, \alpha_2} \cdot (\varphi)_{\alpha_2, \alpha_1} \cdot \mathbf{P}_{\alpha_1, \beta_1}.$$

MLZ vzhledem na různé báze II

Výše uvedenou transformační formuli si můžeme zapamatovat pomocí následujícího diagramu:

$$\begin{array}{ccc} (V_1, \alpha_1) & \xrightarrow{\mathbf{A}} & (V_2, \alpha_2) \\ \uparrow \mathbf{P}_{\alpha_1, \beta_1} & & \downarrow \mathbf{P}_{\beta_2, \alpha_2} \\ (V_1, \beta_1) & \xrightarrow{\mathbf{B}} & (V_2, \beta_2) \end{array}$$

MLZ vzhledem na různé báze III

Příklad 7.6.2 *Nechť $\varphi : K^n \rightarrow K^m$ je lineární zobrazení a α, β jsou nějaké báze prostorů K^m resp. K^n . Označme $\mathbf{A} = (\varphi)_{\alpha, \beta}$, $\mathbf{M} = (\varphi)_{\varepsilon^{(m)}, \varepsilon^{(n)}}$ matice zobrazení φ vzhledem k bazím β, α resp. vzhledem ke kanonickým bazím $\varepsilon^{(n)}, \varepsilon^{(m)}$. Pak platí:*

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}_{\alpha, \varepsilon^{(m)}} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{P}_{\varepsilon^{(n)}, \beta}$$

a

$$\mathbf{M} = \mathbf{P}_{\varepsilon^{(m)}, \alpha} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{P}_{\beta, \varepsilon^{(n)}}.$$

MLZ vzhledem na různé báze III

Pokud ztotožníme každou bázi s regulární maticí, jejíž sloupce jsou vektory této báze, tak výše uvedené rovnosti získají tvar

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}^{-1} \cdot \mathbf{I}_m \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{I}_n^{-1} \cdot \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}^{-1} \cdot \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\beta},$$

a

$$\mathbf{M} = \mathbf{I}_m^{-1} \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\beta}^{-1} \cdot \mathbf{I}_n = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\beta}^{-1}.$$

MLZ vzhledem na různé báze IV

Věta 7.6.3 *Nechť U je m -rozměrný a V je n -rozměrný vektorový prostor nad tělesem K . Potom pro libovolné matice $A, B \in K^{m \times n}$ jsou následující podmínky ekvivalentní:*

- (i) *A, B jsou matice toho stejného lineárního zobrazení $\varphi : V \rightarrow U$ vzhledem na nějaké dvě dvojice bazí prostorů U, V ;*
- (ii) *existují regulární matice $P \in K^{m \times m}$, $Q \in K^{n \times n}$ tak, že $B = P \cdot A \cdot Q$;*
- (iii) *$h(A) = h(B)$.*

MLZ vzhledem na různé báze V

Věta 7.6.4 *Pro každé lineární zobrazení $\varphi : V \rightarrow U$ mezi konečně rozměrnými vektorovými prostory nad tělesem K můžeme zvolit bázi β prostoru V a bázi α prostoru U tak, že φ má vzhledem k bazím β, α matici v blokovém tvaru*

$$(\varphi)_{\alpha, \beta} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_h & \mathbf{0}_{h, n-h} \\ \mathbf{0}_{m-h, h} & \mathbf{0}_{m-h, n-h} \end{pmatrix},$$

kde $n = \dim V$, $m = \dim U$ a $h = h(\varphi)$.