


Fyzická geografie

Zdeněk Máčka

Lekce 10
Biosféra

1. Biosféra



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


- Oživená vrstva
- Biosféra
- Ekologie, biogeografie

Ekosystém

Ekosystém = celek tvořený živými organismy a prostředím ve kterém žijí.

Organismy jsou v ekosystému spojeny jednak mezi sebou navzájem a jednak s prostředím **toky energie** (potrava) a **látek** (např. voda, živiny v půdě).

Třídění ekosystémů




Biomy

- Les
- Savana
- Poušť
- Step
- Tundra

2. Toky látek a energie v ekosystémech


- Energetický zdroj biosféry = **sluneční záření**.
- **Funkční skupiny organizmů v ekosystémech:**
 - Autotrofní organizmy (primární producenti)
 - Heterotrofní organizmy (konzumenti)
 - Herbivorní, karnivorní a omnivorní organizmy
 - Dekompozitoři

Potravní síť



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Energetické ztráty v potravním řetězci




Produktivita ekosystémů

- Biomasa
- Čistá primární produkce

Faktory produktivity ekosystémů:


- Sluneční záření
- Teplota vzduchu a půdy
- Množství srážek

Globální produkce biomasy



3. Organizmy a prostředí

■ Biotop



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Ekologický faktor VODA

■ Suchomilné rostliny:

- xerofyty,
- sklerofyty.

Typy adaptací na nedostatek vody:

- omezení transpirace,
- efektivnější příjem vody,
- krátký životní cyklus.

Ekologický faktor TEPLOTA

- Teplokrevní, studenokrevní živočichové
- Hybernace

Ekologický faktor SVĚTLO

- Jarní efeméry (např. dymnívky, sněženky, bledule)
- Fotoperioda


Ekologický faktor VÍTR

- Vrcholový fenomén
- Vlajkové stromy




Ekologická sukcese

- Primární sukcese
- Sekundární sukcese
- Klimax
- Disturbance ekosystému




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.




Prostorová struktura listnatého lesa mírného pásu



Ekologické faktory rozšíření biomů



Horizontální zonalita a výšková stupňovitost vegetace



Les


- Rovníkový deštný les
- Monzunový les
- Vždyzelený subtropický les
- Sklerofytní les
- Listnatý les mírného pásu
- Jehličnatý boreální les

Rovníkový deštný les

- Klima: vlhké rovníkové klima, monzunové a pasátové pobřežní klima tropického pásma.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


Patrovitost deštného lesa




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Monzunový les

- Klima: střídavě vlhké a suché klima tropů.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


Typy monzunového lesa

- Polo-vždyzelené tropické lesy
- Opadavé tropické lesy



Subtropický vždyzelený les


- Klima: vlhké subtropické klima, mírná zima, dostatek srážek po celý rok.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


Typy subtropického vždyzeleného lesa

- Listnatý
- Jehličnatý



Sklerofytní les


- Klima: středomořské klima, velmi teplé a suché léto a mírná, dešťivá zima.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Typy sklerofytních lesů


- Sklerofytní les
- Sklerofytní řídkolesí
- Sklerofytní křoviny




Copyright A.H. Shroder

Listnatý les mírného pásu

- Klima: mírný humidní pás, vlhké kontinentální klima, oceánské klima západních okrajů kontinentů, střídání ročních období.




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.




Jehličnatý boreální les

- Klima: mírně chladné (boreální) klima, průměrná teplota nejteplejšího měsíce alespoň 10°C , srážky 250 – 750 mm.




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Typy jehličnatého lesa


- Tmavá (smrková) tajga
- Světlá (modřínová) tajga
- Borová tajga
- Horská tajga




Copyright A.H. Strahler

Savana

- Klima: střídavě vlhké a suché klima tropického pásu, popř. subtropů.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Typy savany

- Vlhká savana
- Suchá savana
- Trnitá savana
- Zaplavovaná savana

- Jihoamerické savany:
 - Pantanal
 - Llanos
 - Campos



Jihoamerické savany


PANTANAL




LLANOS



Jihoamerické savany - campos




Fauna savany




Poušt'

- Klima: suché tropické a subtropické klima; S. Amerika a střední Asie – mírný pás; srážky < 250 mm/rok, výpar převyšuje srážky.




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


Typy pouští

- Polopoušť
- Pravá (suchá) poušť



Copyright A.H.Straehler

Pouště




Step

- Klima: suché kontinentální klima, subtropické klima.




Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Typy stepí

- Dlouho-stébelantá step
- Krátko-stébelnatá step



Tundra

- Klima: tundrové klima, žádný měsíc průměrná teplota nad 10°C , vegetační sezóna pouze 2 – 3 měsíce.



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Typy tundry

- Arktická tundra
 - Keříčková
 - Mechová
 - Lišeňíková
- Horská tundra




Fauna tundry



© - lubomir hlasek
www.hlasek.com
Rangifer tarandus 2428




© - lubomir hlasek
www.hlasek.com
Ovibos moschatus 2341



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Lemmus lemmus 4050

Fauna tundry



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Lagopus lagopus 4257