

Fyzická geografie

Zdeněk Máčka

Lekce 8

Ledovcové tvary reliéfu a glaciální období

1. Ledovce

■ Ledovec

■ Geografické rozšíření ledovců:


- pevninské ledovce (ledovcové štíty),
- horské ledovce.

■ Typy ledovcové eroze:

- brázdění (*exarace*),
- obrušování a ohlazování (*deterze*),
- odlamování (*detrakce*).


2. Horské ledovce

Podélňý řez horským ledovcem



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.


Rychlosť tečení ledu



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Reliéf modelovaný horskými ledovci

- Erozní ledovcové tvary:
 - arête,
 - horn.
- Akumulační ledovcové tvary:
 - moréna.
- Třídění morén:
 - boční,
 - střední,
 - koncová (terminální),
 - ústupová,
 - vnitřní,
 - spodní.



Glacigenní uloženiny morén





Ledovcová údolí (trogy)

- Trog
- Visuté údolí
- Pleso
- Fjord



3. Ledovcové štity



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

- Současné ledovcové štity:
 - Antarktický (13 mil. km², 4000 m),
 - Grónský (1,7 mil. km², 3000 m).


4. Mořský led



5. Glaciální období v kvartéru


- Kvartér: počátek – 1,7 mil. let BP (2,5 mil. let BP).
- Glaciály/interglaciály, stadiály/interstadiály.
- Postglaciál: holocén, počátek 10 000 let BP.
- Stratigrafické systémy kvartéru:
 - Alpský: bieber, donau, günz, mindel, riss, würm.
 - Severoevropský: pretegelen, eburon, menap, elster, saale, weichsel.

Rozsah posledního zalednění



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Reliéf vytvořený pevninskými ledovci



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

- Ledovcové ohlazy
- Oblíky
- Ledovcová jezera


Prstovitá ledovcová jezera




Copyright A.N. Strahler

Glacigenní uloženiny

- TILL: spodní moréna (lodgement till).
- Koncová moréna + ústupové morény.



Výplavová rovina



Copyright © John Wiley & Sons, Inc.



Spodní moréna, drumlin



Proglaciální jezera

- Glacilakustrinní uloženiny
- Varvy (páskované jíly)
- Kames



Příčiny glaciálních období

- Poslední 3 mil. let – nejméně 30 chladných klimatických výkyvů.
- Předpokládané příčiny kvartérního ochlazení klimatu:
 - změna uspořádání kontinentů,
 - zvýšení intenzity sopečné činnosti,
 - snížení zářivé energie Slunce.

Změny krajiny v holocénu

- Holocén – posun klimatických pásem k S.
- Stratigrafie holocénu:
 - boreál (10-8 tis. let BP)
 - atlantik (8-5 tis. let BP)
 - subboreál (5-2 tis. let BP)
- Fluktuace klimatu v historické době:
 - 1000-1200 n.l. – středověké klimatické optimum,
 - 1450-1850 n.l. – malá doba ledová.