

## Mykologické praktikum 22.10.07

### Brno-Ivanovice, Baba

- třepenitka cihlová (*Hypholoma sublateritium*) – trsnatá, na dřevě (v našem případě u kořenů borovice)
- třepenitka svazčitá (*Hypholoma fasciculare*) – nejedlá až jedovatá, tmavý výtrusný prach, sírově žlutá dužnina
- šupinovka zhoubná (*Pholiota populnea*) – parazit na dřevě topolů, nejedlá, tuhá
- šupinovka šedohlinová (*Pholiota lenta*) – slizká, bez šupin, lupeny dožluta, jedlá, ale dosti tuhá
- šupinovka kostrbatá (*Pholiota squarrosa*) – dožluta, trsy na kmenech, pařezech, jedlá, ale tuhá
- troudnatec kopytovitý (*Fomes fomentarius*) – hnědavé póry, víceletý, tvrdý, tzv. zrnité jádro
- outkovka francouzská (*Coriolopsis gallica*)
- outkovka hrbatá (*Trametes gibbosa*) – hrb v místě přirůstání k substrátu
- pečárka/žampión polní (*Agaricus campestris*) – na hnojených loukách, tmavé lupeny, jinak do běla
- strmělka mlženka (*Lepista nebularis*) – specifický zápach, bílá barva přechází až do šedohnědé
- strmělka anýzka (*Clitocybe odora*) – modravé lupeny (i celá plodnice), nápadná vůně po anýzu
- strmělka listomilná (*Clitocybe phyllophila*) – bílá, statná, klobouk není hygrofánní, silně jedovatá
- strmělka přehrnutá (*Lepista inversa*) – dorezava, ve skupinkách na opadaném listí, mírně jedovatá
- křehutka (*Psathyrella* sp.) – drobná, hnědavý klobouk, světlý třeň, tmavé lupeny
- křehutka/pláčivka sametová (*Lacrymaria velutina*) – slzíci lupeny s bílým ostřím
- helmovka rýhonohá (*Mycena polygramma*) – tmavší barva (než podobná helmovka tuhonohá), do šeda, hojná v doubravách
- helmovka růžová (*Mycena rosea*) – statnější, než h. ředkvičková, voní velmi podobně, statnější, mírně jedovatá
- helmovka ředkvičková (*Mycena pura*)
- ryzec šeredný (*Lactarius turpis*) – hnědoolivová barva, palčivý, jedovatý (údajně karcinogenní), často (zpravidla) pod břízami či smrkou
- ryzec vonný (*Lactarius glyciosmus*) – kokosová vůně, pod břízami
- ryzec zelený (*Lactarius blennius*) – bílé palčivé mléko, šedozelený, ve vlhku slizký, často pod buky
- ryzec zlatomléčný (*Lactarius chrysorrheus*) – mléko bílé, poměrně rychle žloutne, palčivý, v doubravách
- vláknice (*Inocybe* sp.) – vláknitý klobouk, hnědé lupeny s bílým ostřím, známý pach, jedovatá
- slzivka (*Hebeloma* sp.) – hnědé lupeny s bílým ostřím, zemitá vůně, tlumené zbarvení do hněda, v mládí slzíci lupeny, mykorrhizní pionýrské druhy, nejedlá
- penízovka kuželovitá (*Rhodocollybia butyracea* var. *asema*, *R. asema*) – šedý klobouk, bílé lupeny, kuželovitá báze třeně
- hnojník inkoustový (*Coprinus atramentarius*) – jedlý (ALE! nevhodná kombinace s alkoholem), lupeny se rozpouští, dříve používán na výrobu inkoustu (velmi trvanlivý)
- pýchavka obecná (*Lycoperdon perlatum*)
- březovník obecný (*Piptoporus betulinus*) – způsobuje hnědou hnilobu dřeva
- holubinka akvamarínová (*Russula chloroides*) – lupeny s nádechem do modrozelená, nejedlá
- holubinka černající (*Russula nigricans*) – v mládí plodnice bílá, postupně černá, řídké lupeny, na řezu cihlová
- čirůvka fialová (*Lepista nuda*) – jedlá, chutná ☺
- čirůvka mýdlová (*Tricholoma saponaceum*) – řídké lupeny, šedohnědý klobouk, často mýdlový pach, nejedlá
- čirůvka dvoubarvá (*Lepista saeva*) – mimo les, jedlá
- dřevokaz rosolovitý (*Merulius tremellosus*) – želatinovo-chrupavčitá konzistence, dřevokazná houba
- bělochoroš (*Oligoporus* sp.) – jednoletý, měkký, masitý
- muchomůrka citrónová (*Amanita citrina*) – hlíza na bázi třeně, nemá pochvu, mírně jedovatá
- pařezník obecný (*Panellus stipticus*) – ve skupinkách, malé béžové houby, často na dubech
- penízovka vřetenonohá (*Gymnopus fusipes*) – v trsech, dlouze kořenující vřetenovitý třeň, častá v doubravách, někdy jedlá, ale jen klobouky
- pavučinec osikový (*Cortinarius trivialis*) – žlutohnědý, slizký klobouk, žihavý třeň, často pod osikami i v doubravách, jedlý
- pavučinec nevlídný (*Cortinarius torvus*) – má botku, suchý, hnědý, řídké lupeny
- pavučinec, podrod pahříb (*Phlegmacium* sp.) – klobouk slizký, třeň suchý, často pestře zbarvené (dužnina v tomto případě ve třeni do fialova)
- závojenka (*Entoloma* sp.) – masově růžové lupeny, klobouk šedohnědý
- šťavnatka slonovinová (*Hygrophorus eburneus*) – tlusté řídké lupeny, slizký klobouk i třeň, nezaměnitelný pach připomínající housenku drvopleně obecného, jedlá
- hřib dubový (*Boletus reticulatus* (*aestivalis*))
- muchomůrka červená (*Amanita muscaria*)
- bedlička bílá (*Lepiota alba*) – třeň vločkatě vláknitý, v suchých trávnících, vzácněji v lesích, nejedlá