

CHOROBY OBILNIN



Virózy

- Žlutá zakrslost ječmene
- Původce – Barley yellow dwarf virus
- Sterilní zakrslost ovsy
- Původce - Oat sterile dwarf virus

Padlí travní

- Patogen: *Erysyphe graminis*
 - obligátní parazit, variabilní, 60 hostitelských druhů
- Symptomy:
 - *na všech částech rostlin
 - *bělavé, našedlé kupky mycelia, splývají
 - *nekrotizace
 - *kleistothecia s přívěsky
 - vřecka

- Přenos:
 - *přezimuje na zbytcích – mycelium
 - *konidie větrem, deštěm, hmyzem
 - *průnik do hostitele – haustorium
- Škodlivost:
 - *každoroční
 - *pšenice, ječmen
 - *zvýšená respirace, ubývá sacharidů
 - *do 10% výnos, snížená kvalita

- OCHRANA

- *vhodná lokalita

- *vyrovnaná výživa

- *termín setí

- *osevní postup

- *rezistentní odrůdy

- *fungicidy – tridiamefon, carbendazim,

- síra

- *rychlá obměna fungicidů - rezistence

Stéblolam

- Patogen: *Pseudocercosporaella herpotrichoides*
ozimá pšenice, méně ozimý ječmen
vysoká půdní vlhkost, chladné počasí
- Symptomy: *nejdříve – pochva
nejstaršího listu
*hnědé elipsovité skvrny,
tmavý lem
*praskání
*nenapadá kořeny

- Přenos
 - *přezimování na zbytcích
 - *strniště
 - *konidie i askospory větrem, deštěm
- Škodlivost
 - *pšenice 5 – 10%, kalamitně až 50%
 - *hynutí odnoží, poléhání

- OCHRANA

- *vhodná lokalita

- *úklid strniště

- *likvidace pýru – hostitel

- *vyrovnaná výživa

- *termín setí

- *rezistentní odrůdy

- *fungicidy – benomyl, carbendazim

- *obměna fungicidů - rezistence

Černání pat stébel

- Patogen: *Gaeumannomyces graminis*
pšenice, méně ječmen a žito; sveřepy,
psineček, pýr
- Symptomy:
 - *v době metání
 - *omezený růst, metání
 - *méně odnoží
 - *zasychání klasu, běloklasost
 - *kolonizace kořenového krčku
 - *hniloba kořenů

- Přenos:

- *přezimování na zbytcích – hyfy
perithecia

- *strniště

- *infekce při 12 – 18°C

Škodlivost:

- *při silném výskytu až 12%

- *při opakovaném pěstování pšenice

- OCHRANA:
 - *osevní postup!
 - *předplodina – *Fabaceae*
 - *vyrovnaná výživa – N, P
 - *fungicidy
 - *hubení plevelů – hostitelé
 - *obměna fungicidů

Fusariózy

- Patogen: *Fusarium spp.*
F. culmorum, *F. graminearum*, *F. moniliforme*, *F. nivale*
- Symptomy:
 - *široké spektrum – padání klíčních rostlin, choroby pat stébel, kořenů, klasů, listů, vyzimování
 - *povlaky mycelia

konidiemi

***časté deště, vyšší teploty**

- **Škodlivost:**

***snížení výnosů o 10%**

***snížená kvalita**

***TOXINY**

- **OCHRANA**

***zdravé osivo**

***vyrovnaná výživa**

***fungicidy – prochloraz, carbendazim**

Prašná sněť pšeničná

- Patogen: *Ustilago tritici*
- Symptomy:
 - *všechny části klasu
 - *prášivé černé chlamydospory

KONTAMINACE:

*chlamydospory



semeník x blizna

INFEKCE:

*až při klíčení obilky

- Škodlivost:
 - *dříve až 50% ztrát
 - *dnes moření
- OCHRANA:
 - *nekontaminované osivo
 - *moření – carboxin, thiram, iprodion

Mazlavá sněť pšeničná

- Patogen: *Tilletia caries*
- Symptomy:
 - *zrno
 - *hálka s chlamydosporami
 - *plucha a osiny zachovány
 - *mazlavý charakter zrna
 - *před sklizní tvrdne

- KONTAMINACE

- *při výmlatu

- INFEKCE

- *po výsevu v půdě

- Přenos:

- *chladné a vlhké počasí

- Škodlivost

- *dříve až 50% ztrát

- *dnes moření

- OCHRANA:
 - * nekontaminované osivo
 - * moření – oxin Cu, fuberidazol

- Snět' zakrslá – *Tilletia controversa*
- karanténní
- Snět' prašná ječná – *Ustilago nuda*
- Tvrdá snět' ječná – *U. hordei*
- Prašná snět' ovesná – *U. avenae*
- Tvrdá snět' ovesná – *U. levis*
- Snět' stébelná – *Urocystis occulata*

Rez travní

- Patogen: *Puccinia graminis*
 - *pšnice, žito, oves, ječmen, trávy
 - *heteroaecická – dřišt'ál, mahonie -
 - mezihostitelé
- Symptomy:
 - *listy, stébla, klasy
 - *rezavě hnědé kupky uredospor
 - *praská epidermis

- Přenos:

*mezihostitel

spermogonie → spermácie

+aecidiospory → aecidie

*zralé aecidiospory → obilnina

*uredospory – letní výtrusy, větrem

*teleutospory – zimní výtrusy,

na zbytcích přezimují

- Škodlivost:
 - *epidemické výskyty – až 70% ztrát
 - *rok 2000
- OCHRANA
 - *rezistentní odrůdy
 - *vyrovnaná výživa – K, P
 - *likvidace zbytků
 - *fungicidy

Rez plevová

- Patogen: *Puccinia striiformis*
 - *80 hostitelů
 - *pšenice, žito, oves, ječmen
 - *monoaecická
- Symptomy:
 - *listy, stébla, klasy
 - *žluté pruhy uredospor
 - *před sklizní tmavé kupky teleutospor

- Přenos:
 - *bez mezihostitele
 - *uredospory větrem
 - *přezimuje mycelium x uredospory
- Škodlivost
 - *nebezpečný patogen
 - *ztráty kolem 50%
 - *rok 2000

- OCHRANA
 - *likvidace výdrolu
 - *rezistentní odrůdy
 - *vyrovnaná výživa – K, P, B
 - *fungicidy – před kvetením

- Rez pšeničná – *P. recondita*
- Rez ječná – *P. hordei*
- Rez žitná – *P. dispersa*
- Rez ovesná – *P. coronata*

Braničnatka plevová

- Patogen: *Leptosphaeria nodorum*
*pšenice, žito, trávy
- Symptomy:
*klasové skvrnitosti
*mladé rostliny – skvrny
*pluchy, plušky – jinde ojediněle

- Přenos:
 - *osivem, rostlinnými zbytky
 - *mycelium, konidie, pyknosporami
 - za vegetace
 - *děšť, rosa
- Škodlivost
 - *až 35% ztráty
 - *snížená kvalita zrna
- OCHRANA
 - *rezistentní odrůdy
 - *zdravé osivo
 - *fungicidy – benomyl, prochloraz

Hnědá skvrnitost ječmene

- Patogen: *Pyrenophora teres*
*jarní i ozimý ječmen
- Symptomy:
*listy, pochvy, zrno
*sítování, světle hnědé pruhy na listech
*listové nekrózy

- Přenos:
 - *osivem, přezimují perithecia ve zbytcích
 - *konidie – za vegetace
 - *chladno a vlhko, vítr

Škodlivost:

- *značná, snížení asimilační plochy
- *ztráty až 12 a více %
- OCHRANA
 - *rezistentní odrůdy
 - *zdravé osivo
 - *osevní postup, předset'ová příprava
 - *moření – prochloraz, tebuconazol

Paličkovice nachová

- Patogen: *Claviceps purpurea*
 - *přes 200 hostitelů
 - *žito
- Symptomy:
 - *místo obilky sklerócia

- Přenos:
 - *primárně z askospor – stromata
 - *sekundárně za vegetace konidiemi
 - *osivem – námel

Alkaloidy, ergotamin, ergotoxin – farmacie

- Škodlivost:
 - *pro hostitele i člověka

- OCHRANA
 - *čištění osiva od sklerócií
 - *fungicidy – tropiconazol
 - *zaorání sklerócií
 - *prostorová izolace