

Regulární matice

Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím.

Věta. Pro každou čtvercovou matici $A = (a_{ij})$ řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ jsou následující podmínky ekvivalentní:

- (i) Řádky matice A jsou lineárně nezávislé.
- (ii) Sloupce matice A jsou lineárně nezávislé.
- (iii) Hodnota matice A je rovna n .
- (iv) Determinant $|A|$ je nenulový.

Důkaz. Ekvivalence prvních tří podmínek plyne z definice řádkové a sloupcové hodnoty matice A a z poznatku odvozeného v předchozí kapitole, že jde o stejná čísla, tedy o hodnotu matice A . Zbývá dokázat ekvivalenci těchto tří podmínek s poslední podmínkou.

Nechť tedy hodnota matice A je rovna n , takže řádky matice A jsou lineárně nezávislé. Elementárními řádkovými úpravami, tak jak bylo popsáno v prvním odstavci důkazu posledního tvrzení v minulé kapitole, se matice A převede na schodovitý tvar. Přitom se použijí pouze řádkové úpravy typu (ii) a přehazování řádků. Na hodnotu matice ani na lineární nezávislosti jejích řádků se tím nic nezmění. Z příslušných tvrzení v kapitole o determinantech navíc plyne, že hodnota determinantu může těmito úpravami nanejvýš změnit znaménko. Poněvadž řádky matice ve schodovitém tvaru jsou lineárně nezávislé, není mezi nimi vespod matice žádný nulový řádek, což nutně znamená, že všechny hlavní prvky leží na hlavní diagonále a že ji vyplní celou. Poněvadž jde o matici v horním trojúhelníkovém tvaru, je podle jiného tvrzení z kapitoly o determinantech její determinant roven součinu prvků ležících na hlavní diagonále. Jedná se tedy o součin hlavních prvků, a ten je nenulový. Takže také determinant $|A|$ je nenulový.

Nechť naopak řádky matice A jsou lineárně závislé. Je-li A nulová matice, je její determinant roven nule. V opačném případě je $n > 1$ a podle prvního tvrzení z předminulé kapitoly je některý řádek matice A lineární kombinací ostatních řádků této matice. To ale znamená, že několika elementárními řádkovými úpravami typu (ii) lze dotyčný řádek učinit nulovým řádkem. Podle příslušného tvrzení z kapitoly o determinantech se tím hodnota determinantu matice nezmění. Podle jiného tvrzení ze zmíněné kapitoly je hodnota determinantu matice s nulovým řádkem rovna nule. Takže i determinant $|A|$ je roven nule.

Čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$, která splňuje ekvivalentní podmínky z předchozí věty, se nazývá **regulární matice**. Nesplňuje-li taková čtvercová matice A podmínky z předchozí věty, říkáme, že je to **singulární matice**.

Buď $(T, +, \cdot)$ těleso a buď m přirozené číslo.

Pro každý index $i \in \{1, \dots, m\}$ a pro každý prvek $r \in T$, $r \neq 0$, označme

$E_i(r)$ — čtvercovou matici řádu m , která se liší od jednotkové matice E_m pouze tím, že na hlavní diagonále v i -tém řádku a v i -tém sloupci má prvek r .

Dále pro každé dva indexy $i, j \in \{1, \dots, m\}$, $i \neq j$ a pro každý prvek $r \in T$ označme

$E_{ij}(r)$ — čtvercovou matici řádu m , která se liší od jednotkové matice E_m pouze tím, že na pozici mimo hlavní diagonálu v i -tém řádku a v j -tém sloupci má prvek r .

Uvedené matice $E_i(r)$ a $E_{ij}(r)$ se nazývají **elementární matice** řádu m . Je jasné, že tyto matice jsou regulární, neboť $|E_i(r)| = r \neq 0$ a $|E_{ij}(r)| = 1$.

Buď dále $A = (a_{ij})$ matice typu m/n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Z definice násobení matic a z popisu elementárních řádkových úprav z minulé kapitoly je evidentní, že provedení elementární řádkové úpravy typu (i) s maticí A pro zvolená $i \in \{1, \dots, m\}$ a $r \in T, r \neq 0$ dá tentýž výsledek jako vynásobení matice A zleva elementární maticí $E_i(r)$. Podobně provedení elementární řádkové úpravy typu (ii) s maticí A pro zvolená $i, j \in \{1, \dots, m\}, i \neq j$ a $r \in T$ dá též výsledek jako vynásobení matice A zleva elementární maticí $E_{ij}(r)$. Obdobná tvrzení platí i pro elementární sloupcové úpravy, používají-li se elementární matice řádu n a násobí-li se jimi matice A zprava (indexy i, j matice $E_{ij}(r)$ se ale prohodí).

Tvrzení. Pro libovolnou čtvercovou maticí $A = (a_{ij})$ řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ jsou následující podmínky ekvivalentní:

- (i) Matice A je regulární.
- (ii) Matice A je řádkově ekvivalentní jednotkové matici E_n .
- (iii) Matice A je součinem několika elementárních matic řádu n .

Důkaz. Je-li matice A regulární, lze ji podle posledního tvrzení z minulé kapitoly převést elementárními řádkovými úpravami na Gauss-Jordanův tvar. Výsledná matice v tomto tvaru je přitom stále regulární, takže její hlavní prvky, jež jsou rovny 1, vyplní hlavní diagonálu a všechny ostatní prvky mimo diagonálu jsou rovny 0. Tak ovšem vzniká jednotková matice E_n , čili matice A je řádkově ekvivalentní této jednotkové matici E_n .

Je-li matice A je řádkově ekvivalentní jednotkové matici E_n , tedy platí-li $A \sim E_n$, pak poněvadž je tato relace symetrická podle poznámek z úvodu minulé kapitoly, platí rovněž $E_n \sim A$. Lze tedy rovněž konečnou posloupností elementárních řádkových úprav převést jednotkovou maticí E_n na maticí A . Poněvadž každou elementární řádkovou úpravu lze realizovat vynásobením některou elementární maticí řádu n zleva, je matice A součinem konečné posloupnosti takových elementárních matic.

Je-li konečně matice A součinem elementárních matic, pak je tato matice součinem regulárních matic, neboť elementární matice jsou regulární. Viděli jsme totiž, že determinanty elementárních matic jsou nenulové. Podle Cauchyovy věty pak také jakýkoliv součin takových matic má nenulový determinant a je tedy regulární maticí. Takže i matice A je regulární.

Důsledek. Dvě matice A a B typu m/n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ jsou řádkově ekvivalentní, tedy splňují $A \sim B$, právě tehdy, když existuje regulární čtvercová matice C řádu m nad tělesem $(T, +, \cdot)$ taková, že $B = C \cdot A$.

Důkaz plyne bezprostředně z ekvivalence první a poslední podmínky v předchozím tvrzení.

V kapitole o maticích jsme viděli, že množina $\text{Mat}_{nn}(T)$ všech čtvercových matic řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ tvoří vzhledem k operaci \cdot násobení matic monoid $(\text{Mat}_{nn}(T), \cdot)$. Neutrálním prvkem tohoto monoidu je jednotková matice E_n . Zajímají nás nyní invertibilní prvky tohoto monoidu, tj. invertibilní čtvercové matice řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Čtvercová matice A řádu n je invertibilní, existuje-li k ní čtvercová matice B řádu n taková, že platí $A \cdot B = E_n = B \cdot A$. Pak matice B se nazývá **inverzní matice** k matici A . Z kapitoly o monoidech víme, že inverzní matice k matici A , pokud existuje, je jediná, a značíme ji A^{-1} .

Věta. Čtvercová matice A řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ je invertibilní právě tehdy, když je regulární.

Důkaz. Je-li daná čtvercová matice A řádu n invertibilní, existuje čtvercová matice B řádu n taková, že $A \cdot B = E_n$. Podle Caychyovy věty odtud plyne, že $|A| \cdot |B| = |A \cdot B| = |E_n| = 1$, takže $|A| \neq 0$ a matice A je tedy regulární.

Je-li naopak čtvercová matice A řádu n regulární, je podle předchozího tvrzení řádkově ekvivalentní jednotkové matici E_n ,

takže podle posledního důsledku existuje regulární čtvercová matice C řádu n taková, že $C \cdot A = E_n$. Transponovaná matice A^\top je pak ovšem podle definice také regulární, takže ze stejných důvodů existuje regulární čtvercová matice D řádu n taková, že $D \cdot A^\top = E_n$. Odtud transponováním plyne, že $A \cdot D^\top = E_n$. Přitom $C = C \cdot E_n = C \cdot A \cdot D^\top = E_n \cdot D^\top = D^\top$, takže celkem $C = D^\top$ je inverzní matice k matici A .

Připomeňme z kapitoly o monoidech a grupách, že pro libovolné dvě regulární čtvercové matice A a B řádu n platí

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad \text{a} \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

Je také užitečné poznamenat, že jakmile o čtvercových maticích A a B řádu n víme, že platí jedna z rovností

$$A \cdot B = E_n \quad \text{nebo} \quad B \cdot A = E_n,$$

pak odtud vyplyne, že tyto rovnosti jsou splněny obě a že tudíž obě matice A, B jsou invertibilní a přitom jedna ke druhé navzájem inverzní. Skutečně platí-li například rovnost $A \cdot B = E_n$, pak stejně jako v předchozím důkaze zjistíme, že obě matice A, B jsou regulární a existují k nim tudíž inverzní matice A^{-1} a B^{-1} . Dále odtud dostáváme $B = E_n \cdot B = A^{-1} \cdot A \cdot B = A^{-1} \cdot E_n = A^{-1}$, čili $B = A^{-1}$ a platí tudíž i rovnost $B \cdot A = E_n$.

Z kapitoly o monoidech a grupách též připomeňme, že množina regulárních čtvercových matic řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$, tedy množina všech invertibilních matic v monoidu $(\text{Mat}_{nn}(T), \cdot)$ je uzavřená vzhledem k násobení matic a že takto sama tvoří grupu. Tuto množinu všech regulárních čtvercových matic řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$ bývá zvykem označovat symbolem $\text{GL}_n(T)$ a mluví se v této souvislosti o **obecné lineární grupě** stupně n nad $(T, +, \cdot)$.

Z Cauchyovy věty dále například plyne, že množina všech čtvercových matic řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$, jejichž determinant je roven 1, tvoří podgrupu v $\text{GL}_n(T)$. Tuto podgrupu

bývá obvyklé označovat symbolem $SL_n(T)$ a mluví se o ní jako o **speciální lineární grupě** stupně n nad $(T, +, \cdot)$.

Metody výpočtu inverzních matic

Mějme regulární čtvercovou matici $A = (a_{ij})$ řádu n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Viděli jsme, že pak $A \sim E_n$, což znamená, že provedením několika elementárních řádkových úprav lze z matice A dostat jednotkovou matici E_n . Nechť F_1, F_2, \dots, F_k jsou elementární matice řádu n odpovídající postupně těmto řádkovým úpravám. Pak provedení zmíněné posloupnosti řádkových úprav s maticí A znamená vynásobení matice A postupně maticemi F_1, F_2, \dots, F_k zleva, čímž vzniká součin matic

$$F_k \cdot \dots \cdot F_2 \cdot F_1 \cdot A = E_n.$$

Vezměme tedy matici $C = F_k \cdot \dots \cdot F_2 \cdot F_1$. Pak ovšem máme $C \cdot A = E_n$ a podle toho, co bylo řečeno výše, je tedy C inverzní maticí k matici A . Provedeme-li dále tutéž posloupnost elementárních řádkových úprav jako výše také s maticí E_n , dostaneme tím z týchž důvodů matici $C \cdot E_n = C$, tedy samotnou inverzní matici k matici A . Myšlenka, o kterou se nyní opírá metoda výpočtu inverzní matice k dané čtvercové matici A řádu n , spočívá v provádění týchž elementárních řádkových úprav s oběma maticemi A i E_n současně. Přitom volíme tyto úpravy tak, aby převedly matici A do Gauss-Jordanova tvaru. Je-li matice A regulární, vznikne tak jednotková matice E_n , takže takto po několika krocích obdržíme řádkově ekvivalentní matice

$$(A | E_n) \sim \dots \sim (E_n | C),$$

kde $C = A^{-1}$. Není-li matice A regulární, vyjde nám v jejím Gauss-Jordanově tvaru alespoň jeden nulový řádek.

Jinou možnost, jak počítat inverzní matici, poskytuje následující výsledek. Mějme regulární čtvercovou matici $A = (a_{ij})$

řádu $n > 1$ nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Připomeňme, že v kapitole o determinantech jsme pro každá $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ definovali algebraický doplněk \widehat{A}_{ij} prvku a_{ij} v matici A . Vezměme čtvercovou matici $\widehat{A} = (\widehat{A}_{ij})$ řádu n složenou z těchto algebraických doplňků a k ní transponovanou matici $A^* = \widehat{A}^\top$. Tato matice A^* se nazývá **adjungovaná matice** k matici A . Nyní můžeme formulovat následující fakt:

Věta. Buď $A = (a_{ij})$ regulární čtvercová matice řádu $n > 1$ nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Pak platí

$$A^{-1} = |A|^{-1} \cdot A^*.$$

Důkaz. Podle toho, co bylo uvedeno shora, stačí ukázat, že součin matice A s maticí $|A|^{-1} \cdot A^*$ je roven jednotkové matici E_n . Neboli stačí ukázat, že $A \cdot A^* = |A| \cdot E_n$. Zvolme proto nejprve libovolný index $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ a vypočtěme prvek ležící v matici $A \cdot A^*$ na diagonále v i -tém řádku a v i -tém sloupci. Tento prvek je ovšem roven $a_{i1} \cdot \widehat{A}_{i1} + a_{i2} \cdot \widehat{A}_{i2} + \dots + a_{in} \cdot \widehat{A}_{in} = |A|$ podle věty o Laplaceově rozvoji determinantu $|A|$, a to je odpovídající diagonální prvek matice $|A| \cdot E_n$. Zvolme dále libovolné indexy $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$ a vypočtěme prvek ležící v matici $A \cdot A^*$ na pozici mimo diagonálu v i -tém řádku a v j -tém sloupci. Tento prvek vychází roven $a_{i1} \cdot \widehat{A}_{j1} + a_{i2} \cdot \widehat{A}_{j2} + \dots + a_{in} \cdot \widehat{A}_{jn} = 0$, neboť jde o Laplaceův rozvoj determinantu z matice, která se od matice A liší v tom, že se v ní místo j -tého řádku opakuje i -tý řádek. Podle jednoho z tvrzení v kapitole o determinantech je ovšem determinant z matice mající dva stejné řádky roven nule. Prvky matice $|A| \cdot E_n$ ležící mimo diagonálu jsou ovšem nulové. To potvrzuje rovnost $A \cdot A^* = |A| \cdot E_n$, kterou bylo třeba dokázat.

Matice přechodu od báze k bázi

Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze nad tělesem $(T, +, \cdot)$ a nechť vektory $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ před-

stavují některou bázi tohoto prostoru. Připomeňme, že potom pro každý vektor $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$ existují jednoznačně určené prvky $s_1, s_2, \dots, s_n \in T$ takové, že $\mathbf{u} = s_1 \cdot \mathbf{f}_1 + s_2 \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + s_n \cdot \mathbf{f}_n$. Prvky s_1, s_2, \dots, s_n se nazývají **souřadnice** vektoru \mathbf{u} v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$.

Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor konečné dimenze n nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť posloupnosti $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ tvoří dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$. Nechť pro každé $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ jsou $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$ souřadnice vektoru \mathbf{g}_j v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$, takže $\mathbf{g}_j = a_{1j} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2j} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{nj} \cdot \mathbf{f}_n$. Pak čtvercová matice $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, n, j=1, \dots, n}$ nad $(T, +, \cdot)$ se nazývá **matice přechodu** od báze $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ k bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$. Zavedeme-li podobně jako ke konci předminulé kapitoly značení $\underline{\mathbf{f}} = (\mathbf{f}_1 \ \mathbf{f}_2 \ \dots \ \mathbf{f}_n)$ a $\underline{\mathbf{g}} = (\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2 \ \dots \ \mathbf{g}_n)$ pro zmíněné dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$, pak právě uvedená definice matice přechodu $A = (a_{ij})$ od báze $\underline{\mathbf{f}}$ k bázi $\underline{\mathbf{g}}$ znamená, že platí rovnost

$$\underline{\mathbf{g}} = \underline{\mathbf{f}} \cdot A,$$

vzpomeneme-li si na dříve zavedené násobení matic nad vektorovým prostorem $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ maticemi nad tělesem $(T, +, \cdot)$.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ jsou dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ a nechť $A = (a_{ij})$ je matice přechodu od báze $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ k bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$. Nechť \mathbf{u} je libovolný vektor z \mathbf{V} a nechť s_1, s_2, \dots, s_n , resp. t_1, t_2, \dots, t_n jsou souřadnice vektoru \mathbf{u} v bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$, resp. v bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$. Pak platí rovnost

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}.$$

Důkaz. Označme $\underline{\mathbf{f}} = (\mathbf{f}_1 \ \mathbf{f}_2 \ \dots \ \mathbf{f}_n)$, $\underline{\mathbf{g}} = (\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2 \ \dots \ \mathbf{g}_n)$ a dále $\mathbf{s} = (s_1 \ s_2 \ \dots \ s_n)^\top$, $\mathbf{t} = (t_1 \ t_2 \ \dots \ t_n)^\top$. Pak podobně jako ke konci předminulé kapitoly můžeme psát $\mathbf{u} = \underline{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{s}$ a současně $\mathbf{u} = \underline{\mathbf{g}} \cdot \mathbf{t}$. Současně, jak bylo výše řečeno, podle definice matice přechodu $A = (a_{ij})$ máme $\underline{\mathbf{g}} = \underline{\mathbf{f}} \cdot A$. Dosazením do předchozí rovnosti s využitím dříve ověřené asociativity zmíněného násobení matic nad vektorovým prostorem $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ maticemi nad tělesem $(T, +, \cdot)$ dostáváme, že

$$\mathbf{u} = \underline{\mathbf{f}} \cdot A \cdot \mathbf{t}.$$

To znamená, že $A \cdot \mathbf{t}$ jsou souřadnice vektoru \mathbf{u} v bázi $\underline{\mathbf{f}}$. Ovšem také \mathbf{s} jsou souřadnice vektoru \mathbf{u} v téže bázi $\underline{\mathbf{f}}$. Vzhledem k jednoznačnosti souřadnic vektoru \mathbf{u} v bázi $\underline{\mathbf{f}}$ prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ odtud plyne rovnost $\mathbf{s} = A \cdot \mathbf{t}$, což bylo třeba ověřit.

Ukážeme nyní, jakým způsobem se uplatní inverzní matice v problematice bází vektorových prostorů.

Tvrzení. Nechť $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ je nenulový vektorový prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$. Nechť $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ a $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ jsou dvě báze prostoru $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ a nechť $A = (a_{ij})$ je matice přechodu od báze $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ k bázi $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$. Pak A je regulární matice a matice A^{-1} k ní inverzní je maticí přechodu od báze $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ k bázi $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$.

Důkaz. Označme $\underline{\mathbf{f}} = (\mathbf{f}_1 \ \mathbf{f}_2 \ \dots \ \mathbf{f}_n)$, $\underline{\mathbf{g}} = (\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2 \ \dots \ \mathbf{g}_n)$. Pak $A = (a_{ij})$ je matice přechodu od báze $\underline{\mathbf{f}}$ k bázi $\underline{\mathbf{g}}$. Označme dále zprvu $B = (b_{ij})$ maticí přechodu od báze $\underline{\mathbf{g}}$ k bázi $\underline{\mathbf{f}}$. Podle toho, co bylo řečeno dříve v této kapitole, zcela stačí, když ukážeme, že součin $A \cdot B$ je roven jednotkové matici E_n řádu n . Ovšem podle definice matic přechodu $A = (a_{ij})$ a $B = (b_{ij})$ máme rovnosti $\underline{\mathbf{g}} = \underline{\mathbf{f}} \cdot A$ a $\underline{\mathbf{f}} = \underline{\mathbf{g}} \cdot B$. Z těchto rovností opět s využitím asociativity zmíněného násobení matic dosazením dostáváme rovnost

$$\underline{\mathbf{f}} = \underline{\mathbf{f}} \cdot A \cdot B.$$

Současně ale evidentně platí také rovnost $\underline{\mathbf{f}} = \underline{\mathbf{f}} \cdot E_n$. Čili jak matice $A \cdot B$, tak také matice E_n jsou maticemi přechodu od báze $\underline{\mathbf{f}}$ k téže bázi $\underline{\mathbf{f}}$. Matice přechodu je ovšem určena jednoznačně, neboť má ve svých sloupcích souřadnice vektorů báze, ke které se přechází, vzhledem k výchozí bázi. Odtud tedy plyne, že $A \cdot B = E_n$, jak bylo třeba ukázat. To znamená, že $B = A^{-1}$.