

Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie

Zdeněk Máčka

Paleopedologie – definice


- Vědní disciplína zabývající se studiem půd a zvětrávacích pochodů minulých geologických dob.
- Staré půdy = pleistocénní a starší
- Princip aktualizmu --- skutečně efektivní koncept pro studium starých půd?
- Komplexní pojetí pedologie = znalost recentní pedogeneze + paleopedologie.

- Co je třeba brát v úvahu při studiu starých půd?
 - Vyskytují se staré půdy v oblasti též jako v recentní podobě?
 - rovněž jako recentní
 - pouze fosilní
 - recentní obdoba ve vzdálených oblastech
 - Jaký stupeň zralosti současné půdy dosahují?
 - vývojová stádia, půdní sukcese
 - půdní klimax
- Půdní klimax = poslední člen půdního řetězce, půda odpovídá stanovištním podmínkám

Terminologické poznámky

- Autochtonní půdy ↔ Alochtonní půdy
- Parautochtonní půdy – druhotné porušení (kryoturbace, svahové procesy)
- Pohřbené půdy – překryté postglaciální půdy
- Polygenetické půdy: pseudočernozem
- Polycyklické (harmonické) půdy: terra calcis, plastosoly, latosoly

Třídění půd podle způsobu výskytu (modu)




- I. Autochtonní půdy na primární matečné hornině
- II. Půdní sedimenty
- III. Autochtonní půdy na půdních sedimentech
- IV. Autochtonní formy přeměn na autochtonních půdních reliitech

Vztah půd ke kvartérnímu klimaticko-sedimentačnímu cyklu


- Změny půdotvorných faktorů v kvartéru
 - Matečná hornina
 - Podnebí
 - Působení organizmů
 - Vliv reliéfu
 - Čas
- Běžný cyklus nástupu glaciálu: *sprašová syrozem* → *pararendzina* → *černozem* → *degradovaná černozem* → *strukturní půda*

Retrográdní vývoj půd v holocénu

- Pozdní glaciál: spraše, soliflukce, deluvioelické sedimenty, mrazové zvětraliny
- Starý, střední holocén: illimerizované půdy, odnosný/sedimentační klid
- Epiatlantik: pseudočernozemě
- Subboreál: pokročilá půdní eroze, půdní sedimenty
- Subatlantik: intenzivní odnos, ronové sedimenty, slabě vyvinutá černozem
- Subrecent: iniciální stádia černozemí






Sled retrográdního vývoje půd (Velký Hubenov, severní Čechy)




Půdní komplexy

- PK 0, holocén
- PK I, iniciální pseudogleje, „arktické“ hnědozemě
- PK II, báze -degradovaná černozem až hnědozem, nadloží – pararendzina až černozem
- PK III, parahnědozem, černozem
- PK IV, dvojice parahnědozemí
- PK V, báze - braunlehmovitá parahnědozem, nadloží – půdy černozemní řady
- PK VI, tendence k braunlehmovitým půdám
- PK VII, VIII, IX, X, XI, braunlehmy, v nadloží silně vyvinuté parahnědozemě






Mladopleistocénní půdní komplexy (Jenerálka u Prahy)




Poměr půd k erozi a akumulaci


- Naprostá závislost výskytu půd na morfologii
 - polohy klidné
 - polohy zasahované
 - odnosem
 - sedimentací




Půdní geomorfologie




Využití půd pro rekonstrukci fází tektonického vývoje v kvartéru




1. 400,000 YEARS B.P.—Prior to fault event 1. Soil Z (100,000 yrs old) has formed on the Liano de Albuquerque.




2. 310,000 YEARS B.P.—Prior to fault event 2. Soil Z buried by unit B, surface restabilized, and soil Y (90,000 yrs old) has formed.



3. 120,000 YEARS B.P.—Prior to fault event 3. Soil Y buried by unit C, surface restabilized, and soil X (190,000 yrs old) has formed.



4. 20,000 YEARS B.P.—Prior to fault event 4. Soil X buried by unit D, surface restabilized, and soil V (100,000 yrs old) has formed.



5. PRESENT DAY—Soil V buried by unit E, surface restabilized, and soil U (20,000 yrs old) has formed.
Soil U presently covered by small coppice dunes and thin eolian sand sheet.