

# Mikroreliéfová metoda

metoda studia povrchu  
neprůhledných objektů

# Možnosti studia povrchu neprůhledných objektů


- mikroskopie v dopadajícím „osvětlení“
  - optická (např. mikroskop Lug Zeiss)
  - elektronová - SEM, kryo SEM (aquaSEM)
- izolace povrchové vrstvy
- zhotovení otisku mikroreliéfu
- konfokální mikroskopie

# Lug Zeiss Jena

Mikroskop pro práci  
v dopadajícím  
světle

speciální konstrukce  
objektivu, který  
štěrbinou ve vnějším  
plášti osvětluje  
objekt shora


časté využití při  
studiu epidermis a  
průduchů



# Terminologie průduchů

- **průduch (stoma, pl. stomata)** - zajišťují výměnu plynů ( $CO_2$ ,  $O_2$ ) mezi ovzduším a mezofylem listu a výdej vodní páry z listu do ovzduší
- je tvořen 2 **svěracími buňkami**, nejčastěji ledvinovitého tvaru, které ohraničují pór, jehož velikost je aktivně regulována
- změny tvaru svěracích buněk jsou ovlivňovány turgorem
- **stomatální komplex** = průduch + okolní epidermální buňky
- **buňka sousední (Neighbour cell)** - epidermální buňka v kontaktu s průduchem nebo jeho prekurzorem morfologicky stejná jako ostatní epidermální buňky
- **buňka vedlejší (Subsidiary cell)** - epidermální buňka v kontaktu s průduchem nebo jeho prekurzorem, morfologicky odlišná od ostatních epidermálních buněk


# Tvar a rozmístění průduchů děloha *Arabidopsis thaliana* Heynh.



Transmission electron micrograph  
Zhao and Sack (1999)

Bar = 2  $\mu$ m

Nadeau J.A. and Sack F.D.  
The *Arabidopsis* Book, 2002



Cryo-scanning electron micrograph  
of maturing epidermis from a cotyledon.  
The larger, non-stomatal cells are pavement cells  
that are shaped like pieces of a jigsaw puzzle.  
Bar = 30  $\mu$ m


# Tvar a rozmístění průduchů květní orgány *Arabidopsis thaliana* Heynh.

Cryo-scanning electron micrograph - stomata  
(hydatody) na vrcholu nektarií

Cryo-scanning electron micrograph - stomata  
na abaxiální epidermis prašníku

Anther micrograph from Kim Findlay.  
Bars = 30  $\mu\text{m}$  (top) and 100  $\mu\text{m}$  (bottom).

Nadeau J.A. and Sack F.D.  
The *Arabidopsis* Book, 2002




# Listy podle umístění průduchů

- **hypostomatické** – stomata většinou (až 90%) na spodní straně listu, ve svrchní epidermis mohou zcela chybět = nejčastější typ
- **amfistomatické** – stomata na obou stranách listu ve srovnatelném počtu (*Iris*, trávy)
- **epistomatické** – stomata pouze na svrchní straně listu (vzplývavé listy vodních rostlin, některé trávy – *Festuca*, *Melica*, *Brachypodium*)


# Stomata podle umístění na listech

- **stomata faneroporní** - svěrací buňky a epidermis leží v jedné rovině = nejčastější případ
- **stomata emerzní** - vyčnívají nad úroveň epidermis - hygrofyty, plovoucí listy vodních rostlin
- **stomata submerzní** - ponořená stomata - xerofyty (*Iris*, *Chlorophytum*, *Pinus*, *Nerium oleander*)

*Iris*



amfistomický list, stomata submerzní



*Nerium  
oleander*


hypostomický list, stomata submerzní v dutině s trichomy

# Typy stomat podle anatomie a mechaniky

## Pteridofytí typ


hřbetní stěna svěracích buněk je silná, lumen buněk se mění z oválu na kruh

kapradiny





## Gymnospermní typ

svěrací buňky ponořené, silnostěnné, malá možnost pohybu, na zimu se zavírají voskem jehličnany



## typ *Helleborus*

břišní stěna  
svěracích buněk je nerovnoměrně ztlustlá, vnější zůstává pružná  
dvouděložné  
i některé jednoděložné





## Typ *Graminae*

svěrací buňky tvaru piškotů + vedlejší buňky trávy, ostřice, sítiny, akácie






## typ *Amaryllis*

břišní stěna svěracích buněk je vyztužená, nepružná, vnější zůstává pružná  
časté u jednoděložných rostlin



# Klasifikace stomat podle počtu a uspořádání obklopujících buněk


- **stomata izocytická** – epidermální buňky se neliší od buněk epidermis (vývoj haplocheilický)
  - anomocytická
  - anomotetracytická (*Chlorophytum, Iris*)
- **stomata anizocytická** – vývoj syndetocheilický – diferencované sousední buňky různě uspořádané:
  - paracytická (*Magnolia, Cyperus*)
  - brachyparatetracytická (*Tradescantia*)
  - polocytická (*Dryopteric, Nephrolepis*)
  - amfianizocytická (*Begonia*)



# Tvar a rozmístění a vývoj průduchů adaxiální strana dělohy tabáku

*Nicotiana tabacum L.*

zralý průduch



mladý průduch

materinská buňka průduchu

*Stomatální densita:*  
(hustota průduchů)

=


počet průduchů na  
jednotku plochy

*Stomatální index:*

počet průduchů dělený  
celkovým počtem  
epidermálních buněk  
včetně stomat.


# Syndetochelialický vývoj průduchů Abaxiální strana dělohy *Arabidopsis*

sledování pomocí otisku v laku na nehty      Satellite  
MMC      Symmetric division      meristemoid formation



Day 6

Bar = 25  $\mu\text{m}$




Meristemoid formation


Day 7

Geisler et al. (2000)

# Diagram hlavních buněčných typů a dělení ve vývoji průduchů u *Arabidopsis*



# Konfokální snímek abaxiální epidermis listu *Arabidopsis*



vizualizace  
buněčných stěn =

GFP lokalizovaný  
v plazmatické  
membráně ("Q8")

Cutler et al.  
2000

# Definice rozlišovací schopnosti


$$\frac{\lambda}{a} = \frac{\lambda}{A} = \frac{\lambda}{n \cdot \sin \alpha}$$

$\lambda$  - vlnová délka světla


$A$  - numerická apertura

$n$  - index lomu

$\alpha$  - polovina otvorového úhlu (otvorový úhel lze zvětšit pomocí šikmého osvětlení)



# Vliv šíkmého osvětlení na rozlišovací schopnost



Fotoğraf: George Steinmetz

© 2005 National Geographic Society. Her hakkı saklıdır.

Dev Developér

National Geographic Türkiye, Şubat 2005

# Možnosti nastavení šikmého osvětlení

- zešikmením zrcátka (používáme plochou stranu zrcátka)
- vložením stínícího disku s excentricky umístěným otvorem
- vysunutí aperturní clony mimo optickou osu
- vysunutí kondenzoru mimo optickou osu