

Repetitorium vyšších rostlin 1

Vít Grulich

Literatura:


- Novák F. A. (1972): Vyšší rostliny. – Academia, Praha
- Heywood V. H. (1993): Flowering plants of the World. – Batsford, London.
- Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých rastlín. – UPJŠ Košice.
- APG (1998): An ordinal classification for the families of flowering plants. – Ann. Miss. Bot. Gard. 85: 531-553.
- APG (2003): An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. – Bot. J. Linn. Soc. 141: 399-436.

Brassicaceae

= Cruciferae - křížaté

- součást větve pravých Rosidů
- dříve podtřída Dilleniidae
- homogenní čeleď
 - v současné době připojovány Capparidaceae

Cleome



Capparis

Capparis spinosa



Brassicaceae - příbuzní

- Resedaceae
 - tvoří analogické obsahové látky
- Tropaeolaceae



Tropaeolum majus
www.botanik-uni.karlsruhe.de



Reseda odorata
Resedaceae
G. K. Linney

Reseda odorata
www.botany.hawaii.edu

Brassicaceae

- Byliny, výjimečně polokeře nebo keře
 - „exotické“ morfortypy zvl. v Makaronésii
 - stepní běžci
 - *Crambe tataria*
 - keříky
 - *Descuriania*, *Sinapidendron*
 - stromkovité typy
 - *Crambe* spp.



Descurainia bourgeana
www.biologie-uni.regensburg.de



Sinapidendron frutescens
www.rostliny.nikde.cz

Brassicaceae

- střídavé listy bez palistů
 - v přízemní růžici
 - např. *Draba*, *Petrocallis*
 - jednoduché, celistvé
 - např. *Lunaria*, *Arabis*, *Barbarea*, *Thlaspi*
 - členěné až složené
 - např. *Cardamine*, *Sisymbrium*



Draba hoppeana

Brassicaceae

- Odění: důležitý systematický znak
 - trichomy jednoduché
 - dvouramenné
 - hvězdovité
 - žláznaté

Brassicaceae

Crambe tataria




- Květenství hrozen
 - listeny chybějí
- Květy jednotné stavby
 - oboupohlavné, K_{2+2} , C_4 , A_{2+4} , \underline{G} (2)
 - nektariový disk
 - vnější tyčinky kratší, v transverzále
 - gyneceum v transverzále
 - někdy přítomen gynofor (stopka z prodlouženého lůžka)
 - výjimky velmi vzácné
 - *Lepidium ruderale*: A_2

Brassicaceae

- plody šešule nebo šešulka
 - kvantitativní rozdíl
 - šešule: dlouhá, úzká
 - Arabis
 - šešulka: krátká, široká
 - Alyssum
- vzácně struk
 - Raphanus, Cakile
- vzácně nažka
 - Crambe

Cakile maritima
www.floracyberia.net



Capsella bursa-pastoris
www.toildepices.com



Crambe maritima
www.nature-diary.com.uk

Brassicaceae

- Pukání šešule nebo šešulky:
 - chlopně odpovídají stěnám plodolistů
 - otvírají se zdola nahoru
 - přehrádka je placentárního původu
 - rámeček
 - diafragma
 - u některých druhů geokarpie
 - semena s malým endospermem nebo perispermem




Morisia monanthos
www.jardin-mundani.com

Brassicaceae

- glukosinoláty
 - obsahují síru
 - slouží k ochraně před býložravci
- enzym thioglukosináza (myrozináza)
 - v idioblastech
- vysoký obsah vitamínu C
 - antiskorbutika

Brassicaceae

- kosmopolitní čeleď
 - 375 rodů, 3200 druhů
- převaha v mírném pásu
- vývojové centrum
 - Středozeří, Blízký východ
 - na jižní polokouli vesměs izolované endemické typy
 - *Pringlea antiscorbutica* (Kerguéleny)
 - na některých tropických ostrovech chybějí



Pringlea antiscorbutica
www.btinternet.com

Brassicaceae

- Stanoviště rozmanitá
 - pouště
 - slaniska
 - hory
 - plevele



Anastatica hierochuntica
www.biologie.uni-hamburg.de



Lepidium cartilagineum
www.flogaus.faust2.de



Smelowskia calycina

Brassicaceae

- bohaté využití člověkem
 - zeleniny
 - olejniny
 - zelené hnojení a krmiva
 - léčivé rostliny
 - okrasné rostliny



Aubrietia cv. Leichtlinie
www.alpinemtecho.com

Crambe

Crambe maritima
www.s-weeds.net



- stepní běžci
- rostliny mořských pobřeží
- Makaronésie – sekundární vývojové centrum

Crambe scaberrima
www.biologie-uni.regensburg.de



Crambe tataria



Dentaria

typické rostliny bučin a dubohabřin



Dentaria glandulosa
www.rostliny.nikde.cz



Dentaria enneaphyllos



Dentaria pentaphyllos



Dentaria bulbifera

Cardamine

Cardamine amara



- luční, lesní i horské druhy

Cardamine resedifolia




Cardamine trifolia



Lunaria rediviva

- typický druh suťových lesů



www.hortus-botanicus.nl

Aurinia saxatilis

- druh skalních stanovišť



Thlaspi

- lesy, alpské bezlesí i plevele

Thlaspi alpinum



Thlaspi montanum




Thlaspi rotundifolium



Arabis

Arabis turrita




Arabis lyallii



Arabis caerulea

Arabis soyeri



Erophila verna



Teesdalia nudicaulis



Ericaceae

- součást Asteridové větve
- dříve podtřída Dilleniidae
- v současnosti přehodnocená klasifikace
 - připojovány Vacciniaceae, Empetraceae, Pyrolaceae, Monotropaceae (a Epacridaceae)
- příbuzní
 - Clethraceae
 - Primulaceae
 - Polemoniaceae



Clethra arborea
www.rostliny.nikde.cz

Ericaceae

- keře
- keříky („erikoidní dřeviny“)
- vzácněji byliny
- vzácně nezelení saprotrofové
 - častá endotrofní mykorrhiza

Ericaceae

- listy jednoduché, bez palistů
 - střídavé, vstřícné nebo v přeslenech
 - často drobné
 - nejčastěji jehlicovité
 - např. Erica, Empetrum
 - šupinovité
 - např. Calluna, Monotropa
 - ploché, lupenité, řapíkaté
 - Rhododendron, Pyrola

Ericaceae

- květenství hrozen
 - listeny chybějí
- květy nejčastěji oboupohlavné
 - vzácně jednopohlavné
 - pravidelné
 - Erica, Vaccinium, Pyrola, Calluna
 - lehce souměrné
 - Rhododendron
 - koruny srostlé (na bázi nebo až baňkovité)
 - Rhododendron, Erica, Vaccinium
 - koruny volné
 - Ledum, Pyrola, Empetrum

Ericaceae

- tyčinky většinou obdiplostemonické
 - A 4-5+4-5
 - řidčeji jen jeden kruh tyčinek
 - Empetrum, Epacris
 - prašníky často s růžkovitými výrůstky
 - pyl v tetradách
 - gyneceum srostlé
 - G2-5
 - semeník svrchní
 - řidčeji semeník spodní
 - Vaccinium, Oxycoccus



Ericaceae

- plody tobolky
 - Andromeda, Rhododendron, Erica, Calluna
- bobule
 - Vaccinium
- peckovice
 - Arctostaphylos, Empetrum



Ericaceae

- kosmopolitní čeleď
 - 130 rodů, 2700 druhů
- převaha v mírném pásu
- vývojové centrum
 - Východní Asie, Severní Amerika, Kapsko
 - v Austrálii jen Epacridoideae
 - disjunkce
 - Empetrum - bipolární

Ericaceae

- Stanoviště rozmanitá
 - často chudé půdy
 - adaptace na extrémní podmínky
 - vřesoviště
 - etésiová vegetace
 - hory
- citlivé vůči antropogennímu ovlivnění
 - zvláště silní mykotrofové
 - *Pyrola*, *Moneses*, *Chimaphila*, *Monotropa*

Ericaceae

- plody - ovoce
 - Vaccinium, Oxycoccus, Arbutus
- okrasné rostliny venkovní i hrnkové
- Rhododendron, Erica, Calluna, Kalmia, Gaultheria

Ericaceae

- Rhododendron
 - stálezelené nebo opadavé keře až keříky
 - asi 200 druhů
 - u nás nepůvodní
 - zahradnické výsadby
 - Alpy (2 druhy)
 - východní Asie (velká diverzita)

Rhododendron



Rhododendron hirsutum



Rhododendron macrophyllum

Rhododendron albiflorum



Rhododendron ferrugineum

Ledum

Ledum glandulosum



Ledum palustre


Ledum groenlandicum



Gaultheria



Gaultheria shallon



Gaultheria adenotrix

www.home20.inet.tele.dk



Gaultheria hispidula

Gaultheria ovatifolia



Gaultheria

A photograph of a Gaultheria erecta bush in a natural, outdoor setting. The bush has green, rounded leaves and clusters of small, reddish-pink flowers. The background shows other vegetation and a clear sky.

Gaultheria erecta

A close-up photograph of a Gaultheria gracilis bush. The image shows clusters of small, bell-shaped flowers that are white with pinkish-red tips. The leaves are green and have a slightly waxy appearance.

Gaultheria gracilis

andské vřesovce



Comarostaphylis arbutoides



Satyria warszewiczii



Pernettya coriacea

Arbutus



Arbutus menziesii



Arbutus unedo



Kalmia

- Severní Amerika
- občas pěstované
- někdy spojován s rodem *Loiseleuria*



Kalmia microphylla



Kalmia angustifolia
www.mytho-fleurs.com



Loiseleuria procumbens

Cladothamnus pyroliflorus



Menziesia ferruginea



Erica

- stálezelené stromky, keře nebo keříky
- asi 600 druhů
- Evropa
 - 15 druhů, především v západním Středozeří
 - v ČR jen vzácně *E. herbacea* a *E. tetralix*
- hory tropické Afriky
- Kapsko
 - asi 550 druhů

Erica



Erica herbacea

Erica manipuliflora



Erica viscaria
www.fernkloof.com

Erica arborea



Erica



Erica reunionensis

Erica



Erica galioides



Erica arborescens

Agauria



Agauria salicifolia



Agauria buxifolia

Rhodothamnus chamaecistus



Andromeda polifolia





Cassiope mertensiana



Phyllodoce glanduliflora



Phyllodoce empetriflora

Arctostaphylos



Arctostaphylos alpina



Arctostaphylos rubra



Arctostaphylos columbiana



Arctostaphylos uva-ursi

Calluna vulgaris




Empetrum nigrum



Vaccinium

Vaccinium uliginosum



- opadavé nebo stálezelené keříky nebo keře
- asi 200 druhů
- severní polokoule, hory v tropech
 - v ČR 3 druhy



Vaccinium consanguineum



Vaccinium vitis-idaea



Vaccinium ovatum



Vaccinium alaskaense




Vaccinium ovalifolium



Vaccinium membranaceum




A photograph of a Vaccinium scoparium branch with several bright red, round berries. The leaves are small, green, and have a slightly serrated edge. The background is a mix of green foliage and brown twigs.


Vaccinium scoparium

A photograph of a Vaccinium cespitosum branch with several pinkish-red, bell-shaped flowers. The leaves are green and have a slightly serrated edge. The background is a mix of green foliage and brown twigs.

Vaccinium cespitosum

A photograph of a Vaccinium myrtilloides branch with several blueberries. Some berries are fully ripe and blue, while others are still green and unripe. The leaves are green and have a slightly serrated edge.

Vaccinium myrtilloides

A photograph of a Vaccinium parvifolium branch with a single bright red, round berry. The leaves are small, green, and have a slightly serrated edge.

Vaccinium parvifolium

Oxycoccus palustris



Pyrola

- drobné byliny
 - asi 30 druhů
 - Evropa, severní Asie a Severní Amerika
 - silní mykotrofové
 - ustupující, velmi ohrožené

Pyrola

Pyrola media



Pyrola chlorantha



Pyrola rotundifolia



Pyrola minor



Pyrola asarifolia



Pyroloideae



Ramischia secunda



Moneses uniflora



Chimaphila menziesii



Chimaphila umbellata



Pyroloideae




Monotropa hypopitys
www.hlasek.com



Pterospora
andromedea



Allotropa virgata



Monotropa uniflora



Epacridoideae

Epacris impressa

www.bkaussi.de



Dracophyllum tubiflorum

www.ruhr-uni.bochum.de



Styphelia tubiflora

www.users.bigpond.net.au