



# Základy genomiky



Masarykova univerzita, Laboratoř funkční genomiky a pro  
Laboratoř molekulární fyziologie rostlin




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Základy genomiky II.

- Zdrojová literatura ke kapitole II:

- Plant Functional Genomics, ed. Erich Grotewold, 2003, Humana Press, Totowa, New Jersey
- Majoros, W.H., Pertea, M., Antonescu, C. and Salzberg, S.L. (2003) GlimmerM, Exonomy, and Unveil: three ab initio eukaryotic genefinders. *Nucleic Acids Research*, **31**(13).
- Singh, G. and Lykke-Andersen, J. (2003) New insights into the formation of active nonsense-mediated decay complexes. *TRENDS in Biochemical Sciences*, **28** (464).
- Wang, L. and Wessler, S.R. (1998) Inefficient reinitiation is responsible for upstream open reading frame-mediated translational repression of the maize R gene. *Plant Cell*, **10**, (1733)
- de Souza et al. (1998) Toward a resolution of the introns early/late debate: Only phase zero introns are correlated with the structure of ancient proteins *PNAS*, **95**, (5094)
- Feuillet and Keller (2002) Comparative genomics in the grass family: molecular characterization of grass genome structure and evolution *Ann Bot*, **89** (3-10)
- Frobis, A.C., Matus, D.Q., and Seaver, E.C. (2008). Genomic expression demonstrate spatial and temporal Hox gene co-expression in the lophotrochozoan *Capitella* sp. I. *PLoS One* **3**, e4004



# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání
  - genomová kolinearita a genová homologie
- Experimentální identifikace genů
  - příprava genově obohacených knihoven pomocí technologie metylačního filtrování
  - EST knihovny




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Přímá vs. reverzní genetika

## Revoluce v chápání pojmu genu

Přístupy „klasické“ genetiky







3

:

1

„Reverzně genetický“ přístup

5'TTATATATATATATATTAATAATAATAATA  
AGAACAAAAAGAAAATAATA...3'




VOJE VZDĚLÁVÁNÍ

entace je spolufinancována  
ropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky



# Identifikace role genu *ARR21*

- Předpokládaný přenašeč signálu u dvoukomponentního signálního systému *Arabidopsis*




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Identifikace role genu ARR21


regulátor odezvy v dvoukomponentním signálním systému

## Recent Model of the CK Signaling via Multistep Phosphorelay (MSP) Pathway



# Identifikace role genu *ARR21*

- Předpokládaný přenašeč signálu u dvoukomponentního signálního systému *Arabidopsis*
- Mutant identifikován vyhledáváním v databázi inzerčních mutantů (SINS-sequenced insertion site) pomocí programu BLAST



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky




# Identifikace role genu *ARR21* identifikace inzerčního mutanta

- vyhledávání v databázi inzerčních mutantů (SINS)

```
Insert_SINS: 01_09_64
Query: 80      tcctagcgttcacatgagcgtaaccataacttgacaanaagagaaacgtagccagccatttacagg 139
              |||
Sbjct: 58319  tcctagcgttcacatgagcgtaaccataacttgacaanaagagaaacgtagccagccatttacagg 58378
Arr21: 1830

Insert_SINS: 01_09_64
Query: 140     tttgatctctctgtgcaaaaatgtttttgattttactgt 179
              |||
Sbjct: 58379  tttgatctctctgtgcaaaaatgtttttgattttactgt 58418
Arr21: 1890
```


- lokalizace inserce *dSpm* v genomové sekvenci *ARR21* pomocí sekvenace PCR produktů



≡ VZDĚLÁVÁNÍ

# Identifikace role genu *ARR21*

- Předpokládaný přenašeč signálu u dvoukomponentního signálního systému *Arabidopsis*
- Mutant identifikován vyhledáváním v databázi inzerčních mutantů (SINS-sequenced insertion site) pomocí programu BLAST
- Exprese *ARR21* u standardního typu a Inhibice exprese u inzerčního mutantu potvrzena na úrovni RNA




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Identifikace role genu *ARR21* analýza expresního profilu

## Standardní typ



## Inzerční mutant



# Identifikace role genu *ARR21*

- Předpokládaný přenašeč signálu u dvoukomponentního signálního systému *Arabidopsis*
- Mutant identifikován vyhledáváním v databázi inzerčních mutantů (SINS-sequenced insertion site) pomocí programu BLAST
- Exprese *ARR21* u standardního typu a Inhibice exprese u inzerčního mutantu potvrzena na úrovni RNA
- Analýza fenotypu inzerčního mutantu





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Identifikace role genu *ARR21* analýza fenotypu inzerčního mutanta

- Analýza citlivosti k regulátorům růstu rostlin
  - 2,4-D a kinetin
  - etylén
  - světlo různých vlnových délek
- Doba kvetení i počet semen nezměněn



# Identifikace role genu *ARR21* možné příčiny absence odchylek fenotypu u inzerčního mutanta



- Funkční redundance v rámci genové rodiny?



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Identifikace role genu *ARR21* příbuznost jednotlivých ARR genů u *Arabidopsis*




ZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Identifikace role genu *ARR21* možné příčiny absence odchylek fenotypu u inzerčního mutanta

- Funkční redundance v rámci genové rodiny?
- Fenotypový projev pouze za velmi specifických podmínek (?)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky




# Inzerční mutagenese ve funkční genomice *Arabidopsis thaliana*

- Gen *ARR21* identifikován pomocí srovnávací analýzy genomu *Arabidopsis*
- Na základě analýzy sekvence byla předpovězena jeho funkce
- Byla prokázána místně specifická exprese genu *ARR21* na úrovni RNA
- Inzerční mutagenese v případě identifikace funkce genu *ARR21* ve vývoji *Arabidopsis* byla neúspěšná, pravděpodobně v důsledku funkční redundance v rámci genové rodiny



# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico*

## struktura genů


- struktura genů
  - promotor
  - počátek transkripce
  - 5 UTR
  - počátek translace
  - místa sestřihu
  - stop kodon
  - 3 UTR
  - polyadenylační signál



# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů *ab initio*
  - zanedbání 5' a 3' UTR
  - identifikace počátku translace (ATG) a stop kodonu (TAG, TAA, TGA)
  - nalezení donorových (většinou GT) a akceptorových (AG) míst sestřihu
  - většina ORF není skutečně kódujícími sekvencemi – u *Arabidopsis* je asi 350 mil. ORF na každých 900 bp (!)
  - využití různých statistických modelů (např. Hidden Markov Model, HMM, viz doporučená studijní literatura, Majoros et al., 2003) k posouzení a ohodnocení váhy identifikovaných donorových a akceptorových míst




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů *ab initio*
  - programy pro predikci míst sestřihu (specifita přibližně 35%)
    - GeneSplicer ([http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene\\_spl.html](http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene_spl.html))
    - SplicePredictor (<http://deepc2.psi.iastate.edu/cgi-bin/sp.cgi>)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů

## What do the output columns mean?


SplicePredictor. Version of February 13, 2005.  
Date run: Wed Nov 9 11:30:14 2005

Species: Homo sapiens  
Model: 2-class Bayesian  
Prediction cutoff (2 ln[BF]): 3.00  
Local pruning: on  
Non-canonical sites: not scored

Sequence 1: your-sequence, from 1 to 9490.

### Potential splice sites

t	q	loc	sequence	P	c	rho	gamma	*	P*R*(
A	<--	75	ttttttgatctcAGat	0.973	7.16	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	134	attattttttcAGtt	0.999	14.86	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	500	gattttgttttAGtc	0.977	7.48	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	780	tctgttattgtatAGct	0.986	8.56	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	848	tattttttgaaatAGat	0.968	6.80	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1051	caatttttttaAGaa	0.930	5.19	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1213	ttattttttttAGtt	0.998	12.14	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1373	ttctctctcacAGga	0.999	13.17	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1487	ttataatattgatAGtg	0.883	4.04	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1581	atgtgttctgtAGga	0.982	8.03	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	1781	gggtgtgcgaatAGgg	0.886	4.10	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	2440	taataaaaattAGat	0.939	5.46	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	2479	catctaaaattAGat	0.942	5.59	0.000	0.000	7	(5 1
D	---->	2546	aagTtagta	0.909	4.61	0.885	1.903	15	(5 5
A	<--	2572	ttttttttggcAGca	0.930	5.16	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	2763	ctcaaatccaaaAGgt	0.873	3.86	0.185	0.000	11	(5 5
A	<--	2782	tttcttttcattAGcg	0.952	5.98	0.220	0.000	11	(5 5
A	<--	3022	ttgtttgtactaAGct	0.956	6.16	0.221	0.000	11	(5 5
A	<--	3048	cttgcacaatcAGga	0.973	7.15	0.229	0.000	11	(5 5
A	<--	3171	cgctgcattttAGta	0.988	8.74	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	3284	ctttttgtatacAGgg	0.993	10.03	0.000	0.006	8	(5 1
A	<--	3451	aatccttctcgtAGaa	0.916	4.77	0.293	0.065	12	(5 5
D	---->	3649	cacGTatta	0.933	5.25	0.000	1.848	11	(5 1
A	<--	4254	attattgttttcAGat	0.998	12.82	0.000	0.002	8	(5 1
A	<--	4351	tttcttacatgcAGaa	0.991	9.42	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	4633	gtttttttttttAGgg	0.879	3.97	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	4976	cttgtgtttttcAGct	0.952	5.98	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	5004	ttttttttttgcaAGg	0.996	11.17	0.000	0.000	7	(5 1
D	---->	5356	caagTgaat	0.821	3.04	0.387	0.000	11	(5 5
D	---->	5384	ttgTtaaga	0.941	5.54	0.478	0.090	13	(5 5
A	<--	5403	actctgtttcttAGct	0.894	4.26	0.000	0.000	7	(5 1
A	<--	5441	ctttctctctaacAGaa	0.995	10.43	0.387	0.000	11	(5 5
A	<--	5472	ttgttaaaattacAGct	0.965	6.62	0.478	0.090	13	(5 5
D	---->	5745	gcgTtaaga	0.991	9.48	0.990	1.956	15	(5 5
A	<--	5808	catcatatcctaaAGgt	0.948	5.83	0.458	0.000	11	(5 5
A	<--	6135	ggctcattattatAGgt	0.999	13.59	0.508	0.050	12	(5 5
A	<--	6552	ggattttcacctcAGag	0.938	5.42	0.000	0.000	7	(5 1



# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů *ab initio*
  - programy pro predikci míst sestřihu (specifita přibližně 35%)
    - GeneSplicer ([http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene\\_spl.html](http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene_spl.html))
    - SplicePredictor (<http://deepc2.psi.iastate.edu/cgi-bin/sp.cgi>)
    - NetGene2 (<http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/>)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů

## Prediction done

\*\*\*\*\* NetGene2 v. 2.4 \*\*\*\*\*

The sequence: Sequence has the following  
Length: 9490 nucleotides.  
31.8% A, 17.0% C, 19.6% G, 31.7% T, 0.0% N

Donor splice sites, direct strand

pos 5'->3'	phase	strand	con
1704	0	+	
1906	0	+	
4134	0	+	
4619	1	+	
4915	0	+	
5356	0	+	
5384	1	+	
5809	1	+	
6057	0	+	
6096	1	+	
7369	0	+	
7886	0	+	
9323	0	+	

Donor splice sites, complement strand

pos 3'->5' pos 5'->3' phase strand con

Acceptor splice sites, direct strand

pos 5'->3'	phase	strand	con
1213	0	+	
1221	2	+	
1373	0	+	
1487	1	+	
4254	0	+	
4832	2	+	
5004	0	+	
5472	1	+	
6135	0	+	
6490	1	+	
6744	0	+	
7447	0	+	
7780	2	+	
7786	2	+	

0.92 TCAGATAC AACACATGCA



CBS >> Prediction Servers >> NetGene2

## NetGene2 Server

The NetGene2 server is a service producing neural network predictions of splice sites in human, *C. elegans* and *A. thaliana*

Instructions Output format Abstract Performance

### SUBMISSION

Submission of a local file with a single sequence:

File in FASTA format

Browse...

- Human
- C. elegans*
- A. thaliana*

Clear fields Send file

Submission by pasting a single sequence:

Sequence name

- Human
- C. elegans*
- A. thaliana*



Sequence

GAGGAGGCACAAAACCGAATATACAAAATGATCTTAAACAGCTAAACTATATTGGACATTTTTCGATC  
TCAGATATA  
AAAGATTTTCATCAATAAATACTGGATAAACTCTTATATATTTTCTTTAGTTTATTAATAAAAAACCT  
CTAATAAAT  
ACGAGTTTAAGTCAAAAATCGCTTAGACTAAAATACACCATATAAATTTCAAACGATAAAGTTTACAAAA

Clear fields Send file

NOTE: The submitted sequences are kept confidential and will be erased immediately after processing.

CCGAATGCCGAGATATGTTTCCTAAATGAGATGATGTTTTATTTACCATGATTTGTTGTACTAAGCTTCCTTTCCCTTTGCAATACATAGGATAAATTCATACATGTTCCCTAATTTATTTT  
GGCTTAGCGACTCTATAACCAAGGATTTTACTCTACTAACARAAATAAATAGGTACTAAACAACATGATTCGAAGGAAGGGGAAACGTTAGTCTATCTATATTAAAGTATGTACAGGATTAATAAAA  
BpuEI BglII  
TGCACTTGAGTTATGGTTTCTTTGGTGGAGATCTATATGTATCTATCTATATATTTTACTCTTTCTTGGTGGCTATTATAGTATATATATATGCACACACACACACCTATGTATAGCTC  
AGCATAAATATCATATAATAATATATAGTGTGTGTGTGGATATACATATCGAG



AAGAGTCCCTTCATTTACCGAAGATCCGGACAAAGCTAGTTCCGAGATTGAAA  
TTCTCCAGCAGATAAATGGCTTCTAGAGGCTGTTCAGATCAAGGCTCTAACCTT  
K E V A S P T E D L R I B L V S E I E



CE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  
OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost





# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů


- odchyly rozpoznávání míst sestřihu u rostlin v praxi - příklad vývojové plasticity (nejen) rostlin
  - identifikace mutanta s bodovou mutací (tranzice G→A) přesně v místě sestřihu na 5' konci 4. exonu



# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů *ab initio*
  - programy pro predikci míst sestřihu (specifita přibližně 35%)
    - GeneSplicer ([http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene\\_spl.html](http://www.tigr.org/tdb/GeneSplicer/gene_spl.html))
    - SplicePredictor (<http://deepc2.psi.iastate.edu/cgi-bin/sp.cgi>)
    - NetGene2 (<http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/>)
  - programy pro predikci exonů
    - 4 typy exonů (podle polohy):
      - iniciační
      - vnitřní
      - terminální a
      - jednoduché
    - programy kromě rozpoznávání míst sestřihu zohledňují i strukturu jednotlivých typů exonů
- iniciační:
  - Genescan (<http://genes.mit.edu/GENSCAN.html>)
  - GeneMark.hmm (<http://opal.biology.gatech.edu/GeneMark/>)



- interní:

- MZEF <http://rulai.cshl.org/tools/genefinder/>




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky



# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů

- Funkční význam sestřihu v nepřekládaných oblastech - důležitá regulační součást genů



aaagttaca...

K V T...

aaagttaca...


- V případě CK11 pokus prokázat tento způsob regulace genové exprese pomocí transgenních linií nesoucích *uidA* pod kontrolou dvou verzí promotoru, zatím nepotvrzeno



# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů *ab initio*
  - programy pro genové modelování
    - zohledňují také další parametry, např. návaznost ORF
      - **Genescan** (<http://genes.mit.edu/GENSCAN.html>)  
velice dobrý pro predikci exonů v kódujících oblastech (testováno na genu *PDR9*, identifikoval všech 23 (!) exonů)
      - **GeneMark.hmm** (<http://opal.biology.gatech.edu/GeneMark/>)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů

Eukarvotic GeneMark.hmm<sup>(1,2)</sup> [\(Reload this page\)](#)

## Result of last submission:

[View PDF Graphical Output](#)

[GeneMark.hmm Listing](#)

Go to: [GeneMark.hmm Protein Translations](#)

Go to: [Job Submission](#)

Eukariotic GeneMark.hmm version bp 3.9 April 25, 2008  
 Sequence name: CK11  
 Sequence length: 5043 bp  
 G+C content: 38.79%  
 Matrices file: /home/genmark/euk\_gmm/matrices/athaliana  
 Thu Oct 1 11:09:24 2009

Predicted genes/exons

Gene #	Exon #	Strand	Exon Type	Exon Range	Exon Length
1	1				
1	1				
1	1				
1	4	+	Internal	2266 - 2544	3
1	5	+	Internal	2734 - 3317	5
1	6	+	Internal	3397 - 4529	12
1	7	+	Terminal	4709 - 4921	2

[Procházet...](#)

Species:  Athaliana ES-30 [Model description](#)

Output Options

Email Address: (required for graphical output or sequences longer than 4000)



- Generate PDF graphics (screen)
- Generate PostScript graphics (email)
- Print GeneMark 2.4 predictions in addition to GeneMark.hmm pred
- Translate predicted genes into protein

Run

[Default](#)  
[Start GeneMark.hmm](#)



**est** MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



UZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
 Evropským sociálním fondem  
 a státním rozpočtem České republiky

# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů

- vyhledávání genů podle homologií
  - porovnávání s EST databázemi
    - **BLASTN** (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>, <http://workbench.sdsc.edu/>)
  - porovnávání s proteinovými databázemi
    - **BLASTX** (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/>, <http://workbench.sdsc.edu/>)
    - **Genewise** (<http://www.ebi.ac.uk/Wise2/>)
      - porovnávají proteinovou sekvenci s genomovou DNA (po zpětném překladu), je nutná znalost aminokyselinové sekvence
  - porovnávání s homologními genomovými sekvencemi z příbuzných druhů
    - **VISTA/AVID** (<http://www.lbl.gov/Tech-Transfer/techs/lbn1690.html>)




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání
  - genomová kolinearita a genová homologie



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky




# Predikce funkce genů *in silico*

## vyhledávání genů


- genomová kolinearita a genová homologie
  - genomy příbuzných druhů se přes značné odlišnosti vyznačují podobnostmi v uspořádání i sekvencích, možnost využití při identifikaci genů u příbuzných organismů pomocí vyhledávání v databázích
  - obecné schéma postupu při využívání genomové kolinearit (také „komparativní genomika“) při experimentální identifikaci genů příbuzných organismů:
    - mapování malých genomů s využitím nízkokopiových DNA markerů (např. RFLP)
    - využití těchto markerů k identifikaci orthologních genů (genů se stejnou nebo podobnou funkcí) příbuzného organismu
    - malý genom (např. rýže, 466 Mbp) může sloužit jako vodítko, kdy jsou identifikovány molekulární nízkokopiové markery (např. RFLP) ve vazbě s genem zájmu a tyto oblasti jsou pak použity jako sonda při vyhledávání v BAC knihovnách při identifikaci orthologních oblastí velkých genomů (např. ječmene nebo pšenice, 5000, resp. 16000 Mbp)



# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů-genomová kolinearita




Feuillet and Keller, 2002



# Predikce funkce genů *in silico* vyhledávání genů

- genomová kolinearita a genová homologie

- genomy příbuzných druhů se přes značné odlišnosti vyznačují podobnostmi v uspořádání i sekvencích, možnost využití při identifikaci genů u příbuzných organismů pomocí vyhledávání v databázích
- obecné schéma postupu při využívání genomové koliearity (také „komparativní genomika“) při experimentální identifikaci genů příbuzných organismů:



- mapování malých genomů s využitím nízkokopiových DNA markerů (např. RFLP)
- využití těchto markerů k identifikaci orthologních genů (genů se stejnou nebo podobnou funkcí) příbuzného organismu
- malý genom (např. rýže, 466 Mbp, 46-55 tis. genů) může sloužit jako vodítko, kdy jsou identifikovány molekulární nízkokopiové markery (např. RFLP) ve vazbě s genem zájmu a tyto oblasti jsou pak použity jako sonda při vyhledávání v BAC knihovnách při identifikaci orthologních oblastí velkých genomů (např. ječmene nebo pšenice, 5000, resp. 16000 Mbp)





- zejména využitelné u trav (např. využití příbuznosti u ječmene, pšenice, rýže a kukuřice)
- malé genomové přestavby (dalece, duplikace, inverze a translokace menší než několik cM) jsou pak detekovány podrobnou sekvenční komparativní analýzou



během evoluce dochází u příbuzných druhů k odchylkám především v nekódujících oblastech (invaze retrotransponů atd.)

# Genomová kolinearita

- Genomová kolinearita HOX genů u živočichů
  - Transkripční faktory řídící organizaci těla v antero-posteriorní ose
  - Pozice genů v genomu odpovídá i prostorové expresi během vývoje



# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání
  - genomová kolinearita a genová homologie
- Experimentální identifikace genů
  - příprava genově obohacených knihoven pomocí technologie metylačního filtrování



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Experimentální identifikace genů

- příprava genově obohacených knihoven pomocí technologie metylačního filtrování
  - geny jsou (většinou!) hypometylované, kdežto nekódující oblasti jsou metylované
  - využití bakteriálního RM systému, který rozpoznává metylovanou DNA pomocí rest. enzymů McrA a McrBC
    - McrBC rozpoznává v DNA metylovaný cytozin, který předchází purin (G nebo A)
    - pro štěpení je nutná vzdálenost těchto míst z 40-2000 bp
  - schéma postupu při přípravě BAC genomových knihoven pomocí metylačního filtrování:
    - příprava genomové DNA bez příměsí organelární DNA (chloroplasty a mitochondrie)
    - fragmentace DNA (1-4 kbp) a ligace adaptorů
    - příprava BAC knihovny v *mcrBC*+ kmeni *E. coli*
    - selekce pozitivních klonů
  - omezené využití: obohacení o kódující DNA o pouze cca 5-10 %



# Základy genomiky II.

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání
  - genomová kolinearita a genová homologie
- Experimentální identifikace genů
  - příprava genově obohacených knihoven pomocí technologie metylačního filtrování
  - EST knihovny





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Experimentální identifikace genů

- příprava EST knihoven

- izolace mRNA
- RT PCR
- ligace linkerů a syntéza druhého řetězce cDNA
- klonování do vhodného bakteriálního vektoru
- transformace do bakterií a izolace DNA (amplifikace DNA)
- sekvenace s použitím primerů specifických pro použitý plasmid
- uložení výsledků sekvenace do veřejné databáze



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky



# Základy genomiky II.

## shrnutí

- Postupy „přímé“ a reverzní genetiky
  - rozdíly v myšlenkových přístupech k identifikaci genů a jejich funkcí
- Predikce funkce genů *in silico*
  - struktura genů a jejich vyhledávání
  - genomová kolinearita a genová homologie
- Experimentální identifikace genů
  - příprava genově obohacených knihoven pomocí technologie metylačního filtrování
  - EST knihovny




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky

# Základy genomiky II.

## diskuse



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována  
Evropským sociálním fondem  
a státním rozpočtem České republiky