


Stavba ložiskových těles

Martin Kontár

Konkordantní tělesa

- Uložena souhlasně s okolními horninami
- Např. uhelná sloj



a) rudní vrstva

c) rudní pruh

e) misovité rudní tleso

g) korytovité rudní tleso

b) rudní poleha


d) klenbovité rudní tleso

f) sedlovité rudní tleso

h) flexurovité rudní tleso

Diskordantní

- Uložena nesouhlasně s okolními horninami
- Např. různé typy žil



a) rudní žila

c) rudní peň

e) rudní komínovité těleso

b) rudní sloup

d) žilníková zóna

f) rudní bochníkovité těleso

Omezení těles vůči okolí

- A) **ostré** – taková tělesa pak bývají označována jako **kontrastní**: např. žilná ložiska
- B) **neostré** (příp. nevýrazné) – tato tělesa bývají označována jako **nekontrastní**: např. různé typy žilníků

Časový vztah ložisek a okolních hornin


- A) **syngenetická** ložiska – jedná se o ložiska, jež vznikala současně s horninami, v nichž jsou uložena, např. sedimentární železné rudy, ložiska uhlí
- B) **epigenetická** ložiska – ložiska, jež vznikla později, než jejich okolí, např. rudní žíly

Textura a struktura


- **Textura** – je dána prostorovým uspořádáním minerálních agregátů, jejich orientací, složením apod., sledujeme makroskopicky
- **Struktura** – je dána tvarem, velikostí a prostorovým uspořádáním krystalů či jejich úlomků v minerálních agregátech, pozorovatelná mikroskopicky

Struktury – pod mikroskopem


a) rovnoměrně zrnitá




b) nerovnoměrně zrnitá




c) lišťovitá




d) vláknitá




e) zonální




f) krystalograficky orientovaná




g) srůstová




h) náhradová



ch) kataklastická




i) kolomorfní




Textura

a) skvrnitá




a

b) páskovaná



b

c) krustifikační
+ drůzovitá




c

d) prožilková



d

e) kokardovitá




e

f) oolitická




f

g) kolomorfní




g

h) brekciiová




h

ch) brekciavitá



ch


i) kostrovitá buněčná
textura



i


Izometrická tělesa

- Podobné rozměry ve všech směrech
- Pně




- Poměrně velká tělesa: 10ky až 100ky m, např. solné pně, rudné pně

- Žilníky



- Vnitřní stavba tělesa (splet žilek)
- Hydrotermální a magmatické metasomatity
- Ložiska porfyrůvých rud


Izometrická tělesa



Řez deltu řeky Niger (Nigérie) znázorňující solné diapiry (pně), www.geology.cz


Izometrická tělesa

- Hnízda



- Menší tělesa do desítek m, např. magmatogenní metasomatity – greiseny, skarny


- Kapsy



- Ložiska exogenních akumulací, jež vznikla splachy ložiskových nerostů do např. krasových závrtů, např. Mn rudy

Deskovitá tělesa


- Vrstvy i žíly – jsou v prostoru často variabilní, často rovněž ukončena vyhluchnutím (zmenšením obsahu užitkových komponent)
- Vrstvy




- Typický morfologický tvar sedimentárních těles
- Takováto syngenetická i epigenetická ložiska se označují jako **stratiformní**
- Ložiska vázaná na určitou vrstvu nebo souvrství se označují **stratidependentní** (např. rolové útvary v pískovci)
- Uhelná ložiska
- Sedimentární Fe rudy

Deskovitá tělesa

- Žíly




- Typické pro epigenetická ložiska, zejména pro hydrotermální
- Jednoduchá či složené, pravé či ložní
- Okolí žil často postiženo alterací



- 1) švová žila
- 2) komorovitá
- 3) žebříkovitá
- 4) zpeřená


Sloupovitá tělesa

- A) Sloupovité zrudnění v hydrotermálních žilách



- Časté u hydrotermálních ložisek
- Rudní sloupy mohou být vyvinuty na křížení žil nebo i v plochách s výskytem odlišných hornin

- B) Diatremové vyvřeliny



- Vzácný typ ložisek
- Diamantonosné kimberlitové diatremy
- Karbonatity
- Převažující hloubkový rozměr nad šírkou
- Často oválný půdorys

Zadání: určete relativní stáří hornin a jejich typ.

Horniny: pískovec, granit, fluorit – barytová mineralizace

