


Zuzana Došlá, Roman Plich, Petr Sojka

NEKONEČNÉ ŘADY S PROGRAMEM MAPLE



Úvodní stránka

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 1 z 261



Obsah

Seznam obrázků	5
Seznam animací	7
Předmluva	9
1 Nekonečné číselné řady – základní pojmy	13
1.1 Součet řady	14
1.2 Operace s číselnými řadami	29
2 Číselné řady s nezápornými členy	40
2.1 Kriteria konvergence	40
3 Řady absolutně a neabsolutně konvergentní	65
3.1 Alternující řady	66

Obsah

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 2 z 261

3.2	Absolutní konvergence číselných řad	70
3.3	Přerovnávání řad	77
4	Součin řad a numerická sumace řad	88
4.1	Součin řad	88
4.2	Numerická sumace	95
5	Posloupnosti a řady funkcí	101
5.1	Pojmy posloupnost a řada funkcí	102
5.2	Stejněměrná konvergence	106
5.3	Kritéria stejněměrné konvergence	109
5.4	Vlastnosti stejněměrně konvergentních posloupností a řad funkcí .	116
6	Mocninné řady	127
6.1	Obor konvergence	128
6.2	Vlastnosti a součet mocninné řady	140
6.3	Taylorova a Maclaurinova řada	147
7	Užití mocninných řad	170
7.1	Přibližný výpočet funkčních hodnot	170
7.2	Určování funkčních hodnot logaritmu	176
7.3	Výpočet limit	178
7.4	Přibližný výpočet integrálů	181
7.5	Řešení diferenciálních rovnic pomocí mocninných řad	185



Obsah

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 3 z 261

8	Fourierovy řady	193
8.1	Fourierovy řady vzhledem k systému $\{\varphi_n(x)\}$	194
8.2	Fourierovy řady vzhledem k systému $\{\cos nx, \sin nx\}$	202
8.3	Konvergence Fourierovy řady	209
9	Videoukázky	239
9.1	Klip1: přednáška – nekonečné číselné řady	239
9.2	Klip2: cvičení – řešené příklady na konvergenci řad	243
9.3	Klip3: přednáška – nekonečné řady funkcí	246
	Výsledky cvičení	249
	Použitá literatura	254
	Rejstřík	256



Obsah

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 4 z 261



Seznam obrázků

1.1	Posloupnost částečných součtů řady $\sum \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$	22
1.2	Sierpiňského koberec pro $n = 2$ a $n = 3$	35
2.1	Dolní odhad integrálu $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$ pomocí součtu řady	59
2.2	Horní odhad integrálu $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$ pomocí součtu řady	59
3.1	Monotonie posloupnosti $\left\{ \frac{1}{n - \ln n} \right\}$	69
3.2	Přerovnaná Leibnizova řada se součtem 1,8	84
3.3	Částečné součty přerovnané Leibnizovy řady	84
3.4	Přerovnaná Leibnizova řada se součtem 0,7	85
3.5	Částečné součty přerovnané Leibnizovy řady	85
3.6	Přerovnaná Leibnizova řada se součtem $-0,6$	86
3.7	Částečné součty přerovnané Leibnizovy řady	86
5.1	Posloupnosti funkcí $\{x^n\}$ a $\{\arctg nx\}$	104
5.2	Částečné součty řady $\sum_{k=1}^\infty \frac{\sin kx}{k}$ pro $x \in [0, 2\pi]$	114

Seznam obrázků

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 5 z 261

5.3	Částečný součet řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ pro $n = 45$	115
6.1	Funkce $\ln(1+x)$ a její Maclaurinovy polynomy	151
6.2	Funkce $(1+x)^3$ a její Maclaurinovy polynomy	157
6.3	Funkce e^{-x^2} a její Maclaurinovy polynomy	160
8.1	Funkce x^2 , $x \in (-\pi, \pi)$ a její Fourierův polynom pro $n = 3$	216
8.2	Periodické rozšíření funkce x^2 , $x \in (-\pi, \pi)$	222
8.3	Periodické rozšíření funkce x^2 a jeho Fourierův polynom pro $n = 0$	222
8.4	Periodické rozšíření funkce x^2 a jeho Fourierův polynom pro $n = 2$	223
8.5	Periodické rozšíření funkce x^2 a jeho Fourierovy polynomy	223
8.6	Periodické rozšíření funkce e^x , $x \in (0, 2\pi)$	225
8.7	Sudé periodické rozšíření funkce x , $x \in (0, \pi)$	226
8.8	Periodické rozšíření funkce x , $x \in (-1, 1)$	227
8.9	Funkce $\operatorname{sgn}(x)$, $x \in (-\pi, \pi)$ a její Fourierův polynom pro $n = 3$	231
8.10	Periodické rozšíření funkce $\operatorname{sgn}(x)$ a jeho Four. polynom pro $n = 1$	232
8.11	Periodické rozšíření funkce $\operatorname{sgn}(x)$ a jeho Four. polynom pro $n = 5$	232
8.12	Periodické rozšíření funkce $\operatorname{sgn}(x)$ a jeho Fourierovy polynomy	234



Seznam obrázků

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 6 z 261



Seznam animací

Taylorovy rozvoje

Funkce e^x v bodě $x_0 = -2$

Funkce e^{-x^2} v bodě $x_0 = 0$

Funkce $\ln(1+x)$ v bodě $x_0 = 0$

Funkce $\sin x$ v bodě $x_0 = 0$

Funkce \sqrt{x} v bodě $x_0 = 1$

Funkce $\frac{1}{x}$ v bodě $x_0 = 3$

Fourierovy rozvoje

Funkce x^2 na intervalu $(-\pi, \pi)$

Funkce x^2 na intervalu $(0, 2\pi)$

Funkce $\operatorname{sgn} x$ na intervalu $(-\pi, \pi)$

Funkce e^x na intervalu $(0, 2\pi)$

Seznam animací

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 7 z 261

Funkce e^x na intervalu $(-1, 1)$


Funkce $|x|$ na intervalu $(-1, 1)$

Funkce x na intervalu $(-1, 1)$

$$\text{Funkce } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - x) & \text{pro } x \in [0, \pi] \\ -\frac{1}{2}(\pi + x) & \text{pro } x \in [-\pi, 0] \end{cases} \text{ na intervalu } (0, \pi)$$

$$\text{Funkce } f(x) = \begin{cases} x & \text{pro } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{pro } x \in [-\pi, 0] \end{cases} \text{ na intervalu } (-\pi, \pi)$$

$$\text{Funkce } f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{pro } x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ -\cos x & \text{pro } x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \text{ na intervalu } (0, \pi)$$



Seznam animací

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 8 z 261



Předmluva

Když jsme v roce 1999 vydávali první CD-ROM *Matematická analýza s programem Maple*, uvedli jsme, že v příštích letech plánujeme pokračovat v edici dalšími partiemi matematické analýzy. Jsme rádi, že díky finanční podpoře FRVŠ můžeme tento záměr realizovat a studentům nabídnout další díl, tentokrát věnovaný tématu *Nekonečné řady*.

Tento CD-ROM je učebním textem nového typu využívající možnosti současné výpočetní techniky. Ukazuje moderní způsob výuky matematické analýzy, kdy prostřednictvím počítačových technologií se student učí matematickou analýzu a naopak.


Používaná symbolika je shodná se symbolikou užívanou v [13, 14]; zejména symbol \mathbb{N} označuje množinu všech přirozených čísel, symbol \mathbb{Z} označuje množinu všech celých čísel, symbol \mathbb{R} množinu všech reálných čísel a \mathbb{R}^* značí rozšířenou množinu reálných čísel, tj. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

Stejně jako Diferenciální počet funkcí více proměnných jsou i Nekonečné řady tématem vhodným pro počítačově podporovanou výuku. Zejména rozvoje funkcí

Předmluva

[Rejstřík](#)[Obsah](#)[Verze k tisku](#)[Zpět](#)[Videa](#)[Dif. počet](#)[Zavřít](#)[Konec](#)[Strana 9 z 261](#)


do mocninných a Fourierových řad se programem Maple velmi pěkně graficky ilustrují.

Při výkladu probírané problematiky pomocí Maplu jsme se snažili o dodržování následujícího postupu: Nejdříve je problém řešen „krok za krokem“ tak, jak bychom postupovali při řešení pomocí „tužky a papíru“, Maple je používán pouze k dílčím výpočtům. Pokud je to dále možné, následuje zobecnění a automatizace řešení problému pomocí Mapleovského programovacího jazyka. Tyto části jsou v textu označeny pomocí , další příklady je pak možno nalézt v odpovídajících zápisnicích v adresáři Maple. Při tvorbě nových procedur byl důraz kladen především na jejich jednoduchost – tak, aby je byli studenti schopni psát v rámci cvičení z Maplu. Často je tedy potlačováno testování korektnosti zadávání vstupních parametrů, důraz je především kladen na vlastní algoritmus výpočtu. Komentáře v zápisnicích jsou psány bez diakritiky, protože Maple zatím není lokalizován v českém jazyce. Mapleovské zápisníky jsou určeny pro verzi Maple 7, většinou jsou však použitelné i ve verzi Maple V 5.1.

Ve srovnání s prvním CD-ROMem přinášíme dvě novinky v počítačovém zpracování. První novinkou jsou animace, pomocí nichž lze pohyblivě znázorňovat rozvoje funkcí do nekonečných řad. Věříme, že tyto animace pomohou studentům pochopit význam mocninných a Fourierových řad a rozdíl mezi nimi.

Druhou novinkou je videozáznam přednášky, sloužící k repetitoriu daného tématu. Obsahuje tři sekvence, přehled základní teorie o nekonečných číselných řadách, ukázkou řešení několika typických příkladů a přehled základní teorie o řadách funkcí.

Základem pro vznik CD-ROMu se stal učební text Došlá Z., Novák V.: *Nekonečné řady*, MU 1999 a 2002 a Mapleovské zápisníky s ukázkami řešení příkladů a novými procedurami. Pro čtenáře, kteří licenci Maplu nevlastní přinášíme i roz-



Předmluva

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec


Strana 10 z 261

šířené HTML verze některých zápisníků, které je možno číst libovolným z webových prohlížečů. Pomocí těchto prohlížečů je možno přehrávat i všechny uvedené animace.

Vlastní text je opět uložen ve formátu PDF (Portable Document Format), který je standardem pro elektronickou publikační činnost a je nezávislý na platformě. Kromě jiného umožňuje prostřednictvím křížových odkazů rychle vyhledávat souvislosti napříč celým textem. Text se nachází na CD ve dvou variantách; design první (kterou čtete) je optimalizován pro čtení na obrazovce obvyklého barevného monitoru, design druhé verze je vhodný pro tisk na formát A4. Nově přidáváme odkazy na videosekvence (jsou na CD-ROM v adresáři `video`) a na PDF soubory s animacemi (vyžadují však Acrobat Reader verze alespoň 5).

Videonahrávka byla pořízena s pomocí laboratoře **LEMMA** Fakulty informatiky MU v Brně. I když jde o simulovanou přednášku, byla natáčena naostro bez opakování záběrů. Nese proto prvky autentičnosti, včetně několika nepřesností odborných a jazykových. Uvádíme toto video s přesvědčením, že učební text oživí a posune vývoj podobných učebních textů opět o krůček dopředu. Pro lepší čitelnost textu napsaného během přednášky na tabuli jsou tyto texty uvedeny v kapitole 9 na straně 239.

CD-ROM je určen pro posluchače bakalářského studia matematiky, fyziky, informatiky, a dále všem zájemcům o výuku matematické analýzy s využitím počítače a uživatelům CAS systému Maple. Spojení textu, grafiky, počítačových vstupů, výstupů, animací a videonahrávky se shrnutím základních pojmů probíraného tématu by mělo vytvořit prostředí sloužící k maximálně efektivnímu zvládnutí probírané problematiky.



Předmluva

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 11 z 261

CD-ROM dále obsahuje inovovanou verzi textu Diferenciální počet více proměnných, a to zase ve dvou verzích: [verzi optimalizovanou pro čtení na obrazovce](#) a [verzi optimalizovanou pro tisk](#)


Některé materiály z CD-ROMu jsou uloženy také na webové stránce projektu <http://www.math.muni.cz/~plch/nkpm/>.

Závěrem bychom rádi poděkovali studentům Přírodovědecké fakulty P. Křížovi a K. Šrotovi za Mapleovské zápisníky k mocninným a Fourierovým řadám, studentům Fakulty informatiky P. Kynčlové za animace k části Diferenciální počet funkcí více proměnných, M. Liškovi, V. Holerovi, P. Hromkovi a kolegovi R. Haklovi za pomoc při natáčení a M. Rollerovi a T. Závodnému za pomoc při střihu a zpracování videa. Dále děkujeme kolegyni L. Langerové za účinkování při natáčení přednášky a panu A. Kalinovi za vytvoření instalačního programu a grafickou úpravu instalační brožurky CD-ROMu.

Tento CD-ROM vznikl za podpory Fondu rozvoje VŠ v rámci řešení projektu č. 801/2002.

Brno, prosinec 2002

Autoři



Předmluva

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 12 z 261



Kapitola 1

Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Teorie nekonečných číselných řad vznikla ve druhé polovině 17. století spolu s utvářením infinitezimálního počtu. Mnohé myšlenky zrály řadu století, než se přiblížily dnešní podobě. V průběhu vývoje se někteří matematikové dopustili při počítání s řadami omylů, zejména v době, kdy nebyl pojem konvergence řady konstituován, a také v době, kdy panovala jakási hrůza z nekonečna. Tímto problémem se od počátku zabývali nejenom matematikové, ale i filozofové.

Například Zenon z Eleje (490–430 př.n.l.) považoval za nemožné, že by nekonečný součet kladných čísel mohl být konečné číslo; připomeňme jeho aporii¹ *Achilles a želva*: „Rychlonohý Achilles nikdy nedožene želvu, jestliže se želva nachází v nějaké vzdálenosti před ním.“ Se součty nekonečných geometrických řad již pracoval (aniž používal dnešní symboliku) Archimedes (287–212 př. n. l.),

¹aporie – slepá ulička rozumu

Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 13 z 261

když určoval kvadraturu paraboly; první nekonečnou řadu, která nebyla geometrická, sečetl na základě fyzikálních úvah až ve středověku (kolem roku 1350) R. Swineshead.

V celé historii matematiky byla snaha zodpovědět dvě základní otázky pro počítání s nekonečnými číselnými řadami:


Jak sečíst nekonečnou (přesněji spočetnou) množinu čísel?

Platí pro nekonečné součty podobné zákony jako pro konečné součty, zejména zákon distributivní, asociativní a komutativní?

Odpověď na obě otázky ukážeme v průběhu prvních čtyř kapitol, které jsou věnovány nekonečným číselným řadám. Cílem první kapitoly je zavést pojem součet řady a ukázat některé základní operace s číselnými řadami.

1.1. Součet řady

Ze střední školy je dobře známa nekonečná geometrická řada. Postup použitý při určení jejího součtu, tj. vytvoření tzv. částečných součtů a provedení limitního přechodu, je návodem pro obecnou definici.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 14 z 261

Definice 1.1. Necht' $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel. Symbol

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{nebo} \quad a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad (1.1)$$

nazýváme *nekonečnou číselnou řadou*. Posloupnost $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, kde

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad \dots, \quad s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad \dots,$$

nazýváme *posloupnost částečných součtů* této řady.


Existuje-li vlastní limita $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *konverguje* a má součet s . Neexistuje-li vlastní limita $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverguje*.

Nekonečná řada je tedy symbol $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nebo $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$, kde $\{a_n\}$ je daná posloupnost. K tomuto symbolu je přiřazena posloupnost částečných součtů $\{s_n\}$. Prvky posloupnosti $\{a_n\}$ nazýváme členy řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, kde a_n je n -tý člen. Číslo s_n nazýváme n -tým částečným součtem této řady.

V případě, kdy řada diverguje, rozlišujeme tři případy:

- ▷ Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$, říkáme, že řada určitě diverguje k $+\infty$;
- ▷ Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = -\infty$, říkáme, že řada určitě diverguje k $-\infty$;
- ▷ Jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ neexistuje, říkáme, že řada osciluje.

Má-li konvergentní řada $\sum a_n$ součet s , píšeme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$. Je-li řada divergentní k $\pm\infty$, píšeme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$, případně $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\infty$.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 15 z 261

Příklad 1.1. Vyšetřete, kdy konverguje nekonečná geometrická řada

$$a + aq + \dots + aq^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}, \quad \text{kde } a \neq 0, q \neq 0,$$

a určete její součet.

Řešení. Postupujeme podle Definice 1.1: určíme s_n a provedeme limitní přechod.

a) Nechť $q = 1$. Pak $s_n = na$ a platí $\lim s_n = \lim na = \pm\infty$, tj. řada $\sum_{n=1}^{\infty} a$ je divergentní.

b) Nechť $q = -1$. Řada má tvar $a + (-a) + \dots + (-1)^{n-1}a + \dots$, takže částečný součet je

$$s_n = \begin{cases} 0 & \text{pro sudé } n, \\ a & \text{pro liché } n. \end{cases}$$

Posloupnost $\{0, a, 0, a, \dots\}$ nemá limitu, proto je tato řada oscilující.

c) Nechť $|q| \neq 1$. Platí $s_n = a + aq + \dots + aq^{n-1}$. Užítím vztahu

$$(1 - q)(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = 1 - q^n$$

dostaneme


$$s_n = a(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = a \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Uvažujme následující případy:

pro $|q| < 1$ je $\lim q^n = 0$, proto $\lim s_n = \frac{a}{1-q}$;

pro $q > 1$ je $\lim q^n = \infty$, proto $\lim s_n = \pm\infty$;

pro $q < -1$ limita $\lim q^n$ neexistuje.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 16 z 261

Proto je geometrická řada pro $|q| \geq 1$ divergentní a pro $|q| < 1$ konvergentní. V tomto případě je její součet

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}, \quad |q| < 1.$$



Příklad 1.2. Určete součet řady:

a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

b)
$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

d)
$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

e)
$$\arctg \frac{1}{2} + \arctg \frac{1}{8} + \dots + \arctg \frac{1}{2n^2} + \dots$$

Řešení. Ve všech případech postupujeme podle Definice 1.1: určíme n -tý částečný součet s_n dané řady a provedením limitního přechodu určíme její součet.

a) Výraz pro člen a_n rozložíme v součet parciálních zlomků $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Pak

$$s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1},$$

Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 17 z 261

a proto

$$s = \lim s_n = \lim \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

b) Postupujeme obdobně: provedeme rozklad členu a_n v součet parciálních zlomků, tj.

$$\frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{A}{3n-2} + \frac{B}{3n+1}.$$

Z rovnice $1 = (3n-2)B + (3n+1)A$ plyne $B = -\frac{1}{3}$, $A = \frac{1}{3}$, tj.


$$\frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right).$$

Pak

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{3n-5} - \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right), \end{aligned}$$

a proto

$$s = \lim s_n = \lim \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{1}{3}.$$



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 18 z 261

Ukážeme si nyní řešení s využitím programu Maple.

```
> rada:=Sum(1/((3*n-2)*(3*n+1)), n=1..infinity);
```

$$rada := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$


Rozklad členu a_n v součet parciálních zlomků provedeme pomocí příkazu `convert`:

```
> convert(op(1,rada), 'parfrac', n);
```

$$\frac{1}{3} \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3} \frac{1}{3n+1}$$

Pro zjednodušení určování n -tého částečného součtu zadané řady vytvoříme proceduru `poslcase` (`expr`, `down`, `k`), kde `expr` je výraz odpovídající a_n , `down` je dolní mez řady a `k` je přirozené číslo, udávající kolik členů posloupnosti částečných součtů si přejeme vypsat. Procedura vypíše prvních k členů posloupnosti částečných součtů, její n -tý člen a pokud je to možné vrátí součet zadané řady.

```
> poslcase := proc (a, b, d) local i, j, s, e;  
> s := 0; j := 0;  
> for i from b to d+b-1 do  
> j := j+1; s := s+eval(subs(n = i, a));  
> lprint(evaln(s[j]) = s)  
> od;  
> e := sum(a, n = b .. n);  
> lprint(evaln(s[n]) = e);  
> Sum(a, n = b .. infinity) =  
> limit(e, n = infinity)  
> end;
```



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 19 z 261

Použití této procedury při řešení uvedeného příkladu dává tento výstup:

```
> poslcass(op(1,rada),1,5);
```

```
s[1] = 1/4
```

```
s[2] = 2/7
```

```
s[3] = 3/10
```

```
s[4] = 4/13
```

```
s[5] = 5/16
```

```
s[n] = 1/3-1/3/(3*n+1)
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3}$$


Pro kontrolu výpočtu můžeme použít i příkaz sum.

```
> Sum(1/((3*n-2)*(3*n+1)), n=1..infinity)=
```

```
> sum(1/((3*n-2)*(3*n+1)), n=1..infinity);
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3}$$

Pro vykreslení grafu posloupnosti částečných součtů můžeme použít proceduru `sumpLOTS(Sum(rada, n=a..b))`, viz Obr. 1.1.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 20 z 261


```

> sumplots := proc (rada)
> local term, n, a, b, psum, m, points,
> i, c, sn, p1, p2;
> if nargs = 2 then c := args[2]
> else c := 0 fi;
> if typematch(rada, ('Sum')(term::algebraic,
> n::name = a::integer .. b::integer))
> then psum := '@'(evalf,
> unapply(Sum(term,n = a .. a+m-1),m));
> points := [seq([[i, psum(i)+c],
> [i+1, psum(i)+c]], i = 1 .. b-a+1)];
> points := map(op,points);
> p1 := PLOT(CURVES(points),AXESLABELS(n,"s[n]"));
> sn := evalf(c+sum(term,n = a .. infinity))
> else
> ERROR("expecting a Sum structure as input") fi;
> if sn < infinity then
> p2 := plot(sn,n = a .. b,linestyle = 4);
> display({p2, p1})
> else p1 fi
> end:
> sumplots(Sum(op(1,rada),n=1..20));

```

c) Platí

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n},$$



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 21 z 261





Obr. 1.1: Posloupnost částečných součtů řady $\sum \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 22 z 261

odkud po vydělení dvěma plyne

$$\frac{s_n}{2} = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \cdots + \frac{n}{2^{n+1}}.$$

Odečtením druhé rovnice od první dostaneme

$$\frac{s_n}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}},$$

tj.

$$s_n = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} \right).$$


Jelikož

$$\lim \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1, \quad \lim \frac{n}{2^{n+1}} = 0,$$

je součet řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \lim s_n = 2.$$

Jiný způsob určení součtu této řady ukážeme v Příkladu 6.3 pomocí součtu mocninné řady. Z historického hlediska je tato řada první negeometrickou řadou, u které byl určen její součet. Určil ho středověký matematik Richard Swineshead v knize *Liber calculationum* napsané kolem roku 1350, když řešil tuto fyzikální úlohu: *Jaká je průměrná rychlost v hmotného bodu s počáteční rychlostí v_0 v časovém intervalu $t \in [0, 1]$, který se pohybuje takto: během první poloviny časového*



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 23 z 261

intervalu konstantní rychlostí, během další čtvrtiny intervalu rychlostí, která je dvojnásobkem počáteční rychlosti, během následující osminy intervalu se pohybuje rychlostí, která je trojnásobkem počáteční rychlosti atd. až do nekonečna.

Využijeme-li výše odvozený součet řady, dostaneme

$$v = \frac{s}{t} = s_1 + s_2 + \dots = v_0 \cdot \frac{1}{2} + 2v_0 \cdot \frac{1}{4} + \dots = v_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n}{2^n} + \dots \right) = 2v_0,$$

tj. průměrná rychlost během celého časového intervalu se bude rovnat dvojnásobku počáteční rychlosti.

d) Platí

$$a_1 = \sqrt{3} - 2\sqrt{2} + 1$$

$$a_2 = \sqrt{4} - 2\sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$a_3 = \sqrt{5} - 2\sqrt{4} + \sqrt{3}$$

$$\vdots$$


$$a_{n-2} = \sqrt{n} - 2\sqrt{n-1} + \sqrt{n-2}$$

$$a_{n-1} = \sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1}$$

$$a_n = \sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$$

Z uvedeného schématu je zřejmé, že $s_n = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$, a proto

$$\begin{aligned} s &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1 - \sqrt{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = \\ &= 1 - \sqrt{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 1 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 24 z 261

e) Pro $|x| < 1$, $|y| < 1$ platí vztah

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x + y}{1 - xy}.$$

Užitím tohoto vztahu postupně dostáváme

$$s_2 = a_1 + a_2 = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{16}} = \operatorname{arctg} \frac{2}{3}$$

$$s_3 = s_2 + a_3 = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{18} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{18}}{1 - \frac{2}{3 \cdot 18}} = \operatorname{arctg} \frac{3}{4}$$


⋮

$$s_n = s_{n-1} + a_n = \operatorname{arctg} \frac{n-1}{n} + \operatorname{arctg} \frac{1}{2n^2} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{n-1}{n} + \frac{1}{2n^2}}{1 - \frac{n-1}{2n^3}} =$$

$$= \operatorname{arctg} \frac{n(2n^2 - 2n + 1)}{2n^3 - n + 1} = \operatorname{arctg} \frac{n(2n^2 - 2n + 1)}{(2n^2 - 2n + 1)(n + 1)} = \operatorname{arctg} \frac{n}{n + 1}.$$

Součet řady je

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{n}{n + 1} = \frac{\pi}{4}.$$



Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 25 z 261

Příklad 1.3. Vyjádřete ve tvaru zlomku v základním tvaru číslo $0,2\overline{15}$.

Řešení. Platí

$$\begin{aligned} 0,2\overline{15} &= \frac{2}{10} + \left(\frac{15}{10^3} + \frac{15}{10^5} + \dots \right) = \frac{2}{10} + \frac{15}{10^3} \left(1 + \frac{1}{10^2} + \dots \right) = \\ &= \frac{2}{10} + \frac{15}{10^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10^2}} = \frac{1}{5} + \frac{15}{10 \cdot 99} = \frac{1}{5} + \frac{1}{66} = \frac{71}{330}. \end{aligned}$$

Následující věta udává nutnou podmínku konvergence řady.


Věta 1.1. Jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, pak platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Důkaz. Necht' $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$. Tedy $\lim s_n = s \in \mathbb{R}$, a protože $a_n = s_n - s_{n-1}$, plyne odtud $\lim a_n = \lim(s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$. \square

Je třeba si uvědomit, že opak této věty neplatí. Je-li totiž pro řadu splněna podmínka $\lim a_n = 0$, pak z ní konvergence řady ještě neplyne. Tuto skutečnost ilustruje následující příklad.

Příklad 1.4. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ se nazývá *harmonická*. V této řadě je každý člen harmonickým průměrem dvou sousedních členů, tj. platí

$$\frac{1}{a_n} = \frac{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}{2}.$$



Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 26 z 261

Řada splňuje nutnou podmínku konvergence, neboť $\lim \frac{1}{n} = 0$. Ukažme, že je tato řada divergentní. K tomuto účelu provedeme následující odhady:


$$\begin{aligned}
 s_1 &= 1 \\
 s_2 &= 1 + \frac{1}{2} \\
 s_4 &= s_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > s_2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \\
 s_8 &= s_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1 + \frac{3}{2} \\
 s_{16} &= s_8 + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} > 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{16} + \\
 &\quad + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = 1 + \frac{4}{2} \\
 &\vdots \\
 s_{2^n} &> 1 + \frac{n}{2}
 \end{aligned}$$

Posloupnost $\{s_n\}$ je rostoucí, proto má buď vlastní limitu nebo nevlastní limitu ∞ . Tutéž limitu má i vybraná posloupnost $\{s_{2^n}\}$; avšak z nalezeného odhadu plyne $s_{2^n} \rightarrow \infty$, a proto také $\lim s_n = \infty$. Proto harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ určitě diverguje.

Jak ukážeme později, divergenci této řady lze dokázat velmi jednoduše pomocí integrálního kritéria.

Harmonická řada byla první řadou, u níž byla poprvé ukázána divergence řady. Učinil to právě uvedeným způsobem francouzský matematik Nicole Oresme (1323–1382).

Bezprostředně z Definice 1.1 plyne tato věta:



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 27 z 261

Věta 1.2. *Necht' $p \in \mathbb{N}$. Řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n$ současně buď konvergují nebo divergují. Jestliže konvergují, pak platí*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + \cdots + a_p + \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n.$$

Poznámka 1.1. Z předcházející věty plyne, že na konvergenci, resp. divergenci řady nemá vliv chování konečného počtu jejích členů. Proto budeme užívat tuto úmluvu:

▷ pokud nějaký předpoklad nemusí platit pro konečný počet členů, budeme říkat, že platí pro *skoro všechna* n , tj. platí až od jistého indexu počínaje;

▷ pokud budeme vyšetřovat konvergenci (divergenci) řady, budeme místo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ psát jen $\sum a_n$.

Nutnou a postačující podmínkou konvergence řady je následující věta, kterou budeme používat v dalších důkazech; k praktickým výpočtům není příliš vhodná.


Lemma 1.1 (Cauchyovo-Bolzanovo kritérium konvergence).

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní právě tehdy, když posloupnost jejích částečných součtů je cauchyovská, tj. pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ a libovolné $m \in \mathbb{N}$ platí

$$|s_{n+m} - s_n| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+m}| < \varepsilon.$$

Důkaz. Plyne z Definice 1.1 a z úplnosti prostoru \mathbb{R} , což znamená, že každá posloupnost v \mathbb{R} je konvergentní právě tehdy, když je cauchyovská (viz např. [3]).

□



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 28 z 261

1.2. Operace s číselnými řadami

Zdrojem omylů mnoha matematiků byla skutečnost, že s nekonečnými součty nelze zacházet jako s konečnými součty. Uveďme příklad z historie: italský matematik Guido Grandi (1671–1742) uvažoval řadu

$$1 + (-1) + 1 + (-1) + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n ;$$

dnes se tato řada nazývá *Grandiho řada*. Tato řada diverguje, protože $s_1 = 1$, $s_2 = 0$, $s_3 = 1$, \dots , tj. limita s_n neexistuje.

Danou řadu lze uzávorkovat dvojím způsobem a dostaneme tyto řady:

▷ řada $1 + [(-1) + 1] + [(-1) + 1] + \dots$ konverguje, neboť $s_n = 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $s = \lim s_n = 1$;


▷ řada $[1 + (-1)] + [1 + (-1)] + \dots$ konverguje, neboť $s_n = 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $s = \lim s_n = 0$.

Jedná se o tři různé řady, kde první diverguje a druhé dvě konvergují, neboli uzávorkováním se porušila divergence řady.

Grandiho výpočet byl následující:

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0 + 0 + 0 + \dots = (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots = \\ &= 1 - (1 - 1) - (1 - 1) - (1 - 1) - \dots = 1 - 0 - 0 - 0 - \dots = \\ &= 1, \end{aligned}$$

což si Grandi vyložil jako symbol stvoření světa bohem z ničeho. To vyvolalo bouřlivou polemiku, které se kromě Grandiho zúčastnil Leibniz, Nicolaus Bernoulli



Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 29 z 261

a jiní. V těchto diskusích se upřesňovaly pojmy součet nekonečné číselné řady, konvergence a divergence těchto řad. Grandi se dopustil dvou omylů: zkoumaná řada je divergentní, proto nemá konečný součet a kromě toho při svém výpočtu použil asociativní zákon, který obecně pro nekonečné řady neplatí.



Základní operací s nekonečnými řadami je součet dvou konvergentních řad:

Věta 1.3. *Budte $\sum a_n$, $\sum b_n$ konvergentní řady a necht' $\sum a_n = s$, $\sum b_n = t$. Pak je konvergentní i řada $\sum (a_n + b_n)$ a platí $\sum (a_n + b_n) = s + t$.*

Důkaz. Označme $\{s_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$, $\{t_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum b_n$, $\{w_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum (a_n + b_n)$. Pak je $\lim s_n = s$, $\lim t_n = t$ a $w_n = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n) = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = s_n + t_n$. Odtud plyne $\lim w_n = \lim (s_n + t_n) = s + t$, tj. $\sum (a_n + b_n) = s + t$. \square

Poznámka 1.2. Necht' $\sum a_n = s$, $\sum b_n = t$ jsou konvergentní řady a necht' $a_n \leq b_n$ pro všechna n . Pak $s \leq t$. Vskutku, pro posloupnosti částečných součtů $\{s_n\}$ a $\{t_n\}$ těchto řad platí $s_n \leq t_n$ pro všechna n , a proto i limita $s \leq t$.

Následující větu můžeme chápat jako analogii distributivního zákona pro konečné součty.

Věta 1.4. *Jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, pak pro libovolné $k \in \mathbb{R}$ konverguje též řada $\sum_{n=1}^{\infty} k \cdot a_n$ a platí*

$$\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 30 z 261

Naopak, konverguje-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$, kde $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Důkaz. Necht' $\sum a_n$ konverguje, $\sum a_n = s$. Označíme-li $\{s_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$, $\{t_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum ka_n$, je $\lim s_n = s$ a pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $t_n = ka_1 + ka_2 + \dots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = ks_n$. Odtud plyne $\lim t_n = ks$, tj. $\sum ka_n = ks$.

Necht' naopak konverguje $\sum ka_n$ a $k \neq 0$. Podle již dokázané první části věty pak konverguje řada $\sum \frac{1}{k}(ka_n) = \sum a_n$. \square

Poznámka 1.3. Tvrzení Věty 1.3 lze zřejmě úplnou indukcí rozšířit na libovolný konečný počet sčítanců. Navíc lze podle Věty 1.4 nahradit součet uvažovaných řad jejich libovolnými lineárními kombinacemi.

Z konvergence řady $\sum (a_n + b_n)$ však naopak neplyne konvergence řad $\sum a_n$, $\sum b_n$, jak ukazuje příklad řad $\sum (-1)^{n-1}$, $\sum (-1)^n$.


Příklad 1.5. Dokažte konvergenci a najděte součet řady

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5 \cdot 4^n - 3^{n+1}}{6^n}. \quad (1.2)$$

Řešení. Obě řady $\sum \frac{4^n}{6^n} = \sum (\frac{2}{3})^n$, $\sum \frac{3^n}{6^n} = \sum (\frac{1}{2})^n$ konvergují a jejich součet je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

Podle Věty 1.3 a 1.4 je konvergentní i řada (1.2) a její součet je roven $s = 5 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 9$.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 31 z 261

Z příkladu Grandiho řady je zřejmé, že mezi členy nekonečné číselné řady nelze libovolně rozmístit závorky. Pouze v případě konvergentní řady můžeme sdružovat její členy, aniž se změní její součet. Tato skutečnost je zformulována v následující větě, která bývá nazývána asociativním zákonem pro konvergentní řady.

Věta 1.5. *Necht' $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní řada a necht' $\{n_k\}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Položme $n_0 = 0$ a pro $k \in \mathbb{N}$ označme*


$$b_k = a_{n_{k-1}+1} + a_{n_{k-1}+2} + \cdots + a_{n_k}.$$

Pak řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje a platí

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Důkaz. Označíme-li $\{s_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$, $\{t_k\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum b_k$, pak platí $t_k = s_{n_k}$, takže posloupnost $\{t_k\}$ je vybrána z posloupnosti $\{s_n\}$. Podle věty o vybraných posloupnostech (viz např. [13]) posloupnost $\{t_k\}$ konverguje a platí $\lim t_k = \lim s_n$, tj. $\sum b_k = \sum a_n$. \square

Poznámka 1.4. Asociativní zákon znamená zákon o sdružení – v řadě můžeme jednotlivé členy sdružovat (uzávorkovat), aniž se změní její součet. Tedy Větu 1.5 lze vyslovit takto: Konverguje-li řada $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$, pak konverguje i řada $(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots + (a_{n_{k-1}+1} + a_{n_{k-1}+2} + \cdots + a_{n_k}) + \cdots$ a má též součet. Obrácené tvrzení však neplatí. Z konvergence řady $(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots$ obecně neplyne konvergence řady $a_1 + a_2 + \cdots$, jak ukazuje úvodní příklad o Grandiho řadě.



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 32 z 261

Analogie třetího, komutativního zákona o záměně, resp. o přerovnávání členů řady, obecně pro konvergentní řady neplatí. Jak ukážeme v Kapitole 3, k jeho platnosti je třeba silnější vlastnost řady, tzv. absolutní konvergence.



Cvičení

1.1. Určete součet těchto řad:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+3)}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+5)}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+2^n}{6^n}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{2}{3^{n-1}} \right)$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4^{2n-1}} + \frac{2}{4^{2n}} \right)$$

1.2. Vyjádřete ve tvaru zlomku v základním tvaru:

$$a) -0,\overline{12} \quad b) 0,53\overline{9}$$

1.3. Rozhodněte, zda konvergují tyto řady:

Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 33 z 261

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\arctg n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2n^2+1}$


1.4. S využitím nekonečné geometrické řady řešte rovnice v \mathbb{R} :

a) $\log x + \log \sqrt{x} + \log \sqrt[4]{x} + \log \sqrt[8]{x} + \dots = 2$

b) $1 - \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg}^3 x + \dots = \frac{\operatorname{tg} 2x}{1 + \operatorname{tg} 2x}$



1.5. Do čtverce o délce strany 2 je vepsán čtverec, jehož strany jsou spojnicemi středů stran daného čtverce. Do vepsaného čtverce je stejným způsobem vepsán další čtverec atd. Vypočítejte součet obvodů a součet obsahů všech takovýchto čtverců.

1.6. Vypočtete obsah obrazce utvořeného z nekonečně mnoha obdélníků, jestliže se délky jejich vodorovných stran zmenšují v poměru 4 : 1 a délky jejich svislých stran se zvětšují v poměru 1 : 2., přičemž obsah výchozího obdelníka je 48 cm². (Tuto úlohu řešil N. Oresme ve svém traktátu *O konfiguraci kvalit*, kde naznačil konstrukce útvarů, které mají nekonečné rozměry, ale konečný obsah).




Nekonečné číselné řady – základní pojmy

[Rejstřík](#)[Obsah](#)[Verze k tisku](#)[Zpět](#)[Videa](#)[Dif. počet](#)[Zavřít](#)[Konec](#)[Strana 34 z 261](#)



Obr. 1.2: Sierpińskiego koberec pro $n = 2$ a $n = 3$

1.7. Určete obsah následujícího obrazce (tzv. *Sierpińskiego koberec*): Jednotkový čtverec rozdělíme na devět shodných čtverců a odstraníme vnitřek prostředního čtverce. Každý ze zbývajících čtverců rozdělíme znovu na devět shodných čtverečků a znovu odstraníme v každém z nich jeho střední čtvereček. Po třetím kroku takové operace dostaneme útvar zobrazený na Obrázku 1.2. Když tuto operaci prodloužíme do nekonečna, dostaneme útvar, který se nazývá Sierpińskiego koberec.



Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 35 z 261

🌿 Sierpińského koberec lze v Maplu vykreslit pomocí procedury sierpkob(n), kde parametr n udává úroveň iterace.

```
> sierpkob:=proc(n)
> local x,y,d,i,j;
> global s,kr,sez,poms,kre,sq;
> s:=[x,y],[x+d,y],[x+2*d,y],[x,y+d],[x+2*d,y+d],
> [x,y+2*d],[x+d,y+2*d],[x+2*d,y+2*d];
> kr:=POLYGONS([s[5],s[8],s[7],[x+d,y+d]]);
> x:=0;y:=0;d:=1/3;
> kre:=kr;sez:=s;poms:=sez;
> sq:=POLYGONS([[0,0],[1,0],[1,1],[0,1]]);
> COLOR(RGB,0,1,0));
> for i to n-1 do
> d:=d/3;
> for j to nops([sez]) do
> x:=sez[j,1];y:=sez[j,2];
> poms:=poms,s; kre:=kre,kr;
> od; sez:=poms; od;
> PLOT(kre,sq,AXESSTYLE(NONE),
> SCALING(CONSTRAINED));
> end;
> o:=array(1..2):
> o[1]:=sierpkob(2):
> o[2]:=sierpkob(3):
> display(o);
```



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 36 z 261

Obsah jednotkového čtverce je roven jedné a od tohoto obsahu budeme odečítat obsah odstraněných čtverců. Označme a_n obsah odstraněných čtverců v n -té iteraci a P hledaný obsah Sierpiňského koberce. V n -té iteraci odstraňujeme čtverce o straně $(\frac{1}{3})^n$ a jejich počet v n -té iteraci je 8^{n-1} . Pak tedy

$$a_n = 8^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^n = \frac{8^{n-1}}{9^n}.$$

Celkový obsah Sierpiňského koberce je pak

$$P = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^{n-1}}{9^n} = 1 - \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8}{9}\right)^{n-1} = 1 - \frac{1}{9} \frac{1}{1 - \frac{8}{9}} = 0.$$

Ukažme nyní výpočet v Maplu: nejdříve přímým výpočtem s využitím příkazu `sum` a poté pomocí nových procedur pro určování součtu geometrické řady.

```
> a[n] := 8^(n-1) / 9^n;
```

$$a_n := \frac{8^{(n-1)}}{9^n}$$


```
> P := 1 - Sum(a[n], n=1..infinity);
```

$$P := 1 - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^{(n-1)}}{9^n} \right)$$

```
> value(P);
```

0

Nyní vytvoříme vlastní procedury pro určování součtu geometrické řady – `kvocgeom` a `geom`:



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 37 z 261

```

> kvocgeom := proc (rada)
> local i; global operat, kvoc, b, a;
> b := expand(rada);
> if type(b, '+' ) then operat := nops(b);
> for i to operat do
> kvoc[i] := simplify(subs(n = n+1,
> op(i,b))/op(i,b));
> a[i] := simplify(op(i,b)/(kvoc[i]^(n-1)));
> lprint(evaln(kvoc[i]) = kvoc[i]);
> lprint(evaln(a[i]) = a[i]) od
> else
> operat := 1;
> kvoc := simplify(subs(n = n+1,b)/b);
> a := simplify(b/(kvoc^(n-1)));
> lprint(('kvoc') = kvoc); lprint(('a') = a) fi
> end:

```

Použití těchto procedur na vyšetřovanou řadu dává následující výstup:


```

> kvocgeom(a[n]);

kvoc = 8/9

a = 1/9
> geom := proc (k, fclen)
local s, i; s := 0;
if 1 < operat then for i
to operat
do s := s+fclen[i]/(1-k[i]) od
else s := fclen/(1-k) fi
end:

```



Nekonečné číselné řady – základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec


Strana 38 z 261

> geom(kvoc, a) ;


1

Dostali jsme tedy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^{n-1}}{9^n} = 1$. Obsah Sierpińského koberce je proto $P = 1 - 1 = 0$. 

1.8. Dokažte: Jestliže $\sum a_n$ konverguje, $\sum b_n$ určitě diverguje k $+\infty$, pak $\sum (a_n + b_n)$ určitě diverguje k $+\infty$. Jestliže $\sum a_n$ konverguje, $\sum b_n$ osciluje, pak $\sum (a_n + b_n)$ osciluje.



Špetka praxe vydá za tunu teorie.



Nekonečné číselné řady –
základní pojmy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 39 z 261



Kapitola 2

Číselné řady s nezápornými členy

Stanovení součtu řad bývá v jednotlivých případech obtížný úkol. Proto se při vyšetřování řad často orientujeme na zjištění, zda řada konverguje či diverguje, aniž bychom určovali její součet. Předmětem této kapitoly jsou právě tyto úlohy pro řady s nezápornými členy. Odvodíme tzv. *kritéria konvergence*, udávající postačující podmínky pro konvergenci, resp. divergenci řady.

2.1. Kritéria konvergence

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se nazývá řada s nezápornými (kladnými) členy, je-li $a_n \geq 0$ ($a_n > 0$) pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Tyto řady mají některé specifické vlastnosti: posloupnost jejich částečných součtů $\{s_n\}$ je neklesající, neboť $s_{n+1} = a_{n+1} + s_n \geq s_n$. Je-li navíc tato posloupnost shora ohraničená, pak existuje vlastní $\lim s_n$, tj. řada $\sum a_n$ je

Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 40 z 261

konvergentní. Proto řady s nezápornými členy jsou buď konvergentní nebo určitě divergentní k ∞ .

Věta 2.1 (Srovnávací kritérium). *Budte $\sum a_n, \sum b_n$ řady s nezápornými členy a necht' $a_n \leq b_n$ pro skoro všechna $n \in \mathbb{N}$. Potom platí: konverguje-li řada $\sum b_n$, konverguje i řada $\sum a_n$; diverguje-li řada $\sum a_n$, diverguje i řada $\sum b_n$.*

Důkaz. Důkaz provedeme pro případ, kdy platí $a_n \leq b_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Platí-li $a_n \leq b_n$ až od jistého indexu počínaje, je důkaz analogický. Buď $\{s_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$, $\{t_n\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum b_n$; zřejmě platí $s_n \leq t_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Konverguje-li $\sum b_n$, pak je $\{t_n\}$ konvergentní, a proto shora ohraničená, tj. existuje $k \in \mathbb{R}$ tak, že $t_n \leq k$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Pak je však i $s_n \leq k$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, tj. $\{s_n\}$ je shora ohraničená. Navíc je neklesající, a proto má vlastní limitu, tudíž $\sum a_n$ konverguje.


Diverguje-li $\sum a_n$, pak diverguje i $\sum b_n$, neboť kdyby $\sum b_n$ konvergovala, pak podle první části tvrzení by konvergovala $\sum a_n$, což je spor. \square

Příklad 2.1. Rozhodněte o konvergenci řady

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}, \quad \text{kde } a > 0, a \notin (1, 2).$$

Řešení. a) Danou řadu porovnáme s řadou $\sum \frac{1}{n(n+1)}$. Platí

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)n} \quad \text{pro } n \geq 2.$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 41 z 261

Řada $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ je, jak jsme ukázali v Příkladu 1.2-a), konvergentní, a proto je podle Věty 2.1 konvergentní i řada $\sum \frac{1}{n^2}$.

b) Necht' $a \geq 2$. Platí

$$\frac{1}{n^a} < \frac{1}{n^2} \quad \text{pro } n \in \mathbb{N},$$

a proto je v tomto případě řada $\sum \frac{1}{n^a}$ konvergentní.

Je-li $a = 1$, jde o harmonickou řadu $\sum \frac{1}{n}$, která je, jak jsme ukázali v Příkladu 1.4, divergentní. Je-li $a \in (0, 1)$, platí

$$\frac{1}{n^a} > \frac{1}{n} \quad \text{pro } n \in \mathbb{N},$$

a proto je podle Věty 2.1 divergentní i řada $\sum \frac{1}{n^a}$.

Celkem dostáváme, že řada $\sum \frac{1}{n^a}$ je konvergentní pro $a \geq 2$ a divergentní pro $a \in (0, 1]$. Jiný způsob řešení, kdy vyřešíme i zbývající případ $a \in (1, 2)$, uvedeme později (viz Příklad 2.6).

Věta 2.2 (Limitní srovnávací kritérium). *Bud'te $\sum a_n$, $\sum b_n$ řady s nezápornými členy a necht' existuje*


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Je-li $L < \infty$ a konverguje-li řada $\sum b_n$, pak konverguje i řada $\sum a_n$.

Je-li $L > 0$ a diverguje-li řada $\sum b_n$, pak diverguje i řada $\sum a_n$.

Důkaz. Necht' $L < \infty$ a $\sum b_n$ konverguje. K číslu $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ platí

$$L - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + \varepsilon,$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 42 z 261

odkud $a_n < (L + \varepsilon)b_n$. Protože $\sum (L + \varepsilon)b_n$ konverguje, konverguje podle srovnávacího kritéria (Věta 2.1) i řada $\sum a_n$.

Nechť $L > 0$ a $\sum b_n$ diverguje. Je-li $0 < L < \infty$, pak existuje $\varepsilon > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že $0 < L - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n}$ pro všechna $n \geq n_0$. Odtud $(L - \varepsilon)b_n < a_n$ a podle srovnávacího kritéria (Věta 2.1) je řada $\sum a_n$ divergentní. V případě $L = \infty$ existuje $K > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že $\frac{a_n}{b_n} > K$ pro všechna $n \geq n_0$. Podobně pak ze vztahu $a_n > Kb_n$ plyne divergence řady $\sum a_n$. \square

Poznámka 2.1. Jsou-li $\sum a_n, \sum b_n$ řady s nezápornými členy a platí-li $a_n \leq b_n$ pro skoro všechna $n \in \mathbb{N}$, nazývá se $\sum b_n$ majorantní řadou k řadě $\sum a_n$ a řada $\sum a_n$ minorantní řadou k řadě $\sum b_n$.

Příklad 2.2. Rozhodněte o konvergenci řady:


a) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$.

Řešení. a) Danou řadu porovnáme s harmonickou řadou $\sum \frac{1}{n}$, která je divergentní (Příklad 1.4). Podle l'Hospitalova pravidla určíme limitu

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{n}\right)'}{\left(\frac{1}{n}\right)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \cdot \cos \frac{\pi}{n} = \pi.$$

Protože $L > 0$ a řada $\sum \frac{1}{n}$ diverguje, je podle Věty 2.2 divergentní i řada $\sum \sin \frac{\pi}{n}$.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 43 z 261

b) Danou řadu porovnáme s řadou $\sum \frac{1}{n^2}$, která je, jak jsme ukázali v Příkladu 2.1, konvergentní. Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n^2})}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \left(\frac{1}{n^2}\right)'}{\left(\frac{1}{n^2}\right)'} = 1.$$

Podle Věty 2.2 konverguje také řada $\sum \ln(1 + \frac{1}{n^2})$.

 K výpočtu limit v limitním srovnávacím kritériu lze s výhodou využít Maplu. Řešení příkladu 2.2a) pak vypadá takto:

```
> rada:=Sum(sin(Pi/n), n=1..infinity);
```


$$rada := \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

```
> Limit(op(1,rada)/(1/n), n=infinity):%=value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) n = \pi$$

a tedy vyšetřovaná řada $\sum \sin \frac{\pi}{n}$ diverguje.

Poměrně jednoduchým cvičením je také naprogramování (napsání procedury) limitního srovnávacího kritéria v Maplu. Jedno z možných řešení vypadá např. takto:



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 44 z 261

```

> limsvok := proc (a) local b, L;
> if nargs = 1 then b := 1/n^2;
> L := limit(a/b, n = infinity);
> if evalf(L) < infinity
> then print(Sum(a,n = 1 ..infinity));
> print(konverguje) else b := 1/n;
> L := limit(a/b,n = infinity);
> if 0 < evalf(L) then
> print(Sum(a,n = 1 .. infinity));
> print(diverguje) else
> print(`tímto kritériem nelze rozhodnout`) fi
> fi
> elif nargs <> 3 then
> ERROR("chybny pocet parametru")
> elif args[3] = ('k') then b := args[2];
> L :=limit(a/b,n = infinity);
> if evalf(L) < infinity then
> print(Sum(a,n = 1 .. infinity));
> print(konverguje) else
> print(`tímto kritériem nelze rozhodnout`) fi
> elifargs[3] = ('d') then b := args[2];
> L := limit(a/b,n = infinity); if 0 < evalf(L)
> then print(Sum(a,n = 1 .. infinity));
> print(diverguje) else
> print(`tímto kritériem nelze rozhodnout`) fi
> else
> ERROR("treti parametr musi byt 'k' nebo 'd'")
> fi end:

```



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 45 z 261

Syntaxe příkazu je `limsrovk(rada, por, konv)`, parametr `por` je nepovinný a udává, s jakou řadou budeme porovnávat řadu `rada`. Použijeme-li parametr `por`, musíme také použít parametr `konv`, kterým určujeme, zda parametr `por` reprezentuje konvergentní či divergentní řadu. Za parametr `konv` dosazujeme `d` pro divergentní řadu, resp. `k` pro řadu konvergentní. Při volání procedury bez volitelných parametrů porovnááme s implicitně nastavenou divergentní řadou $\sum \frac{1}{n}$ a konvergentní řadou $\sum \frac{1}{n^2}$.

```
> limsrovk(op(1, rada));
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

diverguje

Tuto novou proceduru nyní využijeme při řešení příkladu 2.2b):

```
> limsrovk(ln(1+1/n^2), 1/n^2, 'k');
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

konverguje


K určování konvergence, resp. divergence číselných řad je možno použít i proceduru `csum` Roberta Israela z [Maple Advisor Database](#). Procedura je určena pro Maple 6 a vyšší a najdete ji i na CD-ROMU v adresáři `maple`.

Ověřme nyní předcházející výsledky pomocí této procedury:

```
> read 'csum4.txt':
```

```
> csum(op(1, rada), n);
```

false



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 46 z 261

> csum(ln(1+1/n^2), n);

true

Procedura vrací hodnotu `true` – řada konverguje, nebo `false` – řada diverguje. 🌿

Věta 2.3 (Odmocninové kritérium – Cauchyovo). Necht' $\sum a_n$ je řada s nezápornými členy.

(i) Platí-li pro všechna $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$, pak řada konverguje. Platí-li pro nekonečně mnoho $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, řada diverguje.

(ii) Existuje-li

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q, \quad \text{kde } q \in \mathbb{R}^*, \quad (2.1)$$

pak v případě $q < 1$ řada $\sum a_n$ konverguje a v případě $q > 1$ řada $\sum a_n$ diverguje.

Poznámka 2.2. Tvzení (ii) se nazývá *limitní odmocninové kritérium*. Poznamenejme, že je-li v (2.1) $q = 1$, nelze o konvergenci řady tímto kritériem rozhodnout.


Důkaz. Důkaz provedeme pro tvrzení (ii); důkaz tvrzení (i) probíhá analogicky.

Je-li $q < 1$, zvolme $\varepsilon > 0$ tak, aby platilo $q + \varepsilon < 1$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ je $\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon < 1$, odkud $a_n < (q + \varepsilon)^n$. Řada $\sum (q + \varepsilon)^n$ je konvergentní geometrická řada, proto podle srovnávacího kritéria (Věta 2.1) také $\sum a_n$ konverguje.

Je-li $q > 1$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ je $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, tj. $a_n \geq 1$ a není splněna nutná podmínka konvergence (Věta 1.1). Proto $\sum a_n$ diverguje. \square

Příklad 2.3. Vyšetřete konvergenci, resp. divergenci následujících řad:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\left(3 + \frac{1}{n}\right)^n} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad \text{c) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{[5 + (-1)^n]^n}.$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 47 z 261

Řešení. a) Užijeme limitní odmocninové kritérium (Věta 2.3 (ii)). Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(3 + \frac{1}{n})^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{3} < 1,$$

neboť podle l'Hospitalova pravidla je $\lim \sqrt[n]{n} = 1$. Proto daná řada konverguje.


Maplu opět nejdříve využijeme k výpočtu $\lim \sqrt[n]{a_n}$, poté napíšeme proceduru, která celý výpočet automatizuje.

```
> a[n] := n / (3 + 1/n)^n : Sum(a[n], n=1..infinity) ;
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(3 + \frac{1}{n})^n}$$

```
> Limit((a[n])^(1/n), n=infinity) : % = value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(3 + \frac{1}{n})^n} \right)^{\left(\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{3}$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 48 z 261


```

> odmock := proc (a) local q;
> q := evalf(limit(convert(surd(a,n),power),
> n = infinity));
> if q < 1 then print(Sum(a,n = 1 .. infinity));
> print(konverguje)
> elif 1 < q then
> print(Sum(a,n = 1 .. infinity));
> print(diverguje) else
> print(`tímto kritériem nelze rozhodnout`);
> fi end;
> odmock(a[n]);

```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\left(3 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

konverguje




b) K vyšetření opět použijeme limitní odmocninové kritérium (Věta 2.3 (ii)).

Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)^n.$$

Jedná se o neurčitý výraz typu 1^∞ , proto ho upravíme tak, abychom mohli použít l'Hospitalovo pravidlo. Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)}$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 49 z 261

a pro limitu v exponentu již můžeme použít l'Hospitalovo pravidlo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\left(\frac{2}{\pi} \arccos \frac{1}{n}\right)^{-1} \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^{-1/2} \left(\frac{1}{n}\right)'}{\left(\frac{1}{n}\right)'} = -\frac{2}{\pi}.$$

Hledaná limita je $e^{-\frac{2}{\pi}} < 1$, tj. daná řada konverguje.

c) Zde máme

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{2}{5 + (-1)^n} = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{pro liché } n, \\ \frac{1}{3} & \text{pro sudé } n. \end{cases}$$

Limitní odmocninové kritérium není použitelné. Protože však $\sqrt[n]{a_n} \leq \frac{1}{2}$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, z Věty 2.3 (i) plyne konvergence této řady.

Věta 2.4 (Podílové kritérium – d'Alembertovo). *Bud' $\sum a_n$ řada s kladnými členy.*


(i) *Platí-li pro všechna $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$, pak řada $\sum a_n$ konverguje. Platí-li pro všechna $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, pak řada $\sum a_n$ diverguje.*

(ii) *Existuje-li*

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q, \quad \text{kde } q \in \mathbb{R}^*, \quad (2.2)$$

pak v případě $q < 1$ řada $\sum a_n$ konverguje a v případě $q > 1$ řada $\sum a_n$ diverguje.

Poznámka 2.3. Tvrzení (ii) se nazývá *limitní podílové kritérium*. Poznamenejme, že je-li v (2.2) $q = 1$, nelze o konvergenci řady tímto kritériem rozhodnout.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 50 z 261

Důkaz. Opět provedeme důkaz tvrzení (ii); důkaz tvrzení (i) probíhá analogicky.

Je-li $q < 1$, zvolme $\varepsilon > 0$ tak, aby platilo $q + \varepsilon < 1$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ je

$$q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon, \quad \text{tj.} \quad (q - \varepsilon)a_n < a_{n+1} < (q + \varepsilon)a_n.$$

Odtud indukcí pro libovolné $k \in \mathbb{N}$ platí $a_{n_0+k} \leq (q + \varepsilon)^k a_{n_0}$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (q + \varepsilon)^n$ je konvergentní geometrická řada, proto podle srovnávacího kritéria (Věta 2.1) také $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n$ konverguje, a proto podle Věty 1.2 také $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.

Je-li $q > 1$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, tj. posloupnost $\{a_n\}$ je pro $n \geq n_0$ neklesající, a proto nemůže platit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ a $\sum a_n$ diverguje podle Věty 1.1. \square


Příklad 2.4. Rozhodněte o konvergenci řady:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

Řešení. a) Podle limitního podílového kritéria (Věta 2.4 (ii)) dostáváme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!(n+1)^{(n+1)}}{(n+1)!n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1,$$

proto řada $\sum \frac{n^n}{n!}$ diverguje.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 51 z 261

Postupujeme stejně jako v předcházejícím příkladě:

```
> a:=n->(n^n)/n!:Sum(a(n), n=1..infinity);
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$


```
> Limit(a(n+1)/a(n), n=infinity):%=value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{(n+1)} n!}{(n+1)! n^n} = e$$

```
> podilk := proc (a) local q;  
> q := evalf(limit(subs(n = n+1,a)/a,  
> n=infinity));  
> if q < 1 then print(Sum(a,n = 1 .. infinity));  
> print(konverguje)  
> elif 1 < q then  
> print(Sum(a,n = 1 .. infinity));  
> print(diverguje)  
> else print('tímto kriteriem nelze rozhodnout')  
> fi end;  
> podilk(a(n));
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

diverguje



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 52 z 261



b) Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n 2^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{(n+1)} \cdot 2^n \cdot n!} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{2}{e} < 1,$$

a proto daná řada konverguje podle Věty 2.4.

Pro porovnání limitního podílového a limitního odmocninového kritéria použijeme následující tvrzení:

Lemma 2.1. *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost kladných čísel. Pak platí*

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$


Zejména, je-li $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = a \in \mathbb{R}^$, je také $\lim \sqrt[n]{a_n} = a$.*

Důkaz. Dokážeme nerovnost $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}$; analogicky by se provedl důkaz vztahu $\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n}$. Označme $\limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$. Je-li $a = \infty$, je tvrzení triviální; necht' tedy $a \in \mathbb{R}$. Buď $b \in \mathbb{R}$, $b > a$ libovolné; existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ je $\frac{a_{n+1}}{a_n} < b$. Napíšeme-li tuto nerovnost pro n_0 , $n_0 + 1, \dots, n - 1$ ($n > n_0$) a všechny tyto nerovnosti vynásobíme, obdržíme $a_n < b^{n-n_0} a_{n_0}$, a proto

$$\sqrt[n]{a_n} < b^{\frac{n-n_0}{n}} \sqrt[n]{a_{n_0}}.$$

Ze spojitosti exponenciální funkce b^x plyne $\lim b^{\frac{n-n_0}{n}} = b$; dále platí $\lim \sqrt[n]{a_{n_0}} = 1$. Celkem $\lim b^{\frac{n-n_0}{n}} \sqrt[n]{a_{n_0}} = b$. To znamená, že je-li $\varepsilon > 0$ libovolné, existuje $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_1 \geq n_0$ tak, že pro $n \geq n_1$ je

$$b^{\frac{n-n_0}{n}} \sqrt[n]{a_{n_0}} < b + \varepsilon, \quad \text{tj.} \quad \sqrt[n]{a_n} < b + \varepsilon,$$



Číselné řady
s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 53 z 261

takže $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq b + \varepsilon$. Protože $\varepsilon > 0$ bylo libovolné, platí i $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq b$; protože $b > a$ bylo libovolné, plyne odtud $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq a$. \square

Z uvedeného lemmatu plyne, že je-li $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, je také $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$. Proto můžeme-li o konvergenci nebo divergenci nějaké řady s nezápornými členy rozhodnout podílovým kritériem, pak můžeme rozhodnout i odmocninovým kritériem – říkáme, že odmocninové kritérium je silnější než podílové kritérium.

Následující kritérium uvádíme bez důkazu; ten lze nalézt např. v [8, 15, 18].

Věta 2.5 (Limitní Raabeovo kritérium). *Nechť $\sum a_n$ je řada s kladnými členy a nechť existuje*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = q, \quad \text{kde } q \in \mathbb{R}^*.$$

Je-li $q > 1$, pak řada $\sum a_n$ konverguje; je-li $q < 1$, pak řada $\sum a_n$ diverguje.


Poznámka 2.4. Někdy se Raabeovo kritérium uvádí ve tvaru

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = q.$$

Lze ukázat, že Raabeovo kritérium je silnější než podílové kritérium – jestliže o konvergenci řady lze rozhodnout podílovým kritériem, pak lze rozhodnout i Raabeovým. Takto lze postupovat dále a odvozovat silnější kritéria. Naznačme, jak zjemňování kritérií probíhá.

Obecnějším kritériem je *Kummerovo kritérium*. Nechť $\{c_1, c_2, \dots, c_n, \dots\}$ je posloupnost reálných čísel taková, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ je divergentní. Nechť

$$K_n = c_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1}$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 54 z 261

a necht' existuje $\lim K_n = K$. Jestliže je $K > 0$, řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, jestliže $K < 0$, řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.

Ukažme, jak lze z tohoto obecnějšího kritéria odvodit podílové a Raabeovo kritérium.

- a) Položíme-li $c_n = 1$, pak $K_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$. Je-li $K = \lim(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) < 0$, tj. $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, pak řada diverguje. Je-li $K = \lim(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) > 0$, tj. $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, pak řada konverguje.
- b) Necht' $c_n = n$. Platí $K_n = n \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n + 1) = n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) - 1$. Je-li $\lim K_n = \lim n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) - 1 > 0$, tj. $\lim n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) > 1$, pak řada konverguje. Je-li $\lim K_n = \lim n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) < 1$, řada diverguje.


Existuje celá řada dalších kritérií pro ověření konvergence číselných řad s nezápornými členy, podrobnosti lze nalézt např. v [5]. Žádné z nich však není univerzální v tom smyslu, že bychom podle něj mohli rozhodnout o konvergenci (divergenci) libovolné řady s nezápornými členy. Takovým kritériem je pouze Cauchyovo-Bolzanovo kritérium (Lemma 1.1).

Příklad 2.5. Necht' $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Rozhodněte o konvergenci nebo divergenci řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)} \quad .$$

Řešení. Poznamenejme, že podílovým kritériem nelze o konvergenci rozhodnout, neboť $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. Raabeovo kritérium dává

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a n}{a + n + 1} = a.$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 55 z 261

Je-li tedy $a > 1$, řada konverguje, je-li $a < 1$, řada diverguje. Pro $a = 1$ obdržíme řadu $\sum \frac{n!}{(n+1)!} = \sum \frac{1}{(n+1)}$, tedy řadu harmonickou (bez prvního členu), která diverguje.

Důležitým kritériem je kritérium jiného typu než dosavadní, které nám také ukazuje souvislost mezi nekonečnými řadami a nevlastními integrály:

Věta 2.6 (Integrální kritérium). *Nechť f je funkce definovaná na intervalu $[1, \infty)$, která je na tomto intervalu nezáporná a nerostoucí. Necht' $f(n) = a_n$ pro $n \in \mathbb{N}$. Pak řada $\sum a_n$ konverguje právě tehdy, když konverguje nevlastní integrál $\int_1^\infty f(x) dx$.*

Důkaz. Především poznamenejme, že funkce f je integrovatelná na každém intervalu $[1, b]$, kde $b \in \mathbb{R}$, $b \geq 1$, neboť je monotonní. Označíme-li dále $F(t) = \int_1^t f(x) dx$, je F zřejmě neklesající na $[1, \infty)$. Protože f je nerostoucí na každém intervalu $[k, k+1]$, kde $k \in \mathbb{N}$, platí na tomto intervalu $a_{k+1} \leq f(x) \leq a_k$, tedy i


$$a_{k+1} = \int_k^{k+1} a_{k+1} dx \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \int_k^{k+1} a_k dx = a_k.$$

Sečtením těchto nerovností pro $k = 1, 2, \dots, n-1$ obdržíme

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1},$$

neboli $s_n - a_1 \leq F(n) \leq s_{n-1}$.

Necht' nyní řada $\sum a_n$ konverguje. Pak existuje $h \in \mathbb{R}$ tak, že $s_n \leq h$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, a proto také $F(n) \leq h$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Protože F je neklesající,



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 56 z 261

plyne odtud $F(t) \leq h$ pro $t \in [1, \infty)$. Podle věty o limitě monotonních funkcí existuje vlastní $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t)$, tj. konverguje nevlastní integrál $\int_1^\infty f(x) dx$.

Necht' naopak $\int_1^\infty f(x) dx$ konverguje. Pak je funkce F shora ohraničená na $[1, \infty)$, takže existuje $q \in \mathbb{R}$ tak, že $F(t) \leq q$ pro $t \in [1, \infty)$. Je tedy i $F(n) \leq q$ a odtud $s_n \leq a_1 + q$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Posloupnost $\{s_n\}$ je shora ohraničená a neklesající, proto má vlastní limitu, tj. řada $\sum a_n$ konverguje. \square

Příklad 2.6. Rozhodněte, zda konverguje řada:


a) $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln n}$

b) $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^a}$ pro $a > 0$.

Řešení. a) Užijeme integrální kritéria. Nejprve ověříme, zda je funkce $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ na intervalu $[2, \infty)$ nerostoucí. Platí $f'(x) = -\frac{1+\ln x}{(x \ln x)^2} < 0$, a proto je $f(x)$ na intervalu $[2, \infty)$ klesající. Zbývá vyšetřit, zda konverguje, resp. diverguje nevlastní integrál $\int_2^\infty \frac{1}{t \ln t} dt$. Přímým výpočtem dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_2^x \frac{1}{t \ln t} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{1}{y} dy = \lim_{x \rightarrow \infty} (\ln(\ln x) - \ln(\ln 2)) = \infty,$$

a proto daná řada diverguje.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavít

Konec

Strana 57 z 261

Maple dává následující výsledky:

```
> a:=n->1/(n*ln(n)):Sum(a(n), n=2..infinity);
```

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$$

Interval, kde je funkce kladná:

```
> solve(a(x)>=0,x);
```

RealRange(Open(1), ∞)

Interval, kde je funkce klesající:

```
> simplify(diff(a(x),x));
```

$$-\frac{\ln(x)+1}{x^2 \ln(x)^2}$$

```
> solve(%<=0);
```

RealRange(e^{-1} , Open(1)), RealRange(Open(1), ∞)

Ze získaného výsledku je vidět, že na intervalu $[2, \infty)$ jsou splněny předpoklady integrálního kritéria. Výpočtem integrálu dostáváme

```
> Int(a(x),x=2..infinity):%=value(%);
```


$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \infty$$

a proto daná řada diverguje. Výsledek ještě ověříme pomocí procedury csum:

```
> csum(a(n),n);
```

false

Na tomto příkladě ilustrujeme integrální kritérium. Ke grafickému znázornění použijeme následující příkazy:



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 58 z 261


```

> plot([a(n),a(floor(n+1))], n=2..12,
> color=[black,red]);
> plot([a(n),a(floor(n))], n=2..12,
> color=[black,green]);

```




Obr. 2.1: Dolní odhad integrálu pomocí součtu řady



Obr. 2.2: Horní odhad integrálu pomocí součtu řady

Na Obrázku 2.1 je uvedena funkce $y = \frac{1}{x \ln x}$ a schodovitá funkce $y = a(n+1)$ pro $x \in [n, n+1)$. Tento obrázek představuje dolní odhad integrálu pomocí součtu řady

$$a_3 + \dots + a_n \leq \int_2^{\infty} f(x) dx.$$



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 59 z 261

Na Obrázku 2.2 je uvedena funkce $y = \frac{1}{x \ln x}$ a schodovitá funkce $y = a(n)$ pro $x \in [n, n+1)$, což představuje horní odhad integrálu

$$\int_2^{\infty} f(x) dx \leq a_2 + \dots + a_{n-1}.$$

Protože $\int_2^{\infty} f(x) dx$ diverguje, z horního odhadu plyne divergence řady $\sum a_n$ (viz Obr. 2.2). Naopak, protože řada $\sum a_n$ je divergentní, z dolního odhadu plyne divergence $\int_2^{\infty} f(x) dx$ (viz Obr. 2.1).


b) Užijeme integrální kritéria. Položme $f(x) = \frac{1}{x^a}$ pro $x \in [1, \infty)$; což je pro $a > 0$ klesající funkce. Vyšetřujme konvergenci, resp. divergenci nevlastního integrálu této funkce na intervalu $[1, \infty)$. Platí

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^a} = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^a} dx = \frac{1}{a-1} \quad \text{pro } a > 1,$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{dx}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} (\ln t) = \infty,$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^a} = \frac{1}{1-a} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{a-1}} - 1 \right) = \infty \quad \text{pro } a \in (0, 1).$$

Proto daná řada konverguje pro $a > 1$ a diverguje pro $a \in (0, 1]$.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 60 z 261

Cvičení

2.1. Pomocí vhodného kritéria rozhodněte o konvergenci řad:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n} \quad (a > 0, a \in \mathbb{R})$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$

g) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^a n} \quad (a > 0, a \in \mathbb{R})$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}$

j) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2 \cdot 4 \cdots (2n-2)} \cdot \frac{1}{2n-1}$

k) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

l) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$


m) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}^n \frac{1}{n}$

n) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

o) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{\operatorname{arctg} n}\right)^n \quad (a > 0, a \in \mathbb{R})$

p) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$

q) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$



Číselné řady
s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 61 z 261

 Pomocí Maplu rozhodněte o konvergenci nebo divergenci řady z Cvičení 2.1b).

```
> a:=n->1/(n*(n+1)*(n+2));  
> Sum(a(n),n=1..infinity);
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

Podílovým kritériem nelze o konvergenci rozhodnout:

```
> podilk(a(n));
```

tímto kritériem nelze rozhodnout

Raabeovo kritérium dává


```
> Limit(n*(1-(a(n+1)/a(n))),n=infinity):  
> %=value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{n}{n+3}\right) = 3$$

a řada tedy konverguje.

Celý postup teď opět zautomatizujeme pomocí procedury limraabk.

```
> limraabk := proc (a) local q;  
> q := evalf(limit(n*(1-subst(n = n+1,a)/a),  
> n = infinity));  
> if 1 < q then print(Sum(a,n = 1 .. infinity));  
> print(konverguje)  
> elif q < 1 then  
> print(Sum(a,n = 1 .. infinity));  
> print(diverguje)  
> else print('tímto kritériem nelze rozhodnout')  
> fi end;
```



Číselné řady
s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 62 z 261

> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

konverguje



2.2. Najděte příklad řady $\sum a_n$ s kladnými členy, pro niž $\limsup \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, ale která konverguje.

2.3. Existuje konvergentní řada $\sum a_n$ s nezápornými členy, pro niž $\limsup \sqrt[n]{a_n} > 1$?

2.4. Nalezněte příklad řady $\sum a_n$ s kladnými členy, o jejíž konvergenci nebo divergenci

- Lze rozhodnout odmocninovým kritériem a nelze rozhodnout podílovým kritériem,
- Lze rozhodnout Raabeovým kritériem a nelze rozhodnout odmocninovým kritériem,
- Lze rozhodnout Raabeovým kritériem a nelze rozhodnout podílovým kritériem,
- Lze rozhodnout odmocninovým kritériem a nelze rozhodnout Raabeovým kritériem.

Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět



Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 63 z 261



Zákon pro pedagogy: Nikdo vás neposlouchá, dokud se nespletete.



Číselné řady s nezápornými členy

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 64 z 261



Kapitola 3

Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Předmětem této kapitoly budou číselné řady $\sum a_n$, kde $a_n \in \mathbb{R}$. Nejprve si všimneme speciálního případu, kterými jsou řady se střídavými znaménky, tzv. alternující řady. Dále zavedeme důležitý pojem pro řady s libovolnými členy, kterým je *absolutní*, resp. *neabsolutní konvergence*. Také se vrátíme k otázce z Kapitoly 1, zda pro nekonečné řady platí analogie komutativního zákona, tj. zda lze přerovnávat členy číselné řady, aniž se poruší její součet. Ukážeme, že pro přerovnávání řad je rozhodující právě skutečnost, zda jsou tyto řady absolutně konvergentní.

Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 65 z 261

3.1. Alternující řady

Definice 3.1. Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se nazývá *alternující*, právě když platí

$$\operatorname{sgn} a_{n+1} = -\operatorname{sgn} a_n \quad \text{pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Vyloučíme-li případ řady, jejíž všechny členy jsou nulové, lze každou alternující řadu psát ve tvaru $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ nebo tvaru $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, kde $a_n > 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Pro alternující řady platí následující Leibnizovo kritérium konvergence.


Věta 3.1 (Leibnizovo kritérium). *Nechť a_n je nerostoucí posloupnost kladných čísel. Pak alternující řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ konverguje právě tehdy, když platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.*

Důkaz. Nutnost uvedené podmínky plyne ihned z Věty 1.1, neboť vztah $\lim a_n = 0$ je ekvivalentní se vztahem $\lim[(-1)^{n-1} a_n] = 0$. Dokážeme její dostatečnost. Nechť jsou předpoklady věty splněny a uvažme posloupnost $\{s_n\}$ částečných součtů řady $\sum (-1)^{n-1} a_n$. Pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ je

$$s_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}).$$

Protože je zde každý sčítanec nezáporný, platí $s_2 \leq s_4 \leq \cdots \leq s_{2n}$, tj. vybraná posloupnost $\{s_{2n}\}$ je neklesající. Analogicky je

$$s_{2n+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n} - a_{2n+1}),$$



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 66 z 261

a protože opět čísla v závorkách jsou nezáporná, je $s_1 \geq s_3 \geq \dots \geq s_{2n+1}$, takže $\{s_{2n+1}\}$ je nerostoucí. Obě posloupnosti $\{s_{2n}\}$, $\{s_{2n+1}\}$ jsou tedy monotonní a obě jsou ohraničené, neboť pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí

$$a_1 - a_2 = s_2 \leq s_{2n} < s_{2n} + a_{2n+1} = s_{2n+1} \leq s_1 = a_1.$$

Podle věty o monotonních posloupnostech jsou tedy obě konvergentní a přitom mají stejnou limitu, neboť $\lim s_{2n+1} - \lim s_{2n} = \lim(s_{2n+1} - s_{2n}) = \lim a_{2n+1} = 0$. Je-li $\lim s_{2n} = \lim s_{2n+1} = s$, pak zřejmě i $\lim s_n = s$, takže $\sum (-1)^{n-1} a_n$ je konvergentní a má součet s . \square


Příklad 3.1. Rozhodněte o konvergenci řady:

- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3n+1}{2n-3}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \ln n}$.

Řešení. Všechny uvedené řady jsou alternující; ověříme, zda jsou splněny podmínky Leibnizova kritéria (Věta 3.1).

a) Tato alternující řada se nazývá *Leibnizova řada*. Posloupnost $\{\frac{1}{n}\}$ je klesající a platí, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Proto podle Leibnizova kritéria Leibnizova řada konverguje. Později ukážeme, že její součet je $\ln 2$ (viz Příklad 6.4).

b) Platí $\lim a_n = \frac{3}{2}$, a proto je daná řada divergentní (nesplňuje nutnou podmínku konvergence, tj. $\lim a_n \neq 0$).



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 67 z 261

c) Nejprve ověřme, zda je posloupnost $\left\{\frac{1}{n-\ln n}\right\}$ klesající. Uvažujme funkci $y = \frac{1}{x-\ln x}$. Platí, že

$$y' = \left(\frac{1}{x-\ln x}\right)' = -\frac{1}{(x-\ln x)^2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) < 0 \quad \text{pro } x > 1,$$

tj. tato funkce je klesající na intervalu $(1, \infty)$, odkud plyne, že také posloupnost $\left\{\frac{1}{n-\ln n}\right\}$ je klesající. Dále je $\lim(n - \ln n) = \lim \ln \frac{e^n}{n} = \infty$, a proto $\lim \frac{1}{n-\ln n} = 0$. Podle Leibnizova kritéria daná řada konverguje.

 Ukažme si nyní řešení tohoto příkladu s využitím Maplu. Řadu nejdříve zdefiniujeme

```
> a := n -> 1 / (n - ln(n));
> Sum((-1)^n * a(n), n=1..infinity);
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln(n)}$$

Ověříme, že je posloupnost $\left\{\frac{1}{n-\ln n}\right\}$ je klesající.


```
> solve(diff(a(x), x) <= 0);
      RealRange(1, infinity)
> plot(a(x), x=1..50);
```

Tedy funkce $y = \frac{1}{x-\ln x}$ je na intervalu $[1, \infty)$ klesající (což je dobře vidět i z Obrázku 3.1), a odtud plyne, že také posloupnost $\left\{\frac{1}{n-\ln n}\right\}$ je klesající.

Dále

```
> Limit(a(n), n=infinity) : % = value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln(n)} = 0$$



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 68 z 261



Obr. 3.1: Funkce $f(x) = \frac{1}{x - \ln(x)}$ pro $x \geq 1$

a proto podle Leibnizova kritéria daná řada konverguje.



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 69 z 261



3.2. Absolutní konvergence číselných řad

Věta 3.2. Konverguje-li řada $\sum |a_n|$, konverguje i řada $\sum a_n$.


Důkaz. Necht' $\sum |a_n|$ konverguje a buď $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ libovolné. Pak podle Cauchyova-Bolzanova kritéria konvergence (Lemma 1.1) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ a libovolné $m \in \mathbb{N}$ platí: $|a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \dots + |a_{n+m}| < \varepsilon$. Potom též platí, že $|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+m}| \leq |a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \dots + |a_{n+m}| < \varepsilon$ pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, $m \in \mathbb{N}$, tj. podle Cauchy-Bolzanova kritéria řada $\sum a_n$ konverguje. \square

Opačná implikace neplatí, jak ukazuje příklad Leibnizovy řady $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$: tato řada je konvergentní, avšak řada $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ je divergentní. Proto má smysl zavést u řad s libovolnými členy silnější vlastnost než je konvergence:

Definice 3.2. Řekneme, že řada $\sum a_n$ konverguje absolutně, jestliže konverguje řada $\sum |a_n|$. Jestliže řada $\sum a_n$ konverguje a $\sum |a_n|$ diverguje, říkáme, že řada $\sum a_n$ konverguje neabsolutně.

Příklad 3.2. Leibnizova řada $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ je neabsolutně konvergentní, naopak řada $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ je absolutně konvergentní, neboť řada $\sum \frac{1}{n^2}$ konverguje (viz Příklad 2.1).

Lemma 3.1. Necht' $\sum a_n = s$ je absolutně konvergentní řada. Pak platí $|s| \leq \sum |a_n|$.



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 70 z 261

Důkaz. Označme $\{s_n\}$ posloupnost n -tých částečných součtů řady $\sum a_n$ a $\{t_n\}$ posloupnost n -tých částečných součtů řady $\sum |a_n|$. Protože $|s_n| \leq |t_n|$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, platí $\lim |s_n| = |s| \leq \lim t_n = \sum |a_n|$. (Tvrzení také okamžitě plyne z Poznámky 1.2, uvědomíme-li si, že $a_n \leq |a_n|$). \square

Řada $\sum |a_n|$ je řada s nezápornými členy, a proto můžeme pro určování absolutní konvergence řad použít všechna kritéria z Kapitoly 2.

Věta 3.3 (Srovnávací kritérium). *Nechť $\sum b_n$ je konvergentní řada s nezápornými členy a $\sum a_n$ je řada s libovolnými členy. Jestliže pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $|a_n| \leq b_n$, pak řada $\sum a_n$ konverguje absolutně.*

Důkaz. Plyne z Věty 2.1. \square


Věta 3.4 (Odmocninové kritérium). *Jestliže pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1$, pak řada $\sum a_n$ konverguje absolutně. Platí-li pro nekonečně mnoho $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$, pak tato řada diverguje.*

Existuje-li $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = q \in \mathbb{R}^$, pak v případě $q < 1$ řada $\sum a_n$ konverguje absolutně a v případě $q > 1$ řada diverguje.*

Důkaz. První a třetí tvrzení plyne z odmocninového kritéria pro řadu $\sum |a_n|$ (Věta 2.3). Je-li $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$ pro nekonečně mnoho $n \in \mathbb{N}$, je $|a_n| \geq 1$ pro nekonečně mnoho $n \in \mathbb{N}$, takže neplatí $\lim a_n = 0$ a $\sum a_n$ diverguje podle Věty 1.1. \square

Věta 3.5 (Podílové kritérium). *Bud' $\sum a_n$ řada s nenulovými členy.*

Jestliže pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1$, pak řada $\sum a_n$ konverguje absolutně. Platí-li pro všechna $n \in \mathbb{N}$ nerovnost $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$, řada diverguje.



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 71 z 261

Existuje-li $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q$, pak v případě $q < 1$ řada $\sum a_n$ konverguje absolutně a v případě $q > 1$ tato řada diverguje.

Důkaz. První a třetí tvrzení plyne z podílového kritéria pro řadu $\sum |a_n|$ (Věta 2.4). Je-li $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$, tj. $|a_{n+1}| \geq |a_n|$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, je posloupnost $\{|a_n|\}$ neklesající, takže neplatí $\lim a_n = 0$ a $\sum a_n$ diverguje podle Věty 1.1. \square

Příklad 3.3. Zjistěte, zda jsou následující řady absolutně konvergentní:

- a) $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n+1)^3}$
 b) $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln^n(n+1)} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln^2 3} + \frac{1}{\ln^3 4} - \dots$
 c) $\sum (-1)^{n+1} \frac{\left(\frac{n+1}{3}\right)^{n^2}}{3^n}$
 d) $\sum (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n!}}{(2+\sqrt{1})(2+\sqrt{2}) \dots (2+\sqrt{n})}$.


Řešení. Ve všech případech budeme ověřovat konvergenci řady $\sum |a_n|$.

a) Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $\frac{1}{(2n+1)^3} \leq \frac{1}{n^3}$. Řada $\sum \frac{1}{n^3}$ je konvergentní, proto je podle Věty 3.3 daná řada absolutně konvergentní.

b) Platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\ln^n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln^n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0.$$

Podle Věty 3.4 je daná řada absolutně konvergentní.



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 72 z 261

c) Platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{3} = \frac{e}{3} < 1.$$

Podle Věty 3.4 je daná řada absolutně konvergentní.

Pro řešení příkladu využijeme dvě z procedur uvedených v předcházející kapitole.

- > `a := n -> (-1)^(n+1) * ((n+1)/n)^(n^2) / 3^n;`
- > `Sum(a(n), n=1..infinity);`

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{(n+1)} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{(n^2)}}{3^n}$$

- > `odmock(abs(a(n)));`


$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{(n+1)} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{(n^2)}}{3^n} \right|$$

konverguje

- > `csum(a(n), n);`

true

Obdobně můžeme postupovat i při řešení ostatních úloh.



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 73 z 261



d) V tomto případě se ukazuje výhodné použít Raabeovo kritérium pro řadu $\sum |a_n|$. Platí

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sqrt{n!}}{(2 + \sqrt{1}) \dots (2 + \sqrt{n})} \frac{(2 + \sqrt{1}) \dots (2 + \sqrt{n+1})}{\sqrt{(n+1)!}} - 1 \right) &= \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2 + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n+1}} = \infty, \end{aligned}$$

proto je vyšetřovaná řada absolutně konvergentní.

Příklad 3.4. Určete, pro která $x \in \mathbb{R}$ je řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$


absolutně konvergentní, pro která neabsolutně a pro která diverguje.

Řešení. Pro $x \neq 0$ je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \frac{n}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x|.$$

Podle Věty 3.5 řada absolutně konverguje pro $|x| < 1$, pro $|x| > 1$ řada diverguje. Pro $x = 1$ dostáváme harmonickou řadu $\sum \frac{1}{n}$, která je divergentní, a pro $x = -1$ Leibnizovu řadu $\sum (-1)^{(n+1)} \frac{1}{n}$, která je neabsolutně konvergentní.

Na závěr tohoto odstavce uveďme dvě kritéria k určení konvergence řady s libovolnými členy. Jejich důkaz lze nalézt např. v [8, 18].



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 74 z 261

Věta 3.6 (Abelovo a Dirichletovo kritérium). *Nechť $\{b_n\}$ je monotonní posloupnost a platí jedna z následujících podmínek:*

1. (Dirichlet) *Posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$ je ohraničená a $\lim b_n = 0$;*
2. (Abel) *Řada $\sum a_n$ konverguje a posloupnost $\{b_n\}$ je ohraničená.*

Pak řada $\sum a_n b_n$ konverguje.

Příklad 3.5. Dokažte, že řada

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ konverguje pro libovolné $x \in \mathbb{R}$;

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n} \sin n}{n}$ je konvergentní.

Řešení. a) Příklad kdy $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ je triviální, neboť se jedná o nulovou řadu.

Nechť tedy $x \neq k\pi$. Položme $b_n = \frac{1}{n}$ a $a_n = \sin nx$. Ukážeme, že jsou splněny podmínky Dirichletova kritéria (Věta 3.6). Zřejmě je posloupnost $\{b_n\}$ monotonní a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Zbývá dokázat, že posloupnost částečných součtů řady $\sum a_n$ je ohraničená. Označme


$$s_n = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx,$$

$$r_n = \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx,$$

$$q = \cos x + i \sin x.$$

Z Moivreovy věty plyne

$$q^n = (\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx,$$



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 75 z 261

odkud

$$q^n - q^{-n} = \cos nx + i \sin nx - (\cos(-nx) + i \sin(-nx)) = 2i \sin nx.$$

Užitím těchto vzorců dostaneme

$$\begin{aligned} r_n + i s_n &= \cos x + i \sin x + \cos 2x + i \sin 2x + \cdots + \cos nx + i \sin nx = \\ &= q + q^2 + \cdots + q^n = q \frac{q^n - 1}{q - 1} = q \frac{q^{\frac{n}{2}}(q^{\frac{n}{2}} - q^{-\frac{n}{2}})}{q^{\frac{1}{2}}(q^{\frac{1}{2}} - q^{-\frac{1}{2}})} = q^{\frac{n+1}{2}} \frac{2i \sin \frac{n}{2}x}{2i \sin \frac{1}{2}x} = \\ &= \left(\cos \frac{n+1}{2}x + i \sin \frac{n+1}{2}x \right) \frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x}. \end{aligned}$$


Nyní porovnáme reálnou a imaginární část

$$r_n = \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx = \frac{\cos \frac{n+1}{2}x \sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x},$$

$$s_n = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx = \frac{\sin \frac{n+1}{2}x \sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

Odtud plyne $|s_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{1}{2}x|}$, a proto je posloupnost $\{s_n\}$ částečných součtů řady $\sum \sin nx$ ohraničená. Tím jsme dokázali, že řada $\sum \frac{\sin nx}{n}$ je konvergentní pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

b) Použijeme Abelovo kritérium (Věta 3.6) při volbě $b_n = \sqrt[n]{n}$, $a_n = \frac{\sin n}{n}$. Podle předchozího příkladu $\sum a_n$ konverguje. Protože $\lim \sqrt[n]{n} = 1$, je $\{b_n\}$ ohraničená; ukážeme ještě, že pro $n \geq 3$ je klesající. Vskutku, $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1}$ právě když $n^{n+1} > (n+1)^n$, což je ekvivalentní $n > (1 + \frac{1}{n})^n$ a tato nerovnost platí pro $n \geq 3$, neboť $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ je rostoucí posloupnost s limitou $e < 3$.



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 76 z 261

3.3. Přerovnávaní řad

Již v první kapitole jsme ukázali, že s nekonečnými součty nemůžeme zacházet stejně jako se součty konečnými. V tomto odstavci se budeme zabývat analogií komutativního zákona – přerovnávaním nekonečných řad.

Zavedme následující definici:


Definice 3.3. Necht' $\sum a_n$ je řada, $\{k_n\}$ permutace množiny \mathbb{N} (tj. $\{k_n\}$ je prostá posloupnost přirozených čísel, v níž se každé přirozené číslo vyskytuje). Pak říkáme, že $\sum a_{k_n}$ vznikla přerovnávaním řady $\sum a_n$.

Věta 3.7. Necht' řada $\sum a_n$ konverguje absolutně. Pak konverguje absolutně také každá řada $\sum a_{k_n}$ vzniklá přerovnávaním řady $\sum a_n$ a platí $\sum a_{k_n} = \sum a_n$.

Důkaz. Buď $\varepsilon > 0$ libovolné. Protože řada $\sum a_n$ je absolutně konvergentní, existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \geq n_0$ a libovolné $m \in \mathbb{N}$ platí $|a_{n+1}| + \dots + |a_{n+m}| < \varepsilon$. Dále protože $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ je permutace množiny \mathbb{N} , existuje $p \in \mathbb{N}$ tak, že $\{1, 2, \dots, n_0\} \subseteq \{k_1, k_2, \dots, k_p\}$. Buď nyní $n > p$ a $m \in \mathbb{N}$ libovolné. Označíme-li $t = \max\{k_{n+1}, \dots, k_{n+m}\}$, platí $|a_{k_{n+1}}| + \dots + |a_{k_{n+m}}| \leq |a_{n_0+1}| + \dots + |a_t| < \varepsilon$. Podle Cauchy-Bolzanova kritéria řada $\sum |a_{k_n}|$ konverguje, tj. řada $\sum a_{k_n}$ konverguje absolutně.

Zbývá dokázat, že obě řady mají stejný součet. Označme s_n částečné součty řady $\sum a_n$, t_n částečné součty řady $\sum a_{k_n}$. Pro $n > \max\{n_0, k_p\}$ platí

$$\begin{aligned} |s_n - t_n| &= |a_1 + \dots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots + a_n - (a_{k_1} + \dots + a_{k_n})| \leq \\ &\leq |a_{n_0+1}| + |a_{n_0+2}| + \dots + |a_{n_0+n}| < \varepsilon, \end{aligned}$$



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 77 z 261

kde $n_0 + q = \max\{n, k_1, \dots, k_n\}$. Je tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - t_n) = 0$, tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n$. \square

Právě jsme dokázali, že pro absolutně konvergentní řady platí komutativní zákon. Vystává otázka, jak se chovají při přerovnávání neabsolutně konvergentní řady.

Zaveďme následující označení: pro $a \in \mathbb{R}$ položme

$$a^+ = \max\{a, 0\}, \quad a^- = \max\{-a, 0\}.$$


Potom je zřejmé $a^+ \geq 0$, $a^- \geq 0$, $a = a^+ - a^-$, $|a| = a^+ + a^-$.

Proto je-li $\sum a_n$ nekonečná řada, můžeme uvažovat dvě nekonečné řady s nezápornými členy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$. Tyto řady mají následující vlastnost:

Lemma 3.2. *Necht' řada $\sum a_n$ konverguje neabsolutně. Pak obě řady $\sum a_n^+$ a $\sum a_n^-$ divergují k $+\infty$.*

Důkaz. Protože $\sum a_n^+$ a $\sum a_n^-$ jsou řady s nezápornými členy, každá z nich buď konverguje nebo diverguje k $+\infty$. Kdyby obě konvergovaly, pak by podle Věty 1.3 konvergovala i řada $\sum (a_n^+ + a_n^-) = \sum |a_n|$, tj. $\sum a_n$ by konvergovala absolutně. Kdyby např. $\sum a_n^+$ divergovala k $+\infty$, $\sum a_n^-$ konvergovala, pak by podle Cvičení 1.8 řada $\sum (a_n^+ - a_n^-) = \sum a_n$ divergovala k $+\infty$. Tedy obě řady $\sum a_n^+$, $\sum a_n^-$ divergují. \square

Nyní můžeme dokázat větu o neabsolutně konvergentních řadách, která říká, jak „labilní“ jsou tyto řady vzhledem k přerovnávání.



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 78 z 261

Věta 3.8 (Riemannova). *Nechť řada $\sum a_n$ konverguje neabsolutně a nechť $s \in \mathbb{R}$ je libovolné. Pak existuje takové přerovnání $\sum a_{k_n}$ řady $\sum a_n$, že $\sum a_{k_n} = s$, existuje takové přerovnání $\sum a_{p_n}$ řady $\sum a_n$, že $\sum a_{p_n}$ určitě diverguje a takové přerovnání $\sum a_{q_n}$, že $\sum a_{q_n}$ osciluje.*



Důkaz. Dříve než provedeme přesný důkaz, naznačme velmi zjednodušeně, jakým způsobem bude důkaz veden. Myšlenkou důkazu tvrzení, že $\sum a_{k_n} = s$, je přerovnat danou řadu následujícím způsobem: nejdříve ponecháme kladné členy, dokud „nepřekročíme“ předepsaný součet. Poté začneme odčítat záporné členy až bude částečný součet řady menší než součet předepsaný a stejným způsobem pokračujeme dál. Nakonec dokážeme, že takto přeskládaná řada opravdu konverguje k předem určenému číslu.

(i) Ukažme, že lze řadu přerovnat tak, že přerovnaná řada konverguje a má součet s . Předpokládejme pro určitost, že $s > 0$. Nechť $n_1 \in \mathbb{N}$ je nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} > s$; vzhledem k divergenci $\sum a^+_n$ takové n_1 existuje. Nechť $m_1 \in \mathbb{N}$ je nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - (a^-_1 + \dots + a^-_{m_1}) < s$; existence takového m_1 plyne z divergence řady $\sum a^-_n$. Nechť dále $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 > n_1$ je nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - (a^-_1 + \dots + a^-_{m_1}) + a^+_{n_1+1} + \dots + a^+_{n_2} > s$. Takové n_2 opět existuje ze stejných důvodů jako n_1 . V této konstrukci lze pokračovat indukci; jejím výsledkem je jistá řada, která vznikla přerovnáním řady $\sum a_n$.

Dokažme, že součet takto přerovnané řady je s . Z konstrukce je patrné, že částečný součet $s_{n_1+m_1+\dots+n_k}$ přerovnané řady se od požadovaného součtu s liší maximálně o $a^+_{n_k}$, částečný součet $s_{n_1+m_1+\dots+n_k+m_k}$ se liší od s maximálně o $a^-_{m_k}$ a částečný součet s_n , kde $n_1 + m_1 + \dots + n_k < n < n_1 + m_1 + \dots + n_k + m_k$, resp. $n_1 + m_1 + \dots + n_k + m_k < n < n_1 + m_1 + \dots + n_k + m_k + n_{k+1}$ se liší od s nanejvýš

Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 79 z 261

o $\max\{a_{n_k}, a_{m_k}\}$ resp. o $\max\{a_{m_k}, a_{n_{k+1}}\}$. Protože $\sum a_n$ konverguje, je $\lim a_n = 0$, tedy i $\lim a^+_n = \lim a^-_n = 0$; odtud $\lim s_n = s$.

(ii) Ukažme, že lze řadu přerovnat tak, že přerovnaná řada diverguje k ∞ . Nechť $n_1 \in \mathbb{N}$ je nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} > 1$; $n_2 > n_1$ nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - a^-_1 + a^+_{n_1+1} + \dots + a^+_{n_2} > 2$, $n_3 > n_2$ nejmenší takové, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - a^-_1 + a^+_{n_1+1} + \dots + a^+_{n_2} - a^-_2 + a^+_{n_2+1} + \dots + a^+_{n_3} > 3$ atd. Vzniklá přerovnaná řada určitě diverguje k ∞ .

(iii) Obdobně určíme nejmenší $n_1 \in \mathbb{N}$ tak, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} > 1$, nejmenší $m_1 \in \mathbb{N}$ tak, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - (a^-_1 + \dots + a^-_{m_1}) < 0$, nejmenší $n_2 > n_1$ tak, že $a^+_1 + \dots + a^+_{n_1} - (a^-_1 + \dots + a^-_{m_1}) + a^+_{n_1+1} + \dots + a^+_{n_2} > 1$ atd. Vzniklá přerovnaná řada osciluje. \square



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Příklad 3.6. Přerovnejte Leibnizovu řadu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} \frac{1}{n}$ tak, aby součet přerovnané řady byl:

a) 1,8

b) 0,7

c) -0,6.

Řešení. Podle příkladu 3.2 je Leibnizova řada neabsolutně konvergentní, tedy splňuje podmínky věty 3.8 a existují její přerovnaní taková, že konverguje k zadaným číslům.

V příkladu 6.4 jsme ukázali, že $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} \frac{1}{n} = \ln 2 \doteq 0,693$.

> a:=n->(-1)^(n+1)/n: Sum(a(n), n=1..infinity):

> %=value(%);

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 80 z 261

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{(n+1)}}{n} = \ln(2)$$


```
> evalf(lhs(%));
```

0.6931471806

V zadání máme tedy tři různé typové příklady.

Při řešení tohoto příkladu budeme postupovat podle důkazu Riemannovy věty. Maplu využijeme k znázornění přeskládaných řad a posloupností jejich částečných součtů. Využijeme nových procedur `rieman` a `preskl.` Procedura `rieman(ps, n, fce, prom)` přeskládá zadanou neabsolutně konvergentní řadu tak, aby konvergovala k předepsanému součtu a zobrazí její částečné součty. Procedura má čtyři argumenty: `ps` součet, k němuž má konvergovat přeskládaná řada, `n` počet zobrazených částečných součtů přeskládané řady, `fce` předpis pro n -tý člen řady a `prom` proměnná použitá ve výrazu `fce`.

```
> cast_s := proc (ps, f)
> local s; global old_s, nk, nz;
> s := old_s; if s <= ps
> then s := s+f(nk); nk := nk+2 else
> s := s+f(nz);
> nz := nz+2
> fi;
> old_s := s;
> RETURN(s)
> end;
```



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 81 z 261

```

> rieman := proc (ps, n, fce, prom)
> local f, s, l; global old_s, nk, nz;
> f := unapply(fce, prom);
> if 0 < f(1) then nk := 1; nz := 2
> else nk := 2; nz := 1 fi;
> s := 0; old_s := 0;
> l := [seq([i, cast_s(ps, f, nk, nz)], i = 1 .. n)];
> RETURN(display({pointplot(l, symbol = CIRCLE,
> symbolsize=4),
> plot(ps, x = 0 .. n, labels = [``, ``])})))
> end;


```

Procedura `preskl` (`ps, n, fce, prom`) má stejné parametry jako procedura `rieman` a slouží ke zázornění prvních n členů přeskádané řady.

```

> clen := proc (ps, f) local s, h;
> global old_s, nk, nz; s := old_s;
> if s <= ps
> then h := f(nk); s := s+h; nk := nk+2
> else h := f(nz); s := s+h; nz := nz+2
> fi;
> old_s := s; RETURN(h)
> end;

```



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 82 z 261

```

> preskl := proc (ps, n, fce, prom)
> local f, s, l; global old_s, nk, nz;
> f := unapply(fce, prom);
> if 0 < f(1) then nk := 1; nz := 2
> else nk := 2; nz := 1 fi;
> s := 0; old_s := 0;
> l := [seq([i, clen(ps, f, nk, nz)], i = 1 .. n)];
> RETURN(pointplot(l, symbol = CIRCLE,
> symbolsize=4))
> end;

```



Nyní aplikujeme tyto procedury na jednotlivé případy.

V případě a) je předepsaný součet dostatečně větší než součet $\ln 2$, proto v přeskládané řadě převažují kladné členy, viz Obr. 3.2.

```

> preskl(1.8, 150, a(n), n);

```

Je vidět, že nejdříve sčítáme jen kladné členy, čímž posloupnost částečných součtů roste dokud nepřekročí předepsaný součet, tj. $s_n > 1,8$. Poté následuje člen záporný, který způsobí, že $s_{n+1} < 1,8$. Opět následují členy kladné, až $s_n > 1,8$, poté člen záporný atd. (viz Obr. 3.3).

```

> rieman(1.8, 150, a(n), n);

```

Obrázky 3.4 a 3.5 ukazují případ b), kdy předepsaný součet je velmi blízko hodnotě $\ln 2$. Pořadí členů řady (Obr. 3.4) se proto mění až u členů s vyššími indexy a přeskládání není z grafu téměř patrné. U částečných součtů (Obr. 3.5) to má za následek, že oscilují okolo předepsaného součtu bez větších skoků.

```

> preskl(0.7, 150, a(n), n);
> rieman(0.7, 150, a(n), n);

```

Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 83 z 261




Obr. 3.2: Prvních 150 členů
přeskládané řady
konvergující k 1,8



Obr. 3.3: Posloupnost částečných
součtů konvergující k 1,8

Poslední případ (znázorněný na obrázcích 3.6 a 3.7), kdy předepsaný součet je záporný a dostatečně menší než $\ln 2$, je v podstatě „inverzní“ k případu a).

- > `preskl(-0.6, 150, a(n), n);`
- > `rieman(-0.6, 150, a(n), n);`



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 84 z 261






Obr. 3.4: Prvních 150 členů
přeskládané řady
konvergující k 0,7



Obr. 3.5: Posloupnost částečných
součtů konvergující k 0,7



Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

Cvičení

3.1. Rozhodněte o konvergenci alternujících řad:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-1}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{5n-2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sqrt{n}}{n+100}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 85 z 261




Obr. 3.6: Prvních 150 členů
přeskádané řady
konvergující k $-0,6$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n - \ln n}$$

3.2. Vyšetřete, které řady konvergují absolutně, které konvergují neabsolutně a které divergují:

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{2^n}$$




Obr. 3.7: Posloupnost částečných
součtů konvergující k $-0,6$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \ln n}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n^2}}{n!}$$



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana **86** z **261**

e)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{6^n}$$

g)
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln^n(n+1)}$$

f)
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \operatorname{tg} \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

h)
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$


3.3. Určete, pro která reálná čísla x následující řady absolutně konvergují, pro která neabsolutně a pro která divergují:

a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x}$$


b)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x$$

c)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3 2^n} x^n$$

d)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{e^{nx}}$$



Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přeje.



Řady absolutně a
neabsolutně konvergentní

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 87 z 261



Kapitola 4

Součin řad a numerická sumace řad

V této kapitole ukážeme, za jakých předpokladů a jakým způsobem lze násobit dvě nekonečné řady. Dále ukážeme některé odhady zbytku při numerické sumaci číselné řady, což později budeme používat při přibližném výpočtu funkčních hodnot.

4.1. Součin řad

Součin dvou konečných součtů $\sum_{i=1}^m a_i$, $\sum_{k=1}^n b_k$ reálných čísel lze podle distributivního zákona vypočítat tak, že utvoříme všechny součiny $a_i b_k$ ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq$

Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 88 z 261

$\leq k \leq n$) a tyto součiny sečteme:


$$\sum_{i=1}^m a_i \cdot \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_i b_k =$$

$$= a_1 b_1 + a_1 b_2 + \dots + a_1 b_n + a_2 b_1 + \dots + a_2 b_n + \dots + a_m b_1 + \dots + a_m b_n.$$

Chceme-li analogicky postupovati v případě dvou (konvergentních) řad $\sum a_n$, $\sum b_n$, je třeba utvořit všechny součiny $a_i b_k$ ($i, k \in \mathbb{N}$) a tyto součiny sečíst. Systém $\{a_i b_k; i, k \in \mathbb{N}\}$ je však spočetnou množinou reálných čísel opatřených dvěma indexy, kterou můžeme napsat ve tvaru „nekonečné matice“

$$\begin{array}{cccccc} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \dots & a_1 b_n & \dots \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \dots & a_2 b_n & \dots \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 & \dots & a_3 b_n & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & a_m b_3 & \dots & a_m b_n & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{array} \quad (4.1)$$

Prvky takovéto množiny lze sčítat (ve smyslu předchozí teorie), pokud je nějakým způsobem srovnáme do obyčejné posloupnosti, tj. utvoříme posloupnost $\{c_n\}$, jež je permutací množiny $\{a_i b_k; i, k \in \mathbb{N}\}$. Každou řadu $\sum c_n$, která vznikne tímto způsobem, nazýváme *součinem řad* $\sum a_n$, $\sum b_n$. Obecně tedy existuje nekonečně mnoho různých součinů řad $\sum a_n$, $\sum b_n$ při čemž jeden z druhého vznikne přerážením. V Kapitole 3 jsme viděli, že v obecném případě se u konvergentních řad hodnota součtu při přerážení nezachovává. Proto různé součiny dvou konvergentních řad mohou mít různé hodnoty; dokonce uvidíme, že součin dvou



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 89 z 261

konvergentních řad může být divergentní. Jednoduchá situace je však v případě, kdy obě řady $\sum a_n$, $\sum b_n$ konvergují absolutně:


Věta 4.1. *Nechť řady $\sum a_n = a$, $\sum b_n = b$ konvergují absolutně. Je-li $\{c_n\}$ libovolná posloupnost, jež je permutací množiny $\{a_i b_k; i, k \in \mathbb{N}\}$, pak řada $\sum c_n$ konverguje absolutně a platí $\sum c_n = a \cdot b$.*

Důkaz. Necht' $\sum |a_n| = s$, $\sum |b_n| = t$, takže $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_i| \leq s$ pro každé $i \in \mathbb{N}$ a $|b_1| + |b_2| + \dots + |b_k| \leq t$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Zvolme libovolně $n \in \mathbb{N}$ a necht' $c_1 = a_{i_1} b_{k_1}$, $c_2 = a_{i_2} b_{k_2}$, \dots , $c_n = a_{i_n} b_{k_n}$. Je-li $i_0 = \max\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, $k_0 = \max\{k_1, k_2, \dots, k_n\}$, pak zřejmě

$$\begin{aligned} |c_1| + |c_2| + \dots + |c_n| &= |a_{i_1}| |b_{k_1}| + |a_{i_2}| |b_{k_2}| + \dots + |a_{i_n}| |b_{k_n}| \leq \\ &\leq (|a_1| + |a_2| + \dots + |a_{i_0}|) \cdot (|b_1| + |b_2| + \dots + |b_{k_0}|) \leq s \cdot t. \end{aligned}$$

Tedy řada $\sum |c_n|$ má ohraničené částečné součty, takže $\sum |c_n|$ konverguje, tj. $\sum c_n$ konverguje absolutně. Podle Věty 3.7 platí $\sum c_n = \sum c_{k_n}$, kde $\{k_n\}$ je libovolná permutace množiny \mathbb{N} . Speciálně platí

$$\begin{aligned} \sum c_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + a_3 b_2 + \\ &+ a_3 b_1) + \dots + (a_1 b_n + a_2 b_n + \dots + a_n b_n + a_n b_{n-1} + \dots + a_n b_1) + \dots \end{aligned}$$



Součin řad a numerická součty řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 90 z 261

Označíme-li s_n částečné součty řady na pravé straně této rovnosti, t_n částečné součty řady $\sum a_n$ a w_n částečné součty řady $\sum b_n$, platí

$$s_1 = a_1 b_1 = t_1 w_1$$

$$s_2 = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1 = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = t_2 w_2$$

$$\begin{aligned} s_3 &= a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1 + a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + a_3 b_2 + a_3 b_1 \\ &= (a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3) = t_3 w_3 \end{aligned}$$

\vdots


$$s_n = t_n w_n.$$

Odtud plyne $s_n \rightarrow a \cdot b$, tj. $\sum c_n = a \cdot b$. □

Předpoklad absolutní konvergence obou řad $\sum a_n$, $\sum b_n$ je však značně silný a dá se očekávat, že při speciální volbě permutace (c_n) množiny $\{a_i b_k; i, k \in \mathbb{N}\}$ lze dokázat konvergenci součinu $\sum c_n$ za slabších podmínek. Zavedme dva typy součinů konvergentních řad:

Dirichletovým součinem řad $\sum a_n$, $\sum b_n$ rozumíme řadu $\sum c_n$, kde

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_n + \cdots + a_n b_n + a_n b_{n-1} + \cdots + a_n b_1;$$



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 91 z 261

tato řada odpovídá postupu ve schématu (4.1) „po čtvercích“:

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_1b_1 & & a_1b_2 & & a_1b_3 & & a_1b_4 & \dots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 a_2b_1 & \leftarrow & a_2b_2 & & a_2b_3 & & a_2b_4 & \dots \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & \\
 a_3b_1 & \leftarrow & a_3b_2 & \leftarrow & a_3b_3 & & a_3b_4 & \dots \\
 & & & & & & \downarrow & \\
 a_4b_1 & \leftarrow & a_4b_2 & \leftarrow & a_4b_3 & \leftarrow & a_4b_4 & \dots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$


Cauchyovým součinem řad $\sum a_n$, $\sum b_n$ rozumíme řadu $\sum c_n$, kde

$$c_n = a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_{n-1}b_2 + a_nb_1;$$

tato řada odpovídá postupu ve schématu (4.1) „po diagonálách“:

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_1b_1 & & a_1b_2 & & a_1b_3 & & a_1b_4 & \dots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \\
 a_2b_1 & & a_2b_2 & & a_2b_3 & & a_2b_4 & \dots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \\
 a_3b_1 & & a_3b_2 & & a_3b_3 & & a_3b_4 & \dots \\
 & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & & \\
 a_4b_1 & & a_4b_2 & & a_4b_3 & & a_4b_4 & \dots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

Věta 4.2. Necht' $\sum a_n = a$, $\sum b_n = b$ jsou konvergentní řady a necht' $\sum c_n$ je jejich Dirichletův součin. Pak $\sum c_n$ je konvergentní a platí $\sum c_n = a \cdot b$.



Součin řad a numerická
sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 92 z 261

Důkaz. Označíme-li t_n částečné součty řady $\sum a_n$, w_n částečné součty řady $\sum b_n$ a s_n částečné součty jejich Dirichletova součinu $\sum c_n$, potom – jak jsme odvodili v důkaze věty 4.1 – platí $s_n = t_n \cdot w_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Avšak $t_n \rightarrow a$, $w_n \rightarrow b$ a tedy $s_n \rightarrow a \cdot b$, tj. $\sum c_n = a \cdot b$. \square

Pro Cauchyův součin takové tvrzení neplatí:

Příklad 4.1. Necht' $\sum a_n = \sum b_n = \sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$. Podle Leibnizova kritéria řady $\sum a_n$, $\sum b_n$ konvergují. Ukážeme, že jejich Cauchyův součin $\sum c_n$ diverguje.

Vskutku,


$$c_n = (-1)^{n+1} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n-1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n-1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1}} \right),$$

takže

$$\begin{aligned} |c_n| &= \frac{1}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{n-1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{1}} \geq \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n}} = \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = 1. \end{aligned}$$

Neplatí tedy $\lim c_n = 0$ a $\sum c_n$ diverguje podle Věty 1.1.

Věta 4.3 (Mertensova). *Necht' řady $\sum a_n = a$, $\sum b_n = b$ konvergují a alespoň jedna z nich absolutně. Necht' $\sum c_n$ je Cauchyův součin těchto řad. Pak $\sum c_n$ konverguje a platí $\sum c_n = a \cdot b$.*



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 93 z 261

Důkaz. Předpokládejme pro určitost, že $\sum a_n$ konverguje absolutně. Označme t_n částečné součty řady $\sum a_n$, w_n částečné součty řady $\sum b_n$ a s_n částečné součty jejich Cauchyova součinu $\sum c_n$. Je tedy

$$\begin{aligned} s_n &= c_1 + c_2 + \dots + c_n = \\ &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) + \dots \\ &\quad \dots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1) = \\ &= a_1 (b_1 + b_2 + \dots + b_n) + a_2 (b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1}) + \dots + a_n b_1 = \\ &= a_1 w_n + a_2 w_{n-1} + \dots + a_n w_1. \end{aligned}$$

Označme $w_n - b = v_n$; pak je $w_n = b + v_n$ a protože $w_n \rightarrow b$, platí $v_n \rightarrow 0$. Odtud


$$s_n = a_1 (b + v_n) + a_2 (b + v_{n-1}) + \dots + a_n (b + v_1) =$$

$$= (a_1 + a_2 + \dots + a_n) \cdot b + a_1 v_n + a_2 v_{n-1} + \dots + a_n v_1 = t_n \cdot b + u_n,$$

kde $u_n = a_1 v_n + a_2 v_{n-1} + \dots + a_n v_1$. Protože $t_n \rightarrow a$, platí $t_n \cdot b \rightarrow a \cdot b$, takže ukážeme-li, že platí $\lim u_n = 0$, bude tím dokázáno $\lim s_n = a \cdot b$, tj. $\sum c_n = a \cdot b$.

Protože $\sum |a_n|$ konverguje, je posloupnost jejích částečných součtů shora ohraničená, tj. existuje $h \in \mathbb{R}$, $h > 0$ tak, že platí $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| < h$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Protože $\lim v_n = 0$, je posloupnost $\{v_n\}$ ohraničená, tj. existuje $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$ tak, že platí $|v_n| < k$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Buď $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ libovolné. Protože $\lim v_n = 0$, k číslu $\frac{\varepsilon}{2h} > 0$ existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_1$ platí $|v_n| < \frac{\varepsilon}{2h}$. Protože $\sum |a_n|$ konverguje, k číslu $\frac{\varepsilon}{2k} > 0$ existuje podle Cauchy-Bolzanova kritéria $n_2 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_2$ a pro všechna $m \in \mathbb{N}$ platí $|a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \dots + |a_{n+m}| < \frac{\varepsilon}{2k}$.



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 94 z 261

Položme $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Pak pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n > 2n_0$ platí

$$\begin{aligned} |u_n| &= |a_1 v_n + a_2 v_{n-1} + \cdots + a_{n_0} v_{n-n_0+1} + a_{n_0+1} v_{n-n_0} + \cdots + a_n v_1| \leq \\ &\leq |a_1| \cdot |v_n| + |a_2| \cdot |v_{n-1}| + \cdots + |a_{n_0}| \cdot |v_{n-n_0+1}| + \\ &\quad + |a_{n_0+1}| \cdot |v_{n-n_0}| + \cdots + |a_n| \cdot |v_1| < \\ &< (|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{n_0}|) \cdot \frac{\varepsilon}{2h} + (|a_{n_0+1}| + \cdots + |a_n|) \cdot k < \\ &< h \cdot \frac{\varepsilon}{2h} + \frac{\varepsilon}{2k} \cdot k = \varepsilon. \end{aligned}$$

Je tedy vskutku $\lim u_n = 0$ a $\sum c_n = a \cdot b$. □


4.2. Numerická sumace

Necht' $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní řada. Její součet s lze psát ve tvaru

$$s = s_n + R_n,$$

kde $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ je n -tý částečný součet řady a $R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$ se nazývá zbytek po n -tém členu. To znamená, že číslo R_n udává velikost chyby, jíž se dopustíme, jestliže přesnou hodnotu součtu dané konvergentní řady aproximujeme částečným součtem. Přitom platí $\lim R_n = \lim(s - s_n) = s - s = 0$. V tomto odstavci odvodíme některé odhady pro velikost zbytku $|R_n|$. Aplikace těchto odhadů při přibližném vyjadřování funkčních hodnot a integrálů budou ukázány v Kapitole 7.

Lemma 4.1. *Necht' $\sum a_n$ je řada, $\sum b_n$ je konvergentní řada s nezápornými členy a necht' platí $|a_n| \leq b_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Značí-li r_n zbytek po n -tém členu řady $\sum a_n$ a R_n zbytek po n -tém členu řady $\sum b_n$, pak platí $|r_n| \leq R_n$.*



Součin řad a numerická
sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 95 z 261

Důkaz. Z předpokladů věty plyne, že $\sum a_n$ konverguje absolutně. Tedy také konverguje absolutně řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n+k}$ a podle Poznámky 1.2 a Lemmatu 3.1 platí $|r_n| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n+k}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_{n+k} = R_n$. \square

Věta 4.4. *Necht' $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ je nerostoucí posloupnost kladných čísel taková, že $\lim a_n = 0$. Pak pro zbytek po n -tém členu R_n alternující řady $\sum (-1)^{n-1} a_n$ platí*

$$|R_n| < a_{n+1}.$$

Důkaz. Z Leibnizova kritéria (Věta 3.1) plyne, že řada $\sum (-1)^{n-1} a_n$ je konvergentní. Dále platí

$$\begin{aligned} R_n &= (-1)^n a_{n+1} + (-1)^{n+1} a_{n+2} + \dots + (-1)^{n+k-1} a_{n+k} + \dots = \\ &= (-1)^n (a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - a_{n+4} + \dots + (-1)^{k-1} a_{n+k} + \dots). \end{aligned}$$

Opakováním úvah z důkazu Leibnizova kritéria zjistíme, že pro součet σ řady v závorce platí $a_{n+1} - a_{n+2} < \sigma < a_{n+1}$. Je tedy zejména $\sigma > 0$ a protože $R_n = (-1)^n \cdot \sigma$, platí $|R_n| = \sigma < a_{n+1}$. \square


Pokud daná řada není alternující, můžeme pro určování chyby použít následující dvě tvrzení.

Věta 4.5. *Necht' $\sum a_n$ je číselná řada, pro kterou platí*

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1 \text{ pro všechna } n \in \mathbb{N}.$$

Pak pro zbytek R_n této řady platí

$$|R_n| \leq |a_n| \frac{q}{1-q}.$$



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 96 z 261


Důkaz. Uvedený předpoklad zaručuje absolutní konvergenci řady $\sum a_n$ podle Věty 3.5. Protože pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $|a_{n+1}| \leq |a_n| \cdot q$, je i $|a_{n+2}| \leq |a_{n+1}| \cdot q \leq |a_n| \cdot q^2$, $|a_{n+3}| \leq |a_{n+2}| \cdot q \leq |a_n| \cdot q^3$ a obecně indukcí $|a_{n+k}| \leq |a_n| \cdot q^k$. Proto podle Poznámky 1.2 a Lemmatu 3.1 platí

$$\begin{aligned} |R_n| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n+k}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_n| \cdot q^k = \\ &= |a_n| \cdot q \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = |a_n| \cdot \frac{q}{1-q}. \end{aligned}$$

□

Věta 4.6. *Necht' $\sum a_n$ je konvergentní řada s nezápornými členy. Necht' $a_n = f(n)$, kde f je nezáporná a nerostoucí funkce na intervalu $[1, \infty)$. Pak pro zbytek R_n řady $\sum a_n$ platí $R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$.*

Důkaz. Z konvergence řady $\sum a_n$ plyne konvergence nevlastního integrálu $\int_1^{\infty} f(x) dx$ (podle Věty 2.6) a tedy i nevlastního integrálu $\int_n^{\infty} f(x) dx$ pro libovolné $n \in \mathbb{N}$. V důkazu Věty 2.6 jsme dále odvodili nerovnost $a_{n+1} \leq \int_n^{n+1} f(x) dx$ platnou pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Dosadíme-li do ní za n postupně $n+1, n+2, \dots, n+k-1$ a sečteme takto vzniklé nerovnosti, obdržíme $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k} \leq \int_n^{n+k} f(x) dx$, kde $k \in \mathbb{N}$ je libovolné. Protože funkce f je nezáporná na intervalu $[n, \infty)$, platí $\int_n^{n+k} f(x) dx \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$. Je tedy $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k} \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$ pro všechna $k \in \mathbb{N}$ a odtud již plyne $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n+k} = R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$. □



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 97 z 261

Příklad 4.2. a) Nalezněte odhad zbytku řady

$$\sum \frac{1}{n^p}, \quad \text{kde } p \in \mathbb{R}, \quad p > 1.$$

b) Kolik členů řady

$$\sum \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

je třeba sečíst, aby částečný součet approximoval přesnou hodnotu součtu s chybou menší než 0,001?

c) Kolik členů řady

$$\sum \frac{2^n}{n!}$$

je třeba sečíst, abychom její součet approximovali s chybou menší než 0,01?

d) Najděte odhad zbytku pro Leibnizovu řadu


$$\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \ln 2.$$

Řešení. a) Daná řada konverguje; podle Věty 4.6 platí

$$R_n \leq \int_n^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} \left[\frac{1}{x^{p-1}} \right]_n^\infty = \frac{1}{(p-1)n^{p-1}}.$$

Například pro řadu $\sum \frac{1}{n^2}$ máme pro její zbytek odhad $R_n \leq \frac{1}{n}$, tj. její konvergence je „pomalá“.

b) Protože $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} < \frac{1}{n^3}$, plyne z Lemmatu 4.1 a z předchozího příkladu odhad zbytku $R_n < \frac{1}{2n^2}$. Nerovnost $\frac{1}{2n^2} \leq 0,001$, tj. $n^2 \geq 500$, je splněna pro $n \geq 23$. Stačí tedy sečíst 23 členy řady.



Součin řad a numerická
sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 98 z 261

c) Protože

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1},$$

podílové kritérium (v limitním tvaru) ukazuje, že řada konverguje. Dále je $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{1}{2}$ pro $n \geq 3$. Tedy pro $n \geq 3$ platí podle Věty 4.5

$$R_n \leq a_n \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = a_n = \frac{2^n}{n!}.$$


Nerovnost $\frac{2^n}{n!} < 0,01$, tj. $n! > 100 \cdot 2^n$ je, jak se snadno přesvědčíme, splněna pro $n \geq 8$. Stačí tedy sečíst 8 členů řady.

d) Podle Věty 4.4 je $|R_n| < \frac{1}{n+1}$. Abychom tedy určili číslo $\ln 2$ např. s chybou menší než 0,01, je třeba sečíst alespoň 100 členů řady $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$. To ukazuje, že tato řada je nevýhodná pro počítání logaritmu, její konvergence je příliš „pomalá“. Jiný způsob výpočtu logaritmu ukážeme v Příkladu 7.4.

Cvičení

4.1. Určete Cauchyův součin řad

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{a} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}.$$



Součin řad a numerická sumace řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 99 z 261


4.2. Necht' $q \in \mathbb{R}$, $q > 1$. Určete Cauchyův součin řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{q^n}$ se sebou samou. Pomocí získaného výsledku určete součet řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{q^n}$.

4.3. Kolik členů následujících řad je třeba sečíst, abychom jejich součet aproximovali s chybou menší než 0,01:


a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n!}$.

4.4. Kolik členů řady je třeba sečíst, aby zbytek byl menší než 0,0001:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$ b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$.



Součin řad a numerická sumace řad



*Člověk s jedněmi hodinkami ví přesně, kolik je hodin.
Člověk s dvojitými si není nikdy jistý.*

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 100 z 261



Kapitola 5

Posloupnosti a řady funkcí

Důležitou roli v matematice hrají nekonečné řady, jejichž členy jsou funkce $f_n(x)$. V tomto případě mluvíme o řadě funkcí $\sum f_n(x)$ a jejím součtem je nějaká funkce $f(x)$. K bouřlivému rozvoji řad funkcí došlo v druhé polovině 17. století a zejména pak v 18. století, kdy byly funkce vyjadřovány ve tvaru nekonečných řad. Středem pozornosti matematiků byly následující otázky pro počítání s nekonečnými řadami funkcí:

Jsou-li funkce $f_n(x)$ spojité na intervalu I , je také funkce $f(x) = \sum f_n(x)$ spojitá na I ?

Kdy lze integrovat nekonečnou řadu funkcí člen po členu, tj. zaměnit pořadí integrace a sumace?

Kdy lze derivovat nekonečnou řadu funkcí člen po členu, tj. zaměnit pořadí derivace a sumace?

Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 101 z 261

Odpovědi na tyto otázky budou obsahem této kapitoly. V následujících dvou kapitolách pak budeme podrobně studovat dva nejdůležitější případy řad funkcí, kterými jsou

▷ *mocninné řady*, kdy funkce $f_n(x)$ jsou mocninné funkce, tj. $f_n(x) = a_n x^n$; tyto řady jsou vhodné pro aproximaci (přibližné vyjádření) funkce v okolí bodu $x = 0$;

▷ *Fourierovy řady*, kdy funkce $f_n(x)$ jsou tvaru $f_n(x) = a_n \sin nx + b_n \cos nx$; tyto řady jsou vhodné pro aproximaci periodických funkcí.

Ukážeme, že klíčovou úlohu v těchto problémech hraje velmi důležitá vlastnost řad funkcí, kterou je *stejněměrná konvergence*.

5.1. Pojmy posloupnost a řada funkcí


Nejprve zavedme pojem bodové konvergence pro posloupnost funkcí.

Definice 5.1. Necht' $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost funkcí na intervalu I a $x_0 \in I$ je libovolné. Je-li číselná posloupnost $\{f_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentní, říkáme, že posloupnost $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ je *konvergentní v bodě* x_0 .

Řekneme, že posloupnost funkcí *bodově konverguje k funkci* $f(x)$ na intervalu I , jestliže konverguje v každém bodě $x \in I$, tj. ke každému $x \in I$ a každému $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Píšeme $\lim f_n(x) = f(x)$ pro $x \in I$ nebo $f_n \rightarrow f$ na I .

Všimněme si, že číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ závisí jak na volbě čísla ε , tak na volbě bodu $x \in I$, takže při témže ε a různých $x \in I$ může být příslušné n_0 různé.



Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 102 z 261


Příklad 5.1. Znázorněte prvních n členů posloupnosti funkcí $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ a určete její limitu:

$$a) f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1] \quad b) f_n(x) = \operatorname{arctg} nx, \quad x \in \mathbb{R}.$$


Řešení. Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1), \\ 1 & x = 1, \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} nx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x > 0, \\ 0 & x = 0, \\ -\frac{\pi}{2} & x < 0. \end{cases}$$

Všimněme si, že limitní funkce obou posloupností jsou nespojitě funkce, třebaže funkce x^n i $\operatorname{arctg} nx$ jsou spojité na \mathbb{R} .



Posloupnosti a řady funkcí

 Obrázek 5.1 byl vygenerován pomocí následujících posloupností příkazů.

```
> display(seq(plot(x^n,x=0..1,y=0..1,style=line,
> color=black),n=1..15));
> display(seq(plot(arctan((n)*x),x=-10..10,
> style=line, color=black),n=1..5));
```

Nekonečné řady funkcí definujeme analogicky jako číselné řady a bodovou konvergenci řad funkcí definujeme pomocí bodové konvergence posloupnosti n -tých částečných součtů.



Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 103 z 261




Obr. 5.1: Posloupnosti funkcí $\{x^n\}$ a $\{\text{arctg } nx\}$

Definice 5.2. Necht' $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost funkcí definovaných na intervalu I . Symbol

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad \text{nebo} \quad f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots \quad (5.1)$$

nazýváme *nekonečnou řadou funkcí*. Posloupnost $\{s_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, kde $s_n(x) = f_1(x) + \dots + f_n(x)$, nazýváme *posloupností částečných součtů* řady $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Jestliže posloupnost částečných součtů $\{s_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ konverguje pro všechna $x \in I$, řekneme, že řada (5.1) *bodově konverguje* na intervalu I a funkci $s(x) = \lim s_n(x)$ nazýváme *součtem řady* $\sum f_n(x)$.



Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Bodová konvergence posloupnosti funkcí, resp. řady funkcí, závisí na intervalu, na kterém konvergenci vyšetřujeme. Největší množinu (vzhledem k množinové inkluzi), na níž posloupnost funkcí bodově konverguje, nazýváme *oborem konvergence* posloupnosti funkcí $\{f_n(x)\}$. Stejně definujeme obor konvergence řady funkcí $\sum f_n(x)$.

Příklad 5.2. Určete obor konvergence řady:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x} .$$

Řešení. Postupujeme tak, že proměnnou x považujeme za parametr a pro toto x vyšetřujeme absolutní konvergenci, příp. konvergenci, číselné řady.


a) Podle podílového kritéria pro číselné řady platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)(n+2)} \frac{n(n+1)}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} |x| = |x| .$$

Proto řada konverguje pro $|x| < 1$. Jestliže $|x| = 1$, nelze podílovým kritériem o konvergenci rozhodnout, proto je třeba vyšetřit body $x = \pm 1$ zvlášť.

Je-li $x = 1$, dostáváme řadu $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ a tato řada je konvergentní (viz Příklad 1.2). Je-li $x = -1$, dostáváme řadu $\sum (-1)^n \frac{1}{n(n+1)}$, která konverguje absolutně. Pro $|x| > 1$ není splněna nutná podmínka konvergence.

Oborem konvergence dané řady je interval $[-1, 1]$, přičemž konvergence je absolutní.



Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

b) V tomto případě se jedná pro všechna $x \in \mathbb{R}$ o řadu s kladnými členy; použijeme odmocninové kritérium a dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{-n^2x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx} = 0 < 1 \quad \text{pro } x > 0.$$


Pro $x = 0$ dostáváme řadu $\sum 1$, která diverguje, a pro $x < 0$ řadu $\sum e^{n^2|x|}$, která je také divergentní. Oborem konvergence dané řady je interval $(0, \infty)$.

5.2. Stejněměrná konvergence

Jednou ze základních otázek v teorii posloupností a řad funkcí je, nakolik se vlastnosti členů posloupnosti přenášejí na limitní funkci, resp. součet řady. U některých vlastností nevyvstávají větší obtíže. Například limita posloupnosti (součet řady) nezáporných funkcí je zřejmě také nezáporná funkce; z vlastností posloupností reálných čísel rovněž plyne, že limita posloupnosti (součet řady) neklesajících funkcí je rovněž neklesající funkce. Oproti tomu, jak ukazuje Příklad 5.1, se na limitní funkci obecně nepřenáší velmi důležitá vlastnost, kterou je spojitost.

Tím je motivována následující definice „silnějšího typu“ konvergence, kterou je stejnoměrná konvergence posloupnosti funkcí:

Definice 5.3. Řekneme, že posloupnost funkcí $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ konverguje stejnoměrně k funkci $f(x)$ na intervalu I , jestliže ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, a všechna $x \in I$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Píšeme $f_n \rightrightarrows f$ na I .



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 106 z 261

Poznámka 5.1. Se stejnoměrnou konvergencí spojitých funkcí na intervalu $[a, b]$ jsme se setkali již v teorii metrických prostorů, kde jsme vyšetřovali metrický prostor $(C[a, b], \rho_c)$ (viz [3], str. 8, 22). Připomeňme, že $C[a, b]$ je množina reálných spojitých funkcí na intervalu $[a, b]$ a ρ_c je metrika tzv. stejnoměrné konvergence

$$\rho_c(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

Ukažme, že tato definice je ekvivalentní s Definicí 5.3. V metrickém prostoru $(C[a, b], \rho_c)$ posloupnost funkcí $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konverguje k funkci f , tj. $f_n(x) \xrightarrow{\rho_c} f(x)$, jestliže

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_c(f_n, f) = 0 &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = 0 \iff \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \text{ platí } \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \text{ a } \forall x \in [a, b] \text{ platí } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \end{aligned}$$


což je Definicí 5.3. Obecně lze v terminologii metrických prostorů definovat stejnoměrnou konvergenci jako konvergenci v prostoru ohraničených funkcí na intervalu I se suprémovou metrikou (viz [3, strana 15]).

Geometrický význam stejnoměrné konvergence $f_n \rightrightarrows f$ spočívá v tom, že od určitého indexu n_0 všechny další členy posloupnosti „leží v epsilonovém okolí“ limitní funkce f , tj. mezi grafy funkcí $f - \varepsilon$ a $f + \varepsilon$.

Srovnajme definici bodové a stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí.

▷ Bodová konvergence ($f_n \rightarrow f$):

$$(\forall x \in I)(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0)(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 107 z 261

▷ Stejněměrná konvergence ($f_n \rightrightarrows f$):

$$(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall x \in I)(\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0)(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Vidíme, že se oba pojmy od sebe liší pouze v „pořadí kvantifikátorů“ – zatímco v definici stejnoměrné konvergence závisí číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ pouze na volbě čísla $\varepsilon > 0$, v definici bodové konvergence je n_0 závislé i na bodě $x \in I$. Proto ze stejnoměrné konvergence posloupnosti $\{f_n\}$ k funkci f na I plyne bodová konvergence k f na I . Opak obecně neplatí, jak ukazuje následující příklad.

Příklad 5.3. Rozhodněte, zda posloupnost funkcí

$$f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^2x^2}$$


stejněměrně konverguje na intervalu $[0, 1]$.

Řešení. Pro každé $x \in [0, 1]$ platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx}{1 + n^2x^2} = 0.$$

Limitní funkcí posloupnosti je tedy $f(x) = 0$. Zjistíme, zda se jedná o stejnoměrnou konvergenci. Buď si přímo všimneme, že $f_n(\frac{1}{n}) = 1$ nebo postupujeme jako při hledání absolutního extrému funkce $y = \frac{2nx}{1+n^2x^2}$ na $[0, 1]$: určíme první derivace a zjistíme, v kterých bodech je rovna nule. Platí

$$\left(\frac{2nx}{1 + n^2x^2} \right)' = \frac{2n(1 - n^2x^2)}{(1 + n^2x^2)^2} = 0$$



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 108 z 261

pro $x = \frac{1}{n}$ a $x = -\frac{1}{n}$, přičemž hodnota $-\frac{1}{n}$ neleží ve vyšetřovaném intervalu. Pro $x = \frac{1}{n}$ dostaneme uvedenou hodnotu $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$.

Je-li nyní $0 < \varepsilon < 1$, pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $x = \frac{1}{n} \in [0, 1)$ platí, že

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{2nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1 > \varepsilon.$$

Proto není daná posloupnost stejnoměrně konvergentní na intervalu $[0, 1]$.

Stejnou konvergenci řady funkcí definujeme již snadno pomocí posloupnosti jejich n -tých částečných součtů.


Definice 5.4. Řekneme, že řada funkcí $\sum f_n(x)$ konverguje stejnoměrně na intervalu I ke svému součtu $s(x)$, jestliže posloupnost $\{s_n(x)\}$ jejich částečných součtů stejnoměrně konverguje na I k funkci $s(x)$.

5.3. Kritéria stejnoměrné konvergence

V tomto odstavci uvedeme kritéria pro vyšetřování stejnoměrné konvergence posloupnosti funkcí a zejména řady funkcí. Následující dvě tvrzení mají spíše teoretický význam a užívají se zejména v důkazech dalších kritérií a vět.

Lemma 5.1 (Cauchyovo-Bolzanovo kritérium stejnoměrné konvergence).

Posloupnost funkcí $\{f_n(x)\}$ konverguje stejnoměrně na intervalu I právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $m, n \in \mathbb{N}$, $m \geq n_0$, $n \geq n_0$ a pro všechna $x \in I$ platí $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 109 z 261

Důkaz. Necht' $f_n \rightrightarrows f$ na I a buď $\varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_0$ a $x \in I$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Tedy pro $m \geq n_0, n \geq n_0$ a $x \in I$ platí $|f_m(x) - f_n(x)| = |f_m(x) - f(x) - [f_n(x) - f(x)]| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Necht' je splněna podmínka věty. Volíme-li libovolně, ale pevně, bod $x_0 \in I$, vidíme, že číselná posloupnost $\{f_n(x_0)\}$ je cauchyovská a tedy konvergentní. Je tedy $\{f_n(x)\}$ bodově konvergentní na I . Označme $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$; nyní dokážeme, že $f_n \rightrightarrows f$ na I . Buď tedy $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $m \geq n_0, n \geq n_0$ a všechna $x \in I$ platí $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Limitním přechodem pro $m \rightarrow \infty$ odtud plyne $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. Tedy opravdu $f_n \rightrightarrows f$ na I . \square

Lemma 5.2 (Cauchyovo-Bolzanovo kritérium pro řady funkcí).


Řada funkcí $\sum f_n(x)$ je na intervalu I stejnoměrně konvergentní právě tehdy, když ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, libovolné $m \in \mathbb{N}$ a a každé $x \in I$ platí

$$|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \cdots + f_{n+m}(x)| < \varepsilon.$$

Důkaz. Podle definice řada $\sum f_n(x)$ stejnoměrně konverguje na I k $s(x)$ právě tehdy, když posloupnost částečných součtů $s_n(x)$ řady $\sum f_n(x)$ stejnoměrně konverguje k $s(x)$. Podle předchozího lemmatu je tato podmínka splněna právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, libovolné $m \in \mathbb{N}$ a pro všechna $x \in I$ platí

$$|s_{n+m}(x) - s_n(x)| = |f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \cdots + f_{n+m}(x)| < \varepsilon.$$

\square



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 110 z 261

Věta 5.1 (Weierstrassovo kritérium). *Necht' $\{f_n(x)\}$ je posloupnost funkcí na I . Necht' existuje posloupnost nezáporných čísel $\{a_n\}$ taková, že řada $\sum a_n$ konverguje a platí*

$$|f_n(x)| \leq a_n \quad \text{pro všechna } x \in I \text{ a } n \in \mathbb{N}.$$

Pak řada $\sum f_n(x)$ konverguje stejnoměrně na intervalu I .

Důkaz. Necht' jsou splněny podmínky věty. Zvolme $\varepsilon > 0$ libovolné. Podle Lemmatu 1.1 existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_0$ a libovolné $m \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+m} < \varepsilon$. Pak pro $n \geq n_0$, libovolné $m \in \mathbb{N}$ a každé $x \in I$ platí

$$|f_{n+1}(x) + \dots + f_{n+m}(x)| \leq |f_{n+1}(x)| + \dots + |f_{n+m}(x)| \leq a_{n+1} + \dots + a_{n+m} < \varepsilon.$$

Tvrzení nyní plyne z Lemmatu 5.2. □


Příklad 5.4. Rozhodněte, zda je řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ stejnoměrně konvergentní na \mathbb{R} .

Řešení. Pro všechna $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ platí $|\sin nx| \leq 1$, a proto

$$\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Číselná řada $\sum \frac{1}{n^2}$ je konvergentní (viz Příklad 2.1), proto podle Věty 5.1 řada $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$ konverguje stejnoměrně na \mathbb{R} .

Weierstrassovo kritérium je dobře prakticky použitelné, dává však pouze postačující podmínku stejnoměrné konvergence. K formulaci dalších kritérií, jejichž důkaz lze nalézt např. v [8, 18], zaveďme následující pojmy:



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 111 z 261

O posloupnosti funkcí $\{f_n(x)\}$ řekneme, že je na intervalu I *neklesající*, resp. *nerostoucí*, jestliže je číselná posloupnost $\{f_n(x_0)\}$ neklesající, resp. nerostoucí pro všechna $x_0 \in I$. Posloupnost funkcí, která je buď neklesající, nebo nerostoucí na I , se nazývá *monotonní* na I .

O posloupnosti funkcí $\{f_n(x)\}$ řekneme, že je na intervalu I *stejně omezená*, jestliže existuje $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a všechna $x \in I$ platí $|f_n(x)| \leq k$.

Věta 5.2 (Dirichletovo a Abelovo kritérium). *Necht' $\{f_n(x)\}$, $\{g_n(x)\}$ jsou posloupnosti funkcí na I , $\{g_n(x)\}$ je monotonní na I . Necht' je splněna některá z následujících podmínek:*


1. (Dirichlet) *Řada $\sum f_n(x)$ má stejně omezenou posloupnost částečných součtů a $g_n(x) \Rightarrow 0$ na I ;*
2. (Abel) *Řada $\sum f_n(x)$ stejně konverguje na I a posloupnost $\{g_n(x)\}$ je stejně omezená na I .*

Potom řada $\sum f_n(x)g_n(x)$ stejně konverguje na I .

Z Dirichletova kritéria plyne následující kritérium:

Důsledek 5.1. *Necht' posloupnost částečných součtů řady $\sum f_n(x)$ je stejně omezená na intervalu I a necht' $\{a_n\}$ je monotonní číselná posloupnost taková, že $\lim a_n = 0$. Pak řada $\sum a_n f_n(x)$ konverguje stejně na I .*

Příklad 5.5. Dokažte, že řada $\sum \frac{\sin nx}{n}$ konverguje stejně na intervalu $[\delta, 2\pi - \delta]$, kde $\delta \in \mathbb{R}$, $0 < \delta < \pi$ (viz Obr. 5.2, 5.3).



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 112 z 261

Řešení. V Příkladu 3.5-a) jsme dokázali, že daná řada konverguje na \mathbb{R} . Vyšetřeme nyní stejnoměrnou konvergenci. Položme $f_n(x) = \sin nx$, $a_n = \frac{1}{n}$ pro $n \in \mathbb{N}$. Podle Příkladu 3.5 je


$$s_n(x) = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx = \frac{\sin \frac{n+1}{2}x \sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{1}{2}x},$$

takže


$$|s_n(x)| \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}} \quad \text{pro } x \in [\delta, 2\pi - \delta].$$

Posloupnost $\{a_n\}$ je zřejmě nerostoucí a $\lim a_n = 0$, a proto podle Důsledku 5.1 konverguje řada $\sum \frac{\sin nx}{n}$ stejnoměrně na intervalu $[\delta, 2\pi - \delta]$.

Z obrázku 5.3 je vidět, že v bodech $x = k\pi$, kde $k \in \mathbb{N}$, se funkce bude „trhat“ a součet řady není v těchto bodech spojitou funkcí. Poznamenejme, že uvedená řada se nazývá Fourierovou řadou a její součet je $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{1}{2}(\pi - x)$ pro $x \in (0, 2\pi)$ (viz cvičení 8.12).

 Obrázky 5.2 a 5.3 byly vygenerovány pomocí procedury CSsoucetR:

```
> CSoucetR := proc (fce, p, i, rp, ri)
> RETURN(display(seq(plot(unapply(sum(fce, i
> = 1 .. o), p)(p), p = rp, labels = [' ', ' '],
> discontin=true), o = ri)))
> end:
> with(plots):
> s1:=CSoucetR(sin(n*x)/n, x, n, 0..2*Pi, 1):
> s2:=CSoucetR(sin(n*x)/n, x, n, 0..2*Pi, 4):
```



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 113 z 261





Obr. 5.2: n -tý částečný součet řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ pro $n = 1, 4, 35, x \in [0, 2\pi]$

```
> s3:=CSoucetR(sin(n*x)/n,x,n,0..2*Pi,35);
> display(s1,s2,s3);
> CSoucetR(sin(n*x)/n,x,n,-3*Pi..3*Pi,45);
```

K vytváření animovaných obrázků můžeme použít proceduru AnimR:

```
> AnimR := proc (fce, p, i, rp, poc)
> RETURN(animate(unapply(sum(fce,i=1 .. o),p)(p),
> p = rp,o = 1 .. poc, frames = poc))
> end;
```





Obr. 5.3: n -tý částečný součet řady $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ pro $n = 45$

Řadu pěkných příkladů na stejnoměrnou konvergenci číselných řad je možno najít na adrese <http://adela.karlin.mff.cuni.cz/kam/~pyrih/animace/k0061/kapitola.htm>. 🌿

Nejjednodušším kritériem pro stejnoměrnou konvergenci posloupnosti je patrně následující upravený „přepis definice“:


Věta 5.3. *Necht' $\{f_n(x)\}$ je posloupnost funkcí na I a*

$$a_n = \sup\{|f_n(x) - f(x)|; x \in I\}.$$

Platí $f_n \rightrightarrows f$ na I , právě když je posloupnost $\{a_n\}$ nulová, tj. $\lim a_n = 0$.

Příklad 5.6. Rozhodněte o stejnoměrné konvergenci následujících posloupností:

- a) $f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1)$ b) $f_n(x) = \arctg nx, \quad x \in \mathbb{R}.$



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 115 z 261

Řešení. a) Pro každé $x \in [0, 1)$ platí $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$. Limitní funkcí posloupnosti $\{x^n\}$ je tedy $f(x) = 0$. Avšak $a_n = \sup\{|x^n|; x \in [0, 1)\} = 1$, a proto podle Věty 5.3 není posloupnost $\{x^n\}$ stejnoměrně konvergentní na $[0, 1)$.

b) Podle Příkladu 5.1 b) platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} nx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x, \quad x \in \mathbb{R}.$$


Avšak pro $n \in \mathbb{N}$ libovolné platí

$$a_n = \sup\{|\operatorname{arctg} nx - \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x)|; x \in \mathbb{R}\} = \frac{\pi}{2},$$

a proto podle Věty 5.3 není daná posloupnost stejnoměrně konvergentní na \mathbb{R} . Jiné zdůvodnění, že tato posloupnost není stejnoměrně konvergentní, ukážeme v následujícím odstavci pomocí spojitosti.

5.4. Vlastnosti stejnoměrně konvergentních posloupností a řad funkcí

Stejneměrná konvergence je v teorii funkčních řad a posloupností velmi důležitá. Na Příkladu 5.1 jsme ukázali, že bodová konvergence není dostatečnou podmínkou k tomu, aby se některé důležité vlastnosti, jako je spojitost funkce, přenášely na limitní funkci. V tomto odstavci ukážeme několik nejdůležitějších vlastností stejnoměrně konvergentních posloupností a řad. Nejprve se budeme zabývat otázkou spojitosti, integrace a derivace pro posloupnosti funkcí a poté stejným problémem pro řadu funkcí.



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 116 z 261

Věta 5.4. *Nechť posloupnost funkcí $\{f_n(x)\}$ stejnoměrně konverguje na intervalu I k funkci f . Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ spojité na I , je i $f(x)$ spojitá na I .*

Důkaz. Nechť $x_0 \in I$. Buď $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{3} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ a pro všechna $x \in I$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$; speciálně tedy platí $|f_{n_0}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ pro všechna $x \in I$. Funkce f_{n_0} je spojitá na I , tedy i v bodě x_0 ; proto k číslu $\frac{\varepsilon}{3}$ existuje okolí $\mathcal{O}(x_0)$ bodu x_0 tak, že $|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ pro všechna $x \in \mathcal{O}(x_0) \cap I$. Odtud plyne pro $x \in \mathcal{O}(x_0) \cap I$ vztah $|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0) + f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$, což dokazuje spojitost funkce f v bodě x_0 . Bod x_0 byl však libovolný, a proto je f spojitá na I . \square

Příklad 5.7. Uvažujme posloupnosti funkcí z Příkladu 5.1:


$$a) f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1] \quad b) f_n(x) = \operatorname{arctg} nx, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Funkce x^n jsou spojité, avšak jejich limita není spojitá na $[0, 1]$. Proto posloupnost $\{x^n\}$ nemůže být na tomto intervalu stejnoměrně konvergentní.

Podobně plyne, že posloupnost $\{\operatorname{arctg} nx\}$ není stejnoměrně konvergentní na \mathbb{R} .

Věta 5.4 říká, že stejnoměrná konvergence je dostatečnou podmínkou pro to, aby limita posloupnosti spojitých funkcí byla spojitá. Následující věta ukáže, že v případě monotónní posloupnosti je předpoklad stejnoměrné konvergence nutný. Důkaz lze nalézt v [8, 15].

Věta 5.5 (Diniho). *Bud' $\{f_n(x)\}$ monotónní posloupnost spojitých funkcí na intervalu $[a, b]$ a necht' $f_n \rightarrow f$ na I . Je-li funkce f spojitá na $[a, b]$, pak $f_n \rightrightarrows f$ na $[a, b]$.*



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 117 z 261

Věta 5.6. *Nechť posloupnost funkcí $\{f_n(x)\}$ stejnoměrně konverguje na intervalu $[a, b]$ k funkci f . Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ integrovatelné na $[a, b]$, je i $f(x)$ integrovatelná na $[a, b]$ a platí $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$, tj.*


$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Důkaz. Buď $\varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{4(b-a)} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ a všechna $x \in [a, b]$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$. Vyberme takové $n \geq n_0$ pevně; tedy pro všechna $x \in [a, b]$ platí $f_n(x) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < f(x) < f_n(x) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$. Odtud mj. plyne, že f je ohraničená na $[a, b]$, neboť f_n je ohraničená. Protože f_n je integrovatelná na $[a, b]$, k číslu $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ existuje dělení $D = \{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ intervalu $[a, b]$ takové, že $S(D, f_n) - s(D, f_n) < \frac{\varepsilon}{2}$, kde $S(D, f_n)$, $s(D, f_n)$ je dolní a horní součet f_n při dělení D (viz např. [14]). Označíme-li $m_i = \inf\{f(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, $M_i = \sup\{f(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, $n_i = \inf\{f_n(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, $N_i = \sup\{f_n(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, plyne z předchozích nerovností $n_i - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \leq m_i \leq M_i \leq N_i + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$ pro všechna $i = 1, \dots, k$ a tedy i $M_i - m_i \leq N_i - n_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. Vynásobíme-li tuto nerovnost kladným číslem $(x_i - x_{i-1})$ a sečteme-li všechny takto vzniklé nerovnosti pro $i = 1, \dots, k$, obdržíme

$$S(D, f) - s(D, f) \leq S(D, f_n) - s(D, f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - x_{i-1}) = S(D, f_n) - s(D, f_n) + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Je tedy f integrovatelná na $[a, b]$.

Buď nyní opět $\varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ a všechna $x \in [a, b]$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. Tedy



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 118 z 261

pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$ platí

$$\left| \int_a^b f_n(x) \, dx - \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

tj. $\lim \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$. □

Lemma 5.3. *Bud' I interval, $x_0 \in I$ a $\{f_n(x)\}$ posloupnost funkcí, která stejnoměrně konverguje na $I \setminus \{x_0\}$ k funkci $f(x)$ ¹. Necht' pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje*


$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$. Pak existuje $\lim a_n$ a platí $\lim a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, tj.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right).$$

Důkaz. Bud' $\varepsilon > 0$ libovolné. Podle Cauchyova-Bolzanova kritéria k číslu $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $m \geq n_0$, $n \geq n_0$ a všechna $x \in I \setminus \{x_0\}$ platí $|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Tedy i $\lim_{x \rightarrow x_0} |f_m(x) - f_n(x)| = |a_m - a_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ pro $m \geq n_0$, $n \geq n_0$, takže číselná posloupnost $\{a_n\}$ je cauchyovská, a proto také konvergentní. Označme $\lim a_n = a$ a ukažme, že $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$.

Bud' opět $\varepsilon > 0$ libovolné. K číslu $\frac{\varepsilon}{3} > 0$ existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_1$ a všechna $x \in I \setminus \{x_0\}$ platí $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Protože $\lim a_n = a$, existuje

¹stejnou konvergencí na množině $I \setminus \{x_0\}$ rozumíme stejnoměrnou konvergenci na intervalech určených touto množinou



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 119 z 261

$n_2 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $n \geq n_2$ platí $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}$. Položme $n_3 = \max\{n_1, n_2\}$ a zvolme libovolně, ale pevně $n \geq n_3$. Protože $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$, k číslu $\frac{\varepsilon}{3}$ existuje okolí $\mathcal{O}(x_0)$ tak, že pro $x \in \mathcal{O}(x_0) \cap I, x \neq x_0$ platí $|f_n(x) - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}$. Tedy pro $x \in \mathcal{O}(x_0) \cap I, x \neq x_0$ platí $|f(x) - a| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - a_n| + |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$, což dokazuje vztah $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. \square


Věta 5.7. *Bud' $\{f_n(x)\}$ posloupnost funkcí, které mají na otevřeném intervalu I derivaci. Necht' $\{f_n(x)\}$ konverguje na I a $\{f'_n(x)\}$ konverguje stejnoměrně na I . Pak funkce $f(x) = \lim f_n(x)$ má na I derivaci a platí $f'(x) = \lim f'_n(x)$, tj.*

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

Důkaz. Bud' $x_0 \in I$ libovolný, ale pevný bod. Chceme dokázat, že $f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_0)$, tj.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0}.$$

Ukážeme, že posloupnost $\left\{ \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right\}$ stejnoměrně konverguje na $I \setminus \{x_0\}$. Bud' $\varepsilon > 0$ libovolné; protože $\{f'_n(x)\}$ konverguje stejnoměrně na I , k číslu $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro $m \geq n_0, n \geq n_0$ a všechna $x \in I$ platí $|f'_m(x) - f'_n(x)| < \varepsilon$. Volme pro okamžik $m \geq n_0, n \geq n_0$ pevně a $x \in I, x \neq x_0$. Podle Lagrangeovy věty existuje číslo c mezi x_0 a x tak, že platí $(f_m(x) - f_n(x)) -$



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 120 z 261

– $(f_m(x_0) - f_n(x_0)) = (f'_m(c) - f'_n(c))(x - x_0)$. Odtud plyne

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(x_0)}{x - x_0} - \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right| =$$

$$= \left| \frac{1}{x - x_0} ((f_m(x) - f_n(x)) - (f_m(x_0) - f_n(x_0))) \right| = |f'_m(c) - f'_n(c)| < \varepsilon.$$

Proto je posloupnost $\left\{ \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right\}$ podle Cauchyova-Bolzanova kritéria (Lemma 5.1) stejnoměrně konvergentní na $I \setminus \{x_0\}$.

Nyní zřejmě

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$


a pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} = f'_n(x_0)$.

Podle Lemmatu 5.3 existuje $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ a platí

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_0) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0). \end{aligned}$$

Bod $x_0 \in I$ byl libovolný, tedy pro každé $x \in I$ platí $f'(x) = \lim f'_n(x)$. \square

Nyní uvedeme věty o spojitosti, integraci a derivaci řady funkcí, které budeme později používat u mocninných řad. Tyto věty dávají velmi mocný nástroj pro práci s nekonečnými řadami tím, že umožňují integrovat, resp. derivovat, stejnoměrně konvergentní řady „člen po členu“.



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 121 z 261

Věta 5.8. *Necht' řada funkcí $\sum f_n(x)$ konverguje stejnoměrně na intervalu I a má součet $s(x)$. Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ spojité na I , pak je $s(x)$ spojitá na I .*

Důkaz. Necht' $\{s_n\}$ je posloupnost částečných součtů řady $\sum f_n(x)$. Podle předpokladu je $s_n \Rightarrow s$ na I . Avšak každá funkce s_n , jakožto součet konečného počtu funkcí spojitých na I , je spojitá na intervalu I . Tvrzení nyní plyne z Věty 5.4. \square


Věta 5.9. *Necht' řada funkcí $\sum f_n(x)$ stejnoměrně konverguje na intervalu $[a, b]$ a má součet $s(x)$. Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ integrovatelné na $[a, b]$, je $s(x)$ integrovatelná na $[a, b]$ a platí*

$$\int_a^b s(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx, \quad \text{tj.} \quad \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Důkaz. Je-li $\{s_n(x)\}$ posloupnost částečných součtů řady $\sum f_n(x)$, pak $s_n \Rightarrow s$ na $[a, b]$. Každá funkce $s_n(x)$ však, jakožto součet konečného počtu integrovatelných funkcí, je integrovatelná na $[a, b]$. Podle Věty 5.6 je $s(x)$ integrovatelná na $[a, b]$. Dále podle téhož tvrzení je

$$\begin{aligned} \int_a^b s(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b s_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f_1(x) + \dots + f_n(x)] dx = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b f_1(x) dx + \dots + \int_a^b f_n(x) dx \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx. \end{aligned}$$

\square



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 122 z 261

Příklad 5.8. Je dána řada funkcí $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx = s(x)$, kde $0 < r < 1$. Ukažte, že je funkce $s(x)$ spojitá na \mathbb{R} , a určete $\int_0^{2\pi} s(x) dx$.

Řešení. Ukažme nejprve, že je daná řada stejnoměrně konvergentní na \mathbb{R} . K tomu použijme Weierstrassovo kritérium: platí $|r^n \cos nx| \leq r^n$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, přičemž řada $\sum r^n$ je geometrická řada s kvocientem $|r| < 1$, tj. je konvergentní na \mathbb{R} .


Protože daná řada je stejnoměrně konvergentní a funkce $r^n \cos nx$ jsou spojitě na \mathbb{R} , je spojitá i funkce $s(x)$. K integraci použijeme Větu 5.9 a dostáváme

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^n \cos nx dx = \int_0^{2\pi} dx + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^n \cos nx dx = 2\pi + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left[\frac{\sin nx}{n} \right]_0^{2\pi} = 2\pi. \end{aligned}$$

Věta 5.10. *Bud' $\{f_n(x)\}$ posloupnost funkcí majících na otevřeném intervalu I derivaci. Necht' $\sum f_n(x)$ konverguje na I a $\sum f'_n(x)$ konverguje stejnoměrně na I . Pak funkce $s(x) = \sum f_n(x)$ má na I derivaci a platí*

$$s'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

Důkaz. Necht' $\{s_n\}$ je posloupnost částečných součtů řady $\sum f_n(x)$. Pak $\{s_n\}$ konverguje na I a $\{s'_n\}$ stejnoměrně konverguje na I . Podle Věty 5.7 má funkce



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 123 z 261

$s(x) = \sum f_n(x)$ derivaci na I a platí

$$s'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s'_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f'_1(x) + \dots + f'_n(x)) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

□

Poznámka 5.2. Za silnějšího předpokladu než je uveden ve Větě 5.10 – mají-li funkce $f_n(x)$ spojitou derivaci na otevřeném intervalu I – lze dokázat uvedené tvrzení bez použití Lemmatu 5.3 a Věty 5.7 takto:


Nechť $s(x) = \sum f_n(x)$, $S(x) = \sum f'_n(x)$. Pak funkce $S(x)$ je podle Věty 5.8 spojitá na I . Zvolme $x_0, x_1 \in I$, $x_1 > x_0$, libovolné. Podle Věty 5.9 je $S(x)$ integrovatelná na $[x_0, x_1]$ a platí

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} S(x) \, dx &= \int_{x_0}^{x_1} \sum f'_n(x) \, dx = \sum \int_{x_0}^{x_1} f'_n(x) \, dx = \\ &= \sum (f_n(x_1) - f_n(x_0)) = \sum f_n(x_1) - \sum f_n(x_0) = s(x_1) - s(x_0). \end{aligned}$$

Jelikož je $S(x)$ spojitá, má funkce $\int_{x_0}^x S(t) \, dt = s(x) - s(x_0)$ podle věty o integrálu jako funkci horní meze (viz [13]) derivaci na I a platí $S(x) = s'(x)$, tj. $\sum f'_n(x) = s'(x)$.

Cvičení

5.1. Určete limitu $f(x)$ následujících posloupností $\{f_n(x)\}$ a rozhodněte, zda se jedná o stejnoměrnou konvergenci na intervalu I :



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 124 z 261

a) $f_n(x) = x^n - x^{2n}$, $I = [0, 1]$ c) $f_n(x) = e^{-nx}$, $I = \mathbb{R}$.

b) $f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$, $I = [1, \infty)$



5.2. Určete obor konvergence následujících řad $\sum f_n(x)$:

a) $f_n(x) = (\ln x)^n$

c) $f_n(x) = \frac{n}{n+1} \frac{1}{(3x^2+4x+2)^n}$.

b) $f_n(x) = x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$

5.3. Pomocí Weierstrassova kritéria dokažte stejnoměrnou konvergenci následujících řad $\sum f_n(x)$:

a) $f_n(x) = \frac{x^n}{n^2}$, $I = [-1, 1]$

d) $f_n(x) = \frac{e^{-x^2 n^2}}{n^2}$, $I = \mathbb{R}$

b) $f_n(x) = \frac{x^n}{n^s}$, $s \in \mathbb{R}$, $I = [-1, 1]$

e) $f_n(x) = \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}$, $I = [0, \infty)$

c) $f_n(x) = \frac{\sqrt{1-x^{2n}}}{2^n}$, $I = [-1, 1]$

f) $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2 x^2}$, $I = [0, \infty)$.

5.4. Dokažte stejnoměrnou konvergenci následujících řad $\sum f_n(x)$:

a) $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$, $I = \mathbb{R}$

c) $f_n(x) = \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$, $I = [0, \infty)$

b) $f_n(x) = \ln\left(1 + \frac{x^2}{n \ln^2 n}\right)$, $|x| < a$, $a \in \mathbb{R}$

d) $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+x)}}$, $I = [0, \infty)$.

Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 125 z 261

5.5. Určete součet řady funkcí $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx = s(x)$, kde $0 < r < 1$, a ověřte, že funkce $s(x)$ je spojitá na \mathbb{R} (viz Příklad 5.8).


Návod: Sečtěte řadu $\sum_{n=0}^{\infty} (r^n \cos nx + ir^n \sin nx) = \sum_{n=0}^{\infty} (re^{ix})^n$.

5.6. Je dána řada $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$. Rozhodněte, zda je tato řada stejnoměrně konvergentní na $[\delta, \infty)$, $\delta > 0$, a určete

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx .$$



Není nic praktičtějšího než dobrá teorie.



Posloupnosti a řady funkcí

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 126 z 261



Kapitola 6

Mocninné řady

V předcházející kapitole jsme vyšetřovali řady funkcí $\sum f_n(x)$, jejíž členy jsou funkce $f_n(x)$ definované na intervalu I . Jestliže za funkce $f_n(x)$ zvolíme mocninné funkce $f_n(x) = a_n(x - x_0)^n$, pak takto vzniklou řadu budeme nazývat *mocninnou řadou*. V této kapitole uvidíme, že obor konvergence mocninné řady je jednobodová množina nebo interval. Ukážeme, že mocninné řady jsou stejnoměrně konvergentní na každém kompaktním podintervalu tohoto intervalu. Jak plyne z předcházející kapitoly, tato vlastnost umožňuje integrovat a derivovat mocninné řady člen po členu. V oddíle 6.3 ukážeme, jak lze funkce vyjádřit pomocí mocninných řad.

Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 127 z 261

6.1. Obor konvergence

Definice 6.1. Buď $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ posloupnost reálných čísel, x_0 libovolné reálné číslo. Mocninou řadou se středem v bodě x_0 a koeficienty a_n rozumíme řadu funkcí tvaru

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n.$$

Poznámka 6.1. Bez újmy na obecnosti lze předpokládat, že středem mocniné řady je číslo $x_0 = 0$. Jinak pomocí substituce $x - x_0 = y$ lze převést řadu o středu v bodě x_0 na mocninou řadu o středu v počátku.


Věta 6.1. Necht' $\sum a_n x^n$ je mocniná řada a necht'

$$a = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Je-li $a = 0$, pak řada absolutně konverguje pro všechna $x \in \mathbb{R}$ – říkáme, že řada vždy konverguje.

Je-li $a = \infty$, pak řada diverguje pro všechna $x \neq 0$ – říkáme, že řada vždy diverguje.

Je-li $0 < a < \infty$, pak řada absolutně konverguje pro $|x| < \frac{1}{a}$ a diverguje pro $|x| > \frac{1}{a}$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 128 z 261

Je-li $0 < a < \infty$, pak se číslo $r = \frac{1}{a}$ nazývá *poloměr konvergence* a interval $(-r, r)$ se nazývá *konvergenční interval*. Chování řady v krajních bodech konvergenčního intervalu je třeba vyšetřit zvlášť, protože závisí na tvaru mocninné řady. Oborem konvergence mocninné řady, která vždy *nediverguje*, je proto konvergenční interval s případnými jeho krajními body, pokud v nich řada konverguje.

Jestliže řada $\sum a_n x^n$ vždy konverguje, tj. $a = 0$, definujeme její poloměr konvergence jako $r = \infty$ a její konvergenční interval jako $(-\infty, \infty)$.

Jestliže řada $\sum a_n x^n$ vždy diverguje, tj. $a = \infty$, definujeme její poloměr konvergence jako $r = 0$.

Důkaz Věty 6.1. Nejprve poznamenejme, že každá mocninná řada $\sum a_n x^n$ konverguje ve svém středu, tj. v bodě $x = 0$. Pro lepší srozumitelnost provedeme důkaz za silnějšího předpokladu, kdy existuje $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$. Obecný případ lze dokázat obdobně; podrobný důkaz viz např. [8].


Necht' $x \neq 0$ je libovolné pevné číslo. Položme $c_n = a_n x^n$ a vyšetřujme absolutní konvergenci číselné řady $\sum c_n$. Podle odmocninového kritéria tato řada absolutně konverguje, jestliže platí

$$\lim \sqrt[n]{|c_n|} = \lim \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim \sqrt[n]{|a_n| |x|^n} = |x| \lim \sqrt[n]{|a_n|} = |x| a < 1.$$

Rozlišme tři případy:

(i) Je-li $a = 0$, pak $\lim \sqrt[n]{|c_n|} = 0$ a řada $\sum c_n = \sum a_n x^n$ konverguje absolutně v každém bodě $x \in \mathbb{R}$.

(ii) Je-li $a = \infty$, je $\lim \sqrt[n]{|c_n|} = \infty$ pro všechna $x \neq 0$, tj. řada diverguje pro všechna $x \neq 0$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 129 z 261

(iii) Necht' $0 < a < \infty$. Pak

$$\lim \sqrt[n]{|c_n|} = |x|a < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |x| < \frac{1}{a} = r,$$

odkud plyne, že řada $\sum c_n = \sum a_n x^n$ konverguje absolutně pro $|x| < r$ a diverguje pro $|x| > r$. \square

Poznámka 6.2. Existuje-li $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = a$, pak má mocninná řada $\sum a_n x^n$ poloměr konvergence

$$r = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$$

(přitom klademe $r = \infty$, je-li $a = 0$, a $r = 0$, je-li $a = \infty$).

Podle Poznámky 2.1 platí, že existuje-li $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, pak existuje také $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ a obě jsou si rovny. Proto pokud existuje tato limita, lze poloměr konvergence určit jako

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Příklad 6.1. Určete poloměr a obor konvergence následujících mocninných řad:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$


b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} x^n$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^n}{n!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n + \sqrt{n}}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^{2^n}$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 130 z 261

Řešení. a) Platí $a_n = \frac{1}{n}$, a proto poloměr konvergence je

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1,$$

tj. pro $x \in (-1, 1)$ řada absolutně konverguje. Je-li $x = -1$, dosazením do dané řady dostaneme Leibnizovu řadu $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, která je konvergentní (viz Příklad 3.1). Je-li $x = 1$, pak dostaneme harmonickou řadu $\sum \frac{1}{n}$, která je divergentní (Příklad 1.4). Obor konvergence je interval $[-1, 1)$.

Řešme nyní tento příklad s využitím Maplu, nejdříve opět metodou „krok za krokem“.

```
> a:=n->1/n: rada:=Sum(a(n)*x^n, n=1..infinity);
```

$$rada := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Pro poloměr konvergence dostáváme:


```
> Limit(abs(a(n)/a(n+1)), n=infinity):%=value(%);
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$$

Vyšetříme nyní krajní body intervalu $(-1, 1)$. Dosazením krajních bodů do dané řady dostáváme číselné řady – o jejich konvergenci, resp. divergenci rozhodneme pomocí procedury `csum`. Procedura vrací hodnotu `true` (řada konverguje) nebo `false` (řada diverguje).

```
> read `csum4.txt`:
```

```
> k1:=subs(x=-1, rada);csum(op(1,k1), n);
```



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 131 z 261

$$k1 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

true

> k2:=subs(x=1, rada); csum(op(1,k2), n);


$$k2 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

false

Tedy oborem konvergence je interval $[-1, 1)$.

Nyní se pokusíme výpočet poloměru konvergence zautomatizovat pomocí nových procedur. Uvádíme nejdříve procedury pomocné (používají se v případě, že střed mocninné řady není v bodě 0), vlastní výpočet pak provádí procedura `Polomer(rada)`. Parametr `rada` zadáváme ve tvaru $a_n x^n$, případně ve tvaru $a_n(x - x_0)^n$.

```
> NalezniStred := proc (rada)
> local pocet, i, poradi, stred;
> pocet := nops(rada);
> for i to pocet do if subs(x = 0, op(i, rada)) <>
> subs(x = 1, op(i, rada)) then
> poradi := i fi
> od;
> stred := -op(1, subs(x = 0, op(poradi, rada)));
> stred
> end;
```



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 132 z 261

```
> PrevedNaStred := proc (rada)
> local stred, i, pocet, poradi, mocnina, vysledek;
> pocet := nops(rada); for i to pocet do if
> subs(x = 0, op(i, rada)) <> subs(x = 1, op(i, rada))
> then poradi := i
> fi od;
> stred := NalezniStred(rada);
> mocnina := op(2, op(poradi, rada));
> if type(rada, ``)
> then vysledek := x^op(2, rada)
> else
> vysledek := rada/op(poradi, rada)*x^mocnina fi;
> vysledek
> end:
```



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 133 z 261

```

> Polomer := proc (a)
> local r, nrada, i, pocet, poradi,
> mocnina, y, f, g;
> nrada := PrevedNaStred(a); pocet := nops(nrada);
> for i to pocet do if
> subs(x = 0,op(i,nrada))<>subs(x = 1,op(i,nrada))
> then poradi := i fi od;
> mocnina := op(poradi,nrada);
> if type(nrada,`^`) then r := 1 else
> nrada :=nrada/mocnina;
> f:= solve({y = op(2,mocnina)},{n});
> g := subs(y = n,op(2,op(f)));
> nrada := subs(n = g,nrada);
> r := limit(abs(nrada/subs(n = n+1,nrada)),
> n = infinity)
> fi;
> end:

```

Řešení příkladu 6.1. a) s využitím těchto procedur vypadá takto

```

> Polomer(op(1,rada));

```

1


tj. poloměr konvergence je $r = 1$. K určování poloměru konvergence je možno použít i proceduru `PSconv` z balíku `math` [19].

```

> with(math):#pouze, pokud je balík instalován
> PSconv(rada);

```

1



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 134 z 261



b) Pro poloměr konvergence platí

$$r = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n (n+1)^2}{n^2 2^{n+1}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} = \frac{1}{2}.$$

V krajních bodech intervalu $x = \pm \frac{1}{2}$ dostáváme řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad \text{a} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

kteřé konvergují. Proto je oborem konvergence interval $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

✿ K řešení dále využíváme obě výše uvedené procedury.

> rada:=Sum(2^n*x^n/(n^2), n=1..infinity);

$$rada := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n^2}$$

> Polomer(op(1, rada));


$$\frac{1}{2}$$

> k1:=subs(x=-1/2, rada); csum(op(1, k1), n);

$$k1 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \left(\frac{-1}{2}\right)^n}{n^2}$$

true

> k2:=subs(x=1/2, rada); csum(op(1, k2), n);



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 135 z 261

$$k2 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \left(\frac{1}{2}\right)^n}{n^2}$$

true

Znamená to, že v krajních bodech $x = \pm \frac{1}{2}$ řada konverguje, tj. oborem konvergence je interval $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

c) Pro tuto řadu je $a_n = \frac{n}{n!}$, a proto

$$r = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{n(n+1)!}{n!(n+1)} = \lim n = \infty.$$

Obor konvergence je interval $(-\infty, \infty)$ – řada vždy konverguje.

> rada := Sum(n*x^n/(n!), x=1..infinity);

$$rada := \sum_{x=1}^{\infty} \frac{n x^n}{n!}$$

Použijeme-li proceduru PSconv autora A. F. Walze dostáváme chybný výsledek:

> PSconv(rada);


1

Námi uvedená procedura Polomer dává

> Polomer(op(1, rada));

∞

což je správný výsledek.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 136 z 261

d) Střed této řady je bod $x_0 = -2$ a poloměr konvergence

$$r = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1 + \sqrt{n+1}}{n + \sqrt{n}} = 1.$$

Konvergenční interval je proto $x \in (-3, -1)$. V bodě $x = -3$ je řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-3+2)^n}{n + \sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}}$$


divergentní, např. použijeme-li srovnávacího kritéria s řadou $\sum \frac{1}{2n}$. V bodě $x = -1$ je řada $\sum \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$ konvergentní podle Leibnizova kritéria (Věta 3.1). Proto je oborem konvergence interval $(-3, -1]$.

Opět otestujeme obě procedury. V tomto případě procedura PSconv dává správný výsledek, naopak naše procedura vyžaduje asistenci:

- > a := n -> 1 / (n + sqrt(n)) :
- > rada := Sum((-1)^n * a(n) * (x+2)^n, n=1..infinity) ;

$$rada := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n + \sqrt{n}}$$

- > PSconv(rada) ;
1
- > NalezniStred(op(1, rada)) ;
-2
- > Polomer(op(1, rada)) ;



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 137 z 261

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n (n+1 + \sqrt{n+1})}{(n + \sqrt{n}) (-1)^{(n+1)}} \right|$$

Zde Maple není schopen spočítat uvedenou limitu. Po úpravě (odstranění absolutní hodnoty) již dostáváme správný výsledek.

> `limit(a(n)/a(n+1), n=infinity);`

1

> `k1:=simplify(subs(x=-3,rada));csum(op(1,k1),n);`

$$k1 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{(2n)}}{n + \sqrt{n}}$$

false


> `k2:=subs(x=-1,rada);csum(op(1,k2),n);`

$$k2 := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$$

true

e) Pro poloměr konvergence platí

$$r = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}} = \lim \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e}.$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 138 z 261



V krajním bodě $x = \frac{1}{e}$ není splněna nutná podmínka konvergence (Věta 1.1), neboť užitím l'Hospitalova pravidla lze ukázat, že

$$\lim \frac{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}{e^n} = \lim \left(\frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{e} \right)^n = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Proto také v bodě $x = -\frac{1}{e}$ není splněna nutná podmínka konvergence a oborem konvergence je interval $(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e})$.


f) Zde je

$$a_n = \begin{cases} 2^k & \text{pro } n = 2k, \\ 0 & \text{pro } n = 2k - 1. \end{cases}$$

Pak pro $n = 2k$ je $\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[2k]{2^k} = \sqrt{2}$ a pro $n = 2k - 1$ je $\sqrt[n]{|a_n|} = 0$, tj.

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} \sqrt{2} & \text{pro } n = 2k, \\ 0 & \text{pro } n = 2k - 1. \end{cases}$$

Proto $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt{2}$ a poloměr konvergence je $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$. V krajních bodech $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ není splněna nutná podmínka konvergence, neboť $\lim 2^n (\frac{1}{\sqrt{2}})^{2n} = 1$. Oborem konvergence je tedy interval $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 139 z 261

6.2. Vlastnosti a součet mocninné řady

Jak víme z Kapitoly 5, klíčovou roli u funkcionálních řad hraje stejnoměrná konvergence. Následující věta říká, na jakém intervalu je mocninná řada stejnoměrně konvergentní.

Věta 6.2. *Nechť $r > 0$ je poloměr konvergence mocninné řady $\sum a_n x^n$. Pak tato řada stejnoměrně konverguje na každém uzavřeném podintervalu $[-\rho, \rho]$ intervalu $(-r, r)$.*

Důkaz. Nechť $x \in [-\rho, \rho]$, kde $0 < \rho < r$. Pak


$$|a_n x^n| = |a_n| |x^n| \leq |a_n| \rho^n,$$

přičemž číselná řada $\sum |a_n| \rho^n$ konverguje podle Věty 6.1. Z Weierstrassova kritéria (Věta 5.1) plyne, že řada $\sum a_n x^n$ konverguje stejnoměrně na $[-\rho, \rho]$. \square

Tato věta má následující tři důsledky o součtu, integraci a derivaci mocninných řad.

Důsledek 6.1. *Nechť mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence $r > 0$. Pak součet této řady je spojitá funkce na intervalu $(-r, r)$.*

Důkaz. Buď $x_0 \in (-r, r)$ libovolný, ale pevný bod. Pak existuje ρ ($0 < \rho < r$) tak, $x_0 \in [-\rho, \rho]$. Z Vět 5.8, 6.2 a ze skutečnosti, že všechny funkce $a_n x^n$ jsou spojitě na \mathbb{R} , plyne, že součet mocninné řady je spojitá funkce na $[-\rho, \rho]$. Zejména je tato funkce spojitá v bodě x_0 , a protože x_0 je libovolný bod z $(-r, r)$, je tato funkce spojitá na intervalu $(-r, r)$. \square



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 140 z 261

Důsledek 6.2. Necht' mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence $r > 0$. Pak pro všechna $x \in (-r, r)$ platí

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad (6.1)$$

přičemž mocninná řada na pravé straně má stejný poloměr konvergence r .

Důkaz. Vztah 6.1 plyne z Věty 6.2 a 5.10. Dokažme, že mocninná řada na pravé straně vztahu 6.1 má stejný poloměr konvergence. Důkaz provedeme za silnějšího předpokladu, kdy existuje $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$. Obecný případ lze nalézt v [8, 15].

Použijeme-li Větu 6.1 pro řadu na pravé straně rovnosti (6.1), dostaneme


$$\lim \sqrt[n+1]{|a_n|} = \frac{\lim \sqrt[n+1]{|a_n|}}{\lim \sqrt[n+1]{n+1}} = \frac{1}{r},$$

neboť $\lim \sqrt[n+1]{|a_n|} = \lim |a_n|^{\frac{1}{n+1}} = \lim (\sqrt[n]{|a_n|})^{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{r}$ a užitím l'Hospitalova pravidla je $\lim \sqrt[n+1]{n+1} = 1$. □

Z Důsledku 6.2 okamžitě plyne tvrzení o integraci mocninné řady v konstantních mezích:

Důsledek 6.3. Necht' mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence $r > 0$. Pak pro libovolný interval $[a, b] \subset (-r, r)$ platí

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} b^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} a^{n+1}. \quad (6.2)$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 141 z 261

Příklad 6.2. Určete součet mocninné řady $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ a pomocí integrace této řady určete součet číselné řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$.

Řešení. Danou mocninnou řadu lze sečíst jako geometrickou řadu s kvocientem x , kde $|x| < 1$. Dostaneme

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1.$$

Poznamenejme, že $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ a $\int x^{n-1} dx = \frac{x^n}{n}$. Odtud plyne, že

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^{n-1} dx = \frac{1}{n2^n},$$


a podle Důsledku 6.3 je součet číselné řady

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{2}} x^{n-1} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \right) dx = \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x} dx = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2. \end{aligned}$$

Důsledek 6.4. *Nechť mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence $r > 0$. Pak pro všechna $x \in (-r, r)$ platí*

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad (6.3)$$

přičemž mocninná řada na pravé straně má opět poloměr konvergence r .



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 142 z 261

Důkaz. Tvzení o existenci derivace $s'(x)$ a rovnost ve vztahu (6.3) vplynou ihned z Věty 6.2 a Věty 5.9, jakmile dokážeme tvrzení o rovnosti poloměrů konvergence řad v (6.3). Ukažme, že mocnná řada na pravé straně vztahu (6.3) má stejný poloměr konvergence. Důkaz opět provedeme za silnějšího předpokladu, kdy existuje $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$.

Použijeme-li Větu 6.1 pro řadu na pravé straně rovnosti (6.3), dostaneme

$$\lim \sqrt[n-1]{n|a_n|} = \lim \sqrt[n-1]{n} \lim \sqrt[n-1]{|a_n|} = \frac{1}{r},$$

neboť $\lim \sqrt[n-1]{|a_n|} = \lim |a_n|^{\frac{1}{n-1}} = \lim \left(\sqrt[n]{|a_n|} \right)^{\frac{n}{n-1}} = \frac{1}{r}$ a $\lim \sqrt[n-1]{n} = 1$. □


Příklad 6.3. Určete poloměr konvergence a součet mocnné řady $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$. Pomocí

získaného výsledku sečtěte číselnou řadu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

Řešení. Poznamenejme, že součet číselné řady $\sum \frac{n}{2^n}$ jsme určili v Příkladu 1.2 c), a to přímo z definice součtu řady. Ukažme nyní jiný postup sčítání číselných řad – pomocí mocnných řad.

Uvažujme mocnnou řadu $\sum nx^n$. Její poloměr konvergence je $r = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{n}{n+1} = 1$. Součet řady určíme z rovnosti $(x^n)' = nx^{n-1}$ a z věty o derivaci řady (Důsledek 6.4). Dostáváme

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$



Mocnné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 143 z 261

pro všechna $x \in (-1, 1)$. Odtud dosazením za $x = \frac{1}{2}$ dostaneme

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{(1 - \frac{1}{2})^2} = 2.$$

Známe-li součet mocninné řady, můžeme určovat součty číselných řad pro všechna x ležící uvnitř konvergenčního intervalu. Chceme-li určit součet číselné řady v krajním bodě konvergenčního intervalu, je třeba použít následující Abelovu větu:


Věta 6.3 (Abelova). *Necht' mocninná řada $\sum a_n x^n$ má poloměr konvergence r , kde $0 < r < \infty$ a necht' je v bodě $x = r$ tato řada konvergentní. Pak součet $s(x)$ této řady je funkce zleva spojitá v bodě r , tj. platí $\lim_{x \rightarrow r^-} s(x) = \sum a_n r^n$.*

Důkaz. Stačí ukázat, že za uvedených předpokladů je konvergence řady $\sum a_n x^n$ stejnoměrná na intervalu $[0, r]$. Pro $x \in [0, r]$ je $a_n x^n = a_n r^n \left(\frac{x}{r}\right)^n$; protože $\sum a_n r^n$ je konvergentní číselná řada, konverguje stejnoměrně na $[0, r]$. Dále posloupnost $\left\{\left(\frac{x}{r}\right)^n\right\}$ je na $[0, r]$ nerostoucí a stejnoměrně ohraničená posloupnost funkcí. Tvrzení nyní plyne z Abelova kritéria (Věta 5.2). \square

Příklad 6.4. Vyjádřete funkci $\ln(1+x)$ mocninnou řadou a odtud určete součet Leibnizovy řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$.

Řešení. Pro $x \in (-1, 1)$ platí

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 144 z 261

Odtud podle Důsledku 6.2 obdržíme pro $x \in (-1, 1)$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + \dots) dt = \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.\end{aligned}$$

Pro $x = 1$ dostaneme Leibnizovu řadu $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, což je konvergentní řada, a proto podle Abelovy věty (Věta 6.3) je její součet

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln 2.$$

Poznamenejme, že pro $x = -1$ řada diverguje, a proto získaný rozvoj funkce $\ln(1+x)$ do mocninné řady platí na intervalu $(-1, 1]$.


Příklad 6.5. Určete poloměr konvergence a součet následujících řad:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^n$

Řešení. a) Pro poloměr konvergence platí $r = \limsup \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[4n-3]{\frac{1}{4n-3}} = 1$.
Derivací řady člen po členu dostaneme

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n-4} = \frac{1}{1-x^4}$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 145 z 261

pro $x \in (-1, 1)$. Odtud integrací a rozkladem na parciální zlomky plyne

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3} = \int_0^x \frac{1}{1-t^4} dt = \frac{1}{4} \int_0^x \frac{dt}{1-t} + \frac{1}{4} \int_0^x \frac{dt}{1+t} + \frac{1}{2} \int_0^x \frac{dt}{1+t^2},$$

odkud dostáváme

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3} = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctg x, \quad x \in (-1, 1).$$

b) Nejdříve upravíme n -tý člen řady tak, abychom jej vyjádřili pomocí derivace:


$$(x^{n+2})' = (n+2)x^{n+1}, \text{ pak } (n+2)x^n = \frac{1}{x} (x^{n+2})'.$$

Dalším derivováním dostáváme

$$n(n+2)x^{n-1} = \left(\frac{1}{x} (x^{n+2})' \right)', \text{ pak } n(n+2)x^n = x \left(\frac{1}{x} (x^{n+2})' \right)'$$

Nyní dosadíme do řady

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} x \left(\frac{1}{x} (x^{n+2})' \right)' = x \left(\frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+2} \right)' \right)' = \\ &= x \left(\frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{1-x} \right)' \right)' = x \left(\frac{3x - 2x^2}{(1-x)^2} \right)'. \end{aligned}$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 146 z 261

Po úpravě je součet řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^n = x \frac{3-x}{(1-x)^3} \quad \text{pro } |x| < 1.$$

Odtud např. pro $x = \frac{1}{3}$ dostaneme součet číselné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{3^n} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{3 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3} = \frac{8}{9} \cdot \frac{27}{8} = 3.$$


Poznámka 6.3. Mají-li dvě mocninné řady $\sum a_n x^n$ a $\sum b_n x^n$ stejný poloměr konvergence a též součet na konvergenčním intervalu, pak platí $a_n = b_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Důkaz lze nalézt např. v [8, 18].

6.3. Taylorova a Maclaurinova řada

Na rozdíl od předcházejícího odstavce, kdy byla dána mocninná řada a určovali jsme její součet, budeme řešit opačnou úlohu: danou funkci budeme rozvíjet do mocninné řady, tzv. Taylorovy řady. Rozvoje funkcí do mocninných řad mají velké aplikace, kterým je věnována následující Kapitola 7.

Připomeňme Taylorovu větu z diferenciálního počtu, kdy je funkce vyjádřena ve tvaru polynomu a zbytku: Necht' f je funkce, která má derivace až do řádu $n+1$ v uzavřeném intervalu I , jehož krajní body jsou čísla x a x_0 . Pak platí

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 147 z 261

kde $R_n(x)$ je Taylorův zbytek, pro který platí

$$R_n(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\vartheta), \quad \text{kde } \vartheta \in I, \vartheta \neq x, x_0. \quad (6.4)$$

Je proto přirozené zavést následující definici:

Definice 6.2. Necht' funkce f má v bodě x_0 derivace všech řádů. Mocninnou řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

nazýváme *Taylorovou řadou* funkce f v bodě x_0 .


Je-li $x_0 = 0$, mluvíme o Maclaurinově řadě, která je tedy tvaru $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

Obecně nemusí platit, že součet Taylorovy řady funkce; f je roven této funkci. Následující dvě věty udávají podmínky, kdy tato rovnost platí.

Věta 6.4. Necht' funkce f má v nějakém bodě x_0 derivace všech řádů. Pak platí

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (6.5)$$

na intervalu I obsahujícím bod x_0 právě tehdy, když pro posloupnost $\{R_n(x)\}$ Taylorových zbytků platí $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ pro všechna $x \in I$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 148 z 261

Důkaz. Rovnost (6.5) platí na I právě tehdy, když $\lim s_n(x) = f(x)$ pro $x \in I$. Avšak $s_n(x) = T_n(x) = f(x) - R_n(x)$, takže $\lim s_n(x) = f(x)$ právě tehdy, když $\lim R_n(x) = 0$ na I . \square


Poznámka 6.4. Dá se ukázat, že lze-li funkci f na nějakém intervalu I , jehož vnitřním bodem je x_0 , rozvést do mocninné řady o středu x_0 , pak je takový rozvoj pouze jediný a je současně Taylorovým rozvojem funkce f . Důkaz tohoto tvrzení lze nalézt v [8].

Věta 6.5. *Nechť funkce f má na otevřeném intervalu I derivace všech řádů a nechť posloupnost $\{f^{(n)}\}$ je stejnoměrně ohraničená na I . Pak Taylorova řada funkce f v libovolném bodě $x_0 \in I$ konverguje na I k f , tj. platí (6.5).*

Důkaz. Podle předpokladu existuje $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$ tak, že $|f^{(n)}(x)| \leq k$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a všechna $x \in I$. Podle (6.4) je $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, odkud $|R_n(x)| \leq \frac{k}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$. Protože řada $\sum \frac{k}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$ konverguje pro každé $x \in I$, jak se snadno přesvědčíme např. podílovým kritériem, platí podle Věty 1.1

$$\lim \frac{k}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1} = 0, \quad \text{proto} \quad \lim R_n(x) = 0, \quad x \in I.$$

Tvrzení nyní plyne z Věty 6.4. \square



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 149 z 261

Příklad 6.6 (Maclaurinovy řady elementárních funkcí).



$$(1) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$(2) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$(3) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$(4) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

$$(5) \quad (1+x)^a = 1 + \binom{a}{1}x + \cdots + \binom{a}{n}x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n}x^n$$

kde $a \in \mathbb{R}$ a číslo

$$\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)}{n!}$$

je *binomický koeficient*.

Rozvoje (1), (2) a (3) platí pro $x \in \mathbb{R}$, (4) pro $x \in (-1, 1]$ a (5) pro $x \in (-1, 1)$.

Řešení. Rozvoj (4) byl již odvozen v Příkladu 6.4 a je znázorněn na Obr. 6.1.

Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 150 z 261



Obr. 6.1: Funkce $\ln(1+x)$ a n -tý částečný součet Maclaurinovy řady této funkce pro $n = 1, 2, 3$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 151 z 261

Ukažme nyní na rozvoji funkce $\ln(1+x)$ některé možnosti, které nám Maple poskytuje pro podporu tématu Taylorova řada.

```
> f := x -> ln(1+x);
```

$$f := x \rightarrow \ln(1+x)$$

Určíme Taylorův polynom 3. stupně se středem v bodě 0. Spočítáme potřebné derivace funkce f :

```
> derivace1 := (D)(f);
```

$$\text{derivace1} := x \rightarrow \frac{1}{1+x}$$

> derivace2 := (D@@2)(f);

$$\text{derivace2} := x \rightarrow -\frac{1}{(1+x)^2}$$

> derivace3 := (D@@3)(f);

$$\text{derivace3} := x \rightarrow 2\frac{1}{(1+x)^3}$$

Podle věty 6.4 platí:

> TayloruvPolynom[3] := f(0) + derivace1(0)*x +
 > derivace2(0)*x^2/2 + derivace3(0)*x^3/6;


$$\text{TayloruvPolynom}_3 := x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

Tento postup lze zobecnit pro libovolnou funkci (splňující předpoklady definice).

> TaylorPol :=
 > (f, x0, n) -> sum((D@@i)(f)(x0)/i!* (x-x0)^i, i=0..n);

$$\text{TaylorPol} := (f, x0, n) \rightarrow \sum_{i=0}^n \frac{(D^{(i)}(f)(x0)(x-x0)^i}{i!}$$

> TayloruvPolynom := TaylorPol(f, 0, 3);



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 152 z 261

$$\text{TayloruvPolynom} := x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

Ke kontrole výpočtu můžeme použít předdefinovanou proceduru `taylor`. Proceduru voláme příkazem `taylor(f, eqn, n)`, kde `eqn` je rovnice tvaru $x = c$, c je střed Taylorova polynomu. Zápis $x = c$ lze zkrátit pouhým c . Pro takto zadané n platí, že je-li $T(x)$ Taylorův polynom stupně $n - 1$ a $R(x) = |f(x) - T(x)|$, pak $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x^n} < \infty$.

```
> taylor(f(x), x=0, 4);
```

$$x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)$$

Výsledkem je datová struktura typu `series`. Převod na datový typ polynom provedeme příkazem:

```
> TayloruvPolynom := convert(%, polynomial);
```

$$\text{TayloruvPolynom} := x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

Nyní vytvoříme procedury pro animaci Taylorových polynomů:


```
> with(plots):
```

Význam parametrů procedury `TRada` je shodný s funkcí `TaylorPol`.

Procedura `TPlots` vytvoří n -člennou posloupnost, kde i -tý člen je graf Taylorova polynomu i -tého stupně.

```
> TPlots := proc(f, x0, n, int_x, int_y, degree)
```

```
> local p, text, tplot, j, bar:
```



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 153 z 261

```

> option remember:
> p:=[]:
> bar:=1/n:
> for j from 1 to n do
> tplot:=plot(TRada(f,x0,j),x=int_x,y=int_y,
> thickness=2,color=COLOR(RGB,0+j*bar,0,1-j*bar));
> if degree then
> text:=textplot([op(1,int_x)+op(2,int_x)/10,
> op(2,int_y),cat('Stupen`,j)],align=BELOW);
> p:=p,[display(tplot,text)] else
> p:=p,tplot;
> fi;
> od:
> end:


```

Příkazem `Tplots(f, x0, n, int_x, int_y, degree);` proceduru pro vykreslení voláme. `x0` je střed Taylorova polynomu, `n` jeho stupeň, `int_x` a `int_y` rozsahy zobrazovaných hodnot na osách x a y a konečně `degree` je proměnná, jež nabývá logických hodnot `true` nebo `false`. Pokud je její hodnota `true`, vypisuje se v grafu i stupeň Taylorova polynomu.

```

> TaylorAnimat := proc(f,x0,n,int_x,int_y)
> local p,fplot,tplots:
> p:=TPlots(f,x0,n,int_x,int_y,true):
> fplot:=display(plot(f(x),x=int_x,y=int_y,
> color=aquamarine,thickness=3)):

```



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 154 z 261


```

> tplots:=display(fplot,p):
> display(tplots,fplot);
> end:
> TaylorAnimat2 := proc(f,x0,n,int_x,int_y)
> local d,j,fplot,tplots:
> option remember:
> d:=[]:
> for j from 1 to n do
> d:=d,[display(TPlots(f,x0,j,int_x,int_y,false))]
> od:
> fplot:=plot(f(x), x=int_x, y=int_y,
> color=aquamarine, thickness=3):
> tplots:=display(fplot,d):
> display(fplot,tplots);
> end:

```

Význam parametrů u procedur `TaylorAnimat` a `TaylorAnimat2` je shodný s procedurou `Tplots`. Procedury se liší ve způsobu zobrazování animace, procedura `TaylorAnimat` zobrazuje spolu s původní funkcí vždy pouze jeden z Taylorových polynomů, procedura `TaylorAnimat2` do grafu Taylorovy polynomy postupně přidává. Animace si je možno prohlédnout [zde](#). 

Ve všech ostatních případech byl tvar Maclaurinovy řady nalezen v diferenciálním počtu, viz např. [13]. Zbývá ověřit, že součet Maclaurinovy řady dané funkce f je právě tato funkce f .



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 155 z 261

(1) Je-li $f(x) = e^x$, pak $f^{(n)}(x) = e^x$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, takže je-li $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$, je $|f^{(n)}(x)| \leq e^r$ na $[-r, r]$. Podle Věty 6.5 konverguje řada (1) k e^x na $[-r, r]$. Protože $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$ bylo libovolné, platí tvrzení.

(2) Protože $\sin^{(n)} x = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$, pro $f(x) = \sin x$ platí $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a všechna $x \in \mathbb{R}$. Z Věty 6.5 pak plyne tvrzení.

(3) Důkaz tvrzení pro funkci $\cos x$ je analogické jako pro $\sin x$.

(4) Pro funkci $f(x) = (1+x)^a$ vyjádříme Taylorův zbytek v Cauchyově tvaru (viz [13]):


$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\Theta x)}{n!} x^{n+1} (1 - \Theta)^n, \quad \text{kde } 0 < \Theta < 1.$$

Pak platí

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!} (1+\Theta x)^{a-n-1} x^{n+1} (1-\Theta)^n = \\ &= \frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!} x^{n+1} \left(\frac{1-\Theta}{1+\Theta x}\right)^n (1+\Theta x)^{a-1}. \end{aligned}$$

Je-li $x = 0$, je tvrzení věty zřejmé. Je-li $x \in (-1, 1)$, $x \neq 0$, pak řada $\sum \frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!} x^{n+1}$ absolutně konverguje, jak se snadno přesvědčíme podílovým kritériem. Z Vety 1.1 dostáváme $\lim \frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!} x^{n+1} = 0$. Dále platí $0 < \frac{1-\Theta}{1+\Theta x} < 1$, tedy; $0 < \left(\frac{1-\Theta}{1+\Theta x}\right)^n < 1$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Konečně je $(1-|x|)^{a-1} < (1+\Theta x)^{a-1} < (1+|x|)^{a-1}$. Odtud tedy $\lim R_n(x) = 0$ na intervalu $(-1, 1)$ a tvrzení plyne z Věty 6.4.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 156 z 261




Obr. 6.2: Funkce $(1+x)^3$ a její Maclaurinovy polynomy 1 , $1+3x$, $1+3x+3x^2$

Poznámka 6.5. Řada $\sum \binom{n}{k} x^k$ se nazývá *binomická řada*. Dva její speciální případy jsou dobře známé ze střední školy:

a) Necht' $a = n$, kde $n \in \mathbb{N}$. Pro $k \leq n$ je binomický koeficient $\binom{n}{k}$ známé *kombinační číslo*, pro $k \geq n + 1$ je $\binom{n}{k} = 0$. Platí proto

$$(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n,$$

což je *binomická věta*.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 157 z 261

b) Necht' $a = -1$. Platí $\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\dots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k$, a proto

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - \dots,$$

což je *geometrická řada*.

Příklad 6.7. Rozviňte následující funkce do Maclaurinovy řady a určete jejich obor konvergence:

a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

c) $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

b) $f(x) = \arctg x$


d) $f(x) = e^{-x^2}$.

Řešení. a) Položíme-li $-x^2 = t$, dostaneme funkci $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+t}} = (1+t)^{-\frac{1}{2}}$. Její rozvoj do binomické řady je

$$\begin{aligned} (1+t)^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \binom{-\frac{1}{2}}{1}t + \binom{-\frac{1}{2}}{2}t^2 + \binom{-\frac{1}{2}}{3}t^3 + \dots + \binom{-\frac{1}{2}}{n}t^n + \dots = \\ &= 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1!}t + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}t^2 + \dots + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) \dots \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!}t^n + \dots = \\ &= 1 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{2^2 2!}t^2 - \frac{15}{2^3 3!}t^3 + \dots + (-1)^n \frac{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!}t^n + \dots \end{aligned}$$

na intervalu $(-1, 1)$. Dosazením za $t = -x^2$ dostaneme požadovanou Maclaurinovu řadu

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2^2 2!}x^4 + \dots + \frac{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!}x^{2n} + \dots, \quad |x| < 1.$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 158 z 261

b) Derivace dané funkce je $(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$, což je součet geometrické řady s kvocientem $-x^2$, tj. platí

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots \quad \text{pro } |x| < 1.$$

Podle věty o integraci řady dostaneme pro $x \in (-1, 1)$

$$\arctg x = \int_0^x (1 - t^2 + t^4 - \dots) dt = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Vyšetřeme krajní body konvergenčního intervalu $x = \pm 1$. Protože řady $\sum (-1)^n \frac{1}{(2n+1)}$ a $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n+1)}$ konvergují a funkce $\arctg x$ je spojitá na \mathbb{R} , plyne z Abelovy věty (Věta 6.3), že uvedený Maclaurinův rozvoj funkce $\arctg x$ platí pro $x \in [-1, 1]$.


c) Platí $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$. Podle Příkladu 6.6 je

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1],$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-x)^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad x \in [-1, 1).$$

Proto

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots\right) - \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots\right) = \\ &= 2x + 2\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^5}{5} + \dots = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec


Strana 159 z 261

d) Použijeme Maclaurinův rozvoj funkce $e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} + \dots$ pro $t \in \mathbb{R}$. Dosazením za $t = -x^2$ dostáváme (viz Obr. 6.3)

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



Obr. 6.3: Funkce e^{-x^2} a n -tý částečný součet Maclaurinovy řady této funkce pro $n = 0, 1, 2$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 160 z 261

Příklad 6.8. Rozložte v Taylorovu řadu následující funkce:

a) $f(x) = \frac{1}{x}$ v bodě $x_0 = -2$

b) $f(x) = \sin \frac{x\pi}{4}$ v bodě $x_0 = 2$.

Řešení. a) Platí

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3}, \dots, \quad f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

Dosazením do Taylorovy řady dostaneme

$$f(x) = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}(x+2) + \frac{1}{4}(x+2)^2 + \dots + \frac{1}{2^n}(x+2)^n + \dots \right)$$

na intervalu $(-4, 0)$.


b) Postupujeme obdobně jako v předcházejícím případě: pro derivace platí

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\pi}{4} \cos \frac{x\pi}{4}, \\ f''(x) &= -\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \sin \frac{x\pi}{4}, \\ f'''(x) &= -\left(\frac{\pi}{4}\right)^3 \cos \frac{x\pi}{4}, \dots \end{aligned}$$

a po dosazení do Taylorovy řady

$$f(x) = 1 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \frac{1}{2!}(x-2)^2 + \left(\frac{\pi}{4}\right)^4 \frac{(x-2)^4}{4!} \dots + (-1)^n \left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n} \frac{(x-2)^{2n}}{(2n)!} + \dots$$

na intervalu $(-\infty, \infty)$.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 161 z 261

Příklad 6.9. Určete Maclaurinovu řadu funkce $\operatorname{tg} x$.

Řešení. Řešme nejprve obecnou úlohu: Nechť $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ a předpokládejme, že známe Maclaurinovy rozvoje funkcí $f(x)$, $g(x)$ ve tvaru

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

a necht' $b_0 \neq 0$. Rozvoj funkce $h(x)$ hledáme ve tvaru mocninné řady s neurčitými koeficienty, tj. $h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Ze vztahu $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ pak plyne $g(x) \cdot h(x) = f(x)$ a tedy

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Takto obdržíme rovnost mocninných řad a z Poznámky 6.3 plyne, že tyto řady musí mít stejné koeficienty.

Označme


$$\operatorname{tg} x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

a dosaďme do vztahu $\cos x \cdot \operatorname{tg} x = \sin x$ Maclaurinovy řady těchto funkcí.

Dostaneme

$$\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots\right) \cdot (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Po roznásobení levé strany obdržíme rovnost dvou mocninných řad, které musí mít stejné koeficienty. Porovnejme koeficienty u odpovídajících si mocnin:



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 162 z 261

$$x^0 : c_0 = 0$$

$$x^1 : c_1 = 1$$

$$x^2 : -\frac{1}{2!}c_0 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$$

$$x^3 : -\frac{1}{2!}c_1 + c_3 = -\frac{1}{3!} \Rightarrow c_3 = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} = \frac{1}{3}$$

$$x^4 : \frac{1}{4!}c_0 - \frac{1}{2!}c_2 + c_4 = 0 \Rightarrow c_4 = 0$$

$$x^5 : \frac{1}{4!}c_1 - \frac{1}{2!}c_3 + c_5 = \frac{1}{5!} \Rightarrow c_5 = \frac{1}{5!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!3} = \frac{2}{15}$$

Po dosazení koeficientů do výrazu $\operatorname{tg} x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ dostáváme hledaný rozvoj

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$


Příklad 6.10. Určete součet následujících mocninných řad:

$$\text{a) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!}$$

$$\text{b) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n.$$

Řešení. a) S využitím věty o záměně derivace a sumace mocninné řady (Důsledek 6.4) můžeme danou řadu napsat ve tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x^{2n+1})' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \right)' = \left(x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} \right)'$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 163 z 261

Platí

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = e^{x^2},$$

proto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!} = (xe^{x^2})' = e^{x^2}(1+2x^2) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

b) Podle Maclaurinova rozvoje funkce e^x je


$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n = e^{\frac{x}{2}}.$$

Nyní určíme součet řady $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n n!}$. K tomu upravíme n -tý člen řady takto:

$$\frac{nx^n}{2^n n!} = x \left(\frac{x^n}{2^n n!}\right)', \quad \frac{n^2 x^n}{2^n n!} = x \left(x \left(\frac{x^n}{2^n n!}\right)'\right)'$$

Proto

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} x \left(x \left(\frac{x^n}{2^n n!}\right)'\right)' = x \left(x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n!}\right)'\right)' \\ &= x \left(x \left(e^{\frac{x}{2}}\right)'\right)' = e^{\frac{x}{2}} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}\right). \end{aligned}$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 164 z 261

Protože obě řady $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n n!} x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n!}$ konvergují, je součet řady

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n = e^{\frac{x}{2}} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + 1 \right) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

Historická poznámka. Nejjednodušším příkladem mocninné řady je geometrická řada

$$1 + x + x^2 + x^3 \dots = \frac{1}{1 - x}.$$

Historicky první mocninnou řadu, která není geometrická, objevili indiští matematici již v 15. století, a to řadu


$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

s jejím důležitým speciálním případem

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$$

Bohužel, tento objev nebyl dlouho znám, a tím neovlivnil rozvoj teorie mocninných řad. Teorie mocninných řad byla započata v době, kdy N. Mercator publikoval (1668) řadu

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 165 z 261

Racionální funkce, např. $1/(1+x^2)$, lze rozvést pomocí geometrické řady; rozhodující objev učinil I. Newton (1665), když objevil obecnou binomickou řadu. Poté Newton odvodil řadu

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \dots,$$

odkud pomocí inverze odvodil mocninnou řadu pro $\sin x$. Podrobnosti z historie nekonečných řad lze nalézt např. v [4, 18].

Cvičení

6.1. Určete poloměr a obor konvergence následujících řad:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^{2n}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$


h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2\sqrt{n}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n3^{n-1}}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{(2n)!} x^{2n}$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n^2} x^n \quad \text{pro } 0 < \alpha < 1$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 166 z 261

$$\text{k) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a^{n^2}} x^n \quad \text{pro } a > 1$$

6.2. Určete součet mocninných řad a poloměr konvergence:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$$

$$\text{f) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

$$\text{g) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n-1}$$

$$\text{c) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

$$\text{h) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$$

$$\text{d) } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1)x^{2n}$$

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$\text{e) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

$$\text{j) } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$$


6.3. Určete součet číselných řad pomocí součtu mocninné řady:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$$

$$\text{c) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n+1) \left(\frac{1}{5}\right)^{2n}$$

$$\text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

$$\text{d) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{8^n}$$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 167 z 261

6.4. Rozviňte následující funkce v Maclaurinovu řadu:

a) e^{-x}

h) $\sqrt{1+x}$

b) $\cos x$

i) $\ln(1+e^x)$

c) $\cos x^2$

j) $e^{\cos x}$

d) $\sin x^2$

k) $\cos^n x$

e) $\arcsin x$

l) $x^2 e^x$

f) $\frac{1}{(1+x)^2}$

m) $e^x \sin x$

g) $\frac{1}{3-2x}$

n) $-\ln \cos x$


6.5. Rozložte v Taylorovu řadu následující funkce:

a) $\sqrt{x^3}$ v bodě $x_0 = 1$

c) e^x v bodě $x_0 = -2$

b) $\frac{1}{x}$ v bodě $x_0 = 3$

d) $\ln x$ v bodě $x_0 = 1$



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 168 z 261



Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutno je zavrhnout.



Mocninné řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 169 z 261



Kapitola 7

Užití mocninných řad

V této kapitole ukážeme některá použití mocninných řad. Kromě přibližných výpočtů funkčních hodnot elementárních funkcí se mocninné řady používají při výpočtu limit a integrálů a při řešení diferenciálních rovnic.

7.1. Přibližný výpočet funkčních hodnot

Při určování funkčních hodnot je většinou požadována velikost chyby, s jakou má být tato hodnota přibližně určena; pro její odhad použijeme Větu 4.4 a 4.5.

Poznamenejme, že v příkladech, ve kterých přibližnou hodnotu funkce $f(x)$ budeme určovat pomocí prvních n členů příslušného rozvoje dané funkce, budeme mít na mysli prvních n nenulových členů tohoto rozvoje.

Užití mocninných řad

[Rejstřík](#)[Obsah](#)[Verze k tisku](#)[Zpět](#)[Videa](#)[Dif. počet](#)[Zavřít](#)[Konec](#)

Strana 170 z 261

Příklad 7.1. Pomocí prvních n členů určete přibližnou hodnotu výrazů:

a) \sqrt{e} ($n=5$) b) $(1, 1)^{1.2}$ ($n=3$) c) $\sqrt[5]{245}$ ($n=2$).

Řešení. a) Použijeme Maclaurinovu řadu funkce e^x (viz Příklad 6.6), kam dosadíme za $x = \frac{1}{2}$ a $n = 5$, a obdržíme

$$\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} \doteq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \doteq 1, 65.$$

b) Použijeme Maclaurinovu řadu mocninné funkce $(1+x)^a$ (viz Příklad 6.6), kam dosadíme $x = 0, 1$, $a = 1, 2$, $n = 3$, a dostaneme


$$(1, 1)^{1.2} \doteq 1 + 1, 2 \cdot 0, 1 + \frac{1, 2 \cdot 0, 2}{2} (0, 1)^2 \doteq 1, 12.$$

c) Protože Maclaurinova řada mocninné funkce $(1+x)^a$ konverguje pouze na intervalu $(-1, 1)$, je třeba nejprve danou odmocninu upravit:

$$\sqrt[5]{245} = \sqrt[5]{243 + 2} = \sqrt[5]{3^5 + 2} = \sqrt[5]{3^5 \left(1 + \frac{2}{3^5}\right)} = 3 \left(1 + \frac{2}{243}\right)^{\frac{1}{5}}.$$

Nyní můžeme použít rozvoj mocninné funkce a po dosazení za $a = \frac{1}{5}$, $x = \frac{2}{243}$ a $n = 2$ dostáváme

$$\sqrt[5]{245} = 3 \left(1 + \frac{2}{243}\right)^{\frac{1}{5}} \doteq 3 \left(1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{243}\right) \doteq 3,005.$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 171 z 261

Poznámka 7.1. Výpočet odmocnin pomocí prvních dvou členů binomické řady není nic jiného než výpočet pomocí diferenciálu funkce $(1+x)^a$ a byl již používán ve staroindické matematice.



Příklad 7.2. Určete přibližnou funkční hodnotu:

- a) $\sin 18^\circ$ s chybou menší než 10^{-4} b) $\arcsin 0,45$ s chybou menší než 10^{-3} .

Řešení. a) Použijeme Maclaurinovu řadu funkce $\sin x$ (viz Příklad 6.6) a po dosažení $x = \frac{\pi}{10}$ dostaneme

$$\sin \frac{\pi}{10} = \frac{\pi}{10} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{10}\right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{10}\right)^5 + \dots, \quad (7.1)$$

což je alternující číselná řada. Podle Věty 4.4 je $|R_n| \leq a_{n+1}$. Proto vezmeme-li v rozvoji (7.1) první dva nenulové členy, bude chyba menší než třetí (nenulový) člen rozvoje, tj.

$$|R_2| < \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{10}\right)^5 = \frac{\pi^5}{120 \cdot 10^5} < 10^{-4}.$$

Hledaná hodnota je

$$\sin 18^\circ \doteq \frac{\pi}{10} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{10}\right)^3 \doteq 0,309.$$

b) Odvoďme nejprve Maclaurinovu řadu funkce $\arcsin x$. Její derivace je funkce $(\arcsin x)' = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$, jejíž rozvoj jsme určili v Příkladu 6.7-a). Proto

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2^2 2!}x^4 + \dots + \frac{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!}x^{2n} + \dots$$

Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 172 z 261

pro $|x| < 1$. Odtud integrací dostaneme

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 + \frac{3}{2^2 2! 5} x^5 + \cdots + x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

pro $|x| < 1$, kde $(2n-1)!! = (2n-1)(2n-3) \cdots 3 \cdot 1$. Lze ověřit podle Raabeova kritéria (Věta 2.5), že v krajních bodech $x = \pm 1$ řada na pravé straně této rovnosti konverguje. Protože funkce $\arcsin x$ je spojitá na $[-1, 1]$, platí podle Abelovy věty (Věta 6.3) uvedený rozvoj i pro $x = \pm 1$. Proto platí

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{pro } x \in [-1, 1].$$

Pro odhad zbytku této řady použijeme Větu 4.5, podle které platí


$$|R_n| \leq |a_n| \frac{q}{1-q}, \quad \text{kde } \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1.$$

Určeme nejprve obecně q_x v závislosti na hodnotě x . Platí

$$\begin{aligned} q_x &= \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)!!}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \cdot \frac{2^n \cdot n!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{2n+1}{x^{2n+1}} = \\ &= x^2 \frac{(2n+1)^2}{2(n+1)(2n+3)} \leq x^2 \quad \text{pro všechna } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Proto pro $x = 0,45$ dostáváme $q = (0,45)^2 = 0,2025$ a odhad chyby je

$$|R_n| \leq |a_n| \frac{0,2025}{1-0,2025} < 10^{-3}.$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 173 z 261

Snadno se ověří, že tato nerovnost je splněna pro $n = 2$, tj.

$$\arcsin 0,45 \doteq 0,45 + \frac{1}{6}(0,45)^3 + \frac{3}{40}(0,45)^5 \doteq 0,466.$$

Příklad 7.3. Určete přibližnou hodnotu čísla π pomocí tří nenulových členů rozvoje funkce:

- a) $\operatorname{arctg} x$ b) $\arcsin x$.

Řešení. a) V Příkladu 6.7-b) jsme odvodili Maclaurinův rozvoj funkce $\operatorname{arctg} x$:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad \text{pro } x \in [-1, 1].$$


Jedna možnost výpočtu čísla π je dosadit vnitřní bod konvergenčního intervalu, v němž jeho hodnotu známe

$$\frac{\pi}{6} = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^5 + \dots,$$

odkud $\pi \doteq 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^5 \right) \doteq 3,156$. Dosadíme-li pravý krajní bod $x = 1$, dostaneme

$$\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots,$$

odkud plyne $\pi \doteq 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) \doteq 3,4\bar{6}$.



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 174 z 261

Jiná možnost výpočtu je využít součtového vzorce pro $\operatorname{arctg} x$ (viz řešení Příkladu 1.2-d)), podle kterého je

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \operatorname{arctg} \frac{1}{3} = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Z rozvoje $\operatorname{arctg} x$ určíme přibližnou hodnotu

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{2} \doteq \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^5, \quad \operatorname{arctg} \frac{1}{3} \doteq \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^5,$$


odkud dostaneme $\pi = 4 \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \operatorname{arctg} \frac{1}{3} \right) \doteq 1,858 + 1,287 \doteq 3,145$.

b) Postupujeme obdobně: dosadíme známé hodnoty do Maclaurinova rozvoje funkce $\arcsin x$ odvozeného v Příkladu 7.2-b), např. $x = 1$ nebo $x = \frac{1}{2}$ a dostaneme

$$\pi = 2 \arcsin 1 \doteq 2 \left(1 + \frac{1}{6} + \frac{3}{40} \right) \doteq 2,48\bar{3},$$

$$\pi = 6 \arcsin \frac{1}{2} \doteq 6 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \frac{3}{40} \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right) \doteq 3,139.$$

Porovnáním s hodnotou na kalkulátoru $\pi \doteq 3,1415927 \dots$ vidíme, že výpočet pomocí obou cyklometrických funkcí $\operatorname{arctg} x$, $\arcsin x$ je zhruba stejně přesný. Největší přesnosti v obou případech budeme dosahovat tehdy, jestliže bude hodnota argumentu blízko nuly. Pokud je hodnota argumentu na okraji konvergenčního intervalu $[-1, 1]$, je určená hodnota π velice nepřesná.



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 175 z 261

7.2. Určování funkčních hodnot logaritmů

K výpočtu logaritmů je někdy výhodné použít rozvoj funkce $\ln \frac{1+x}{1-x}$, který jsme odvodili v Příkladu 6.7-c)

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right), \quad |x| < 1. \quad (7.2)$$

Srovnáme-li tento rozvoj s rozvojem funkce $\ln(1+x)$, liší se oba rozvoje nejen rychlostí konvergence, ale i oborem hodnot vnitřních složek obou logaritmických funkcí. Označme

$$g_1(x) = 1+x, \quad g_2(x) = \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$


Oborem hodnot funkce $g_1(x)$ je interval $(0, 2)$, zatímco oborem hodnot druhé funkce interval $(0, \infty)$. Např. $\ln 3, \ln 5$ nelze vypočítat pomocí rozvoje funkce $\ln(1+x)$. Rozdíl v rychlosti konvergence, tj. v počtu členů rozvoje při dané chybě, bude dobře vidět v následujících příkladech.

Příklad 7.4. Kolik členů rozvoje následujících funkcí je třeba vzít, abychom určili číslo $\ln 2$ s chybou menší než 10^{-5} :

$$a) \ln(1+x) \quad b) \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

Řešení. a) Podle Příkladu 6.4 je

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 176 z 261

a podle Věty 4.4 je chyba $|R_n| < \frac{1}{n+1}$. Máme-li proto určit číslo $\ln 2$ s chybou menší než 10^{-5} , musí být $|R_n| < \frac{1}{n+1} < 10^{-5}$, tj. je třeba sečíst 100 000 členů této řady.

b) Nejprve určíme hodnotu x , pro kterou je $\frac{1+x}{1-x} = 2$. Přímým výpočtem dostaneme $x = \frac{1}{3}$ a po dosazení do (7.2) dostaneme

$$\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^5 + \dots \right).$$

Pro odhad chyby R_n v řadě na pravé straně rovnosti použijeme Větu 4.5, podle níž

$$|R_n| \leq |a_n| \frac{q}{1-q} < 10^{-5}, \quad \text{kde} \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1.$$

Určeme q_x v závislosti na hodnotě x :


$$q_x = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2x^{2n+3}}{2n+3} \cdot \frac{2n+1}{2x^{2n+1}} = x^2 \frac{2n+1}{2n+3} \leq x^2 \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}.$$

Pro $x = \frac{1}{3}$ dostáváme $q = \left(\frac{1}{3}\right)^2$. Numerickým výpočtem ověříme, že pro $n = 4$ je splněno

$$|R_5| \leq \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3} \right)^9 \frac{1}{9} \frac{9}{8} \doteq 1,41 \cdot 10^{-6} < 10^{-5}.$$

Proto v tomto případě stačí vzít k výpočtu $\ln 2$ prvních pět nenulových členů, tj.

$$\ln 2 \doteq 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^5 + \frac{1}{7} \left(\frac{1}{3} \right)^7 + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3} \right)^9 \right) \doteq 0,6931.$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 177 z 261

Z uvedeného příkladu je vidět, že v případě, kdy se hodnota x v rozvoji funkce $\ln(1+x)$ blíží k hranici konvergenčního intervalu $(-1, 1]$, je mnohem výhodnější použít rozvoje funkce $\ln \frac{1+x}{1-x}$, u kterého dostaneme stejně přesný výsledek při součtu mnohem méně členů. Tento rozvoj je třeba použít také tehdy, kdy hodnota x přesáhne konvergenční interval, např. $x = 4$.



7.3. Výpočet limit

Při určování limit jsme zatím používali elementární způsoby výpočtu (úprava limitní funkce) nebo l'Hospitalovo pravidlo. K výpočtu některých limit lze někdy velmi výhodně použít mocninných řad.

Příklad 7.5. Určete následující limity:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\operatorname{tg} x - \sin x) - x^3}{x^5}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec


Strana 178 z 261

Řešení. a) K vyjádření odmocnin použijeme binomický rozvoj funkcí $\sqrt{1+x}$ a $\sqrt[3]{1-x}$. Dostaneme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots \right) - \left(1 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \dots \right) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{5}{6}x - \frac{1}{72}x^2 + \dots \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{72}x + \dots \right) = \frac{5}{6}.\end{aligned}$$

b) Použijeme Maclaurinův rozvoj $\ln(1+x)$ a dostaneme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{4x^4} + \dots \right) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3x} + \frac{1}{4x^2} + \dots \right) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 179 z 261

c) Použijeme Maclaurinovy rozvoje funkcí $\operatorname{tg} x$, $\sin x$ (viz Příklad 6.9 a 6.6) a dostaneme


$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\operatorname{tg} x - \sin x) - x^3}{x^5} &= \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left[\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{272}{7!}x^7 + \dots \right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots \right) \right] - x^3}{x^5} &= \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} \left(\frac{1}{4}x^5 + \frac{542}{7!}x^7 + \dots \right) &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

d) Nejprve určíme Maclaurinův rozvoj funkce $e^x \sin x$. Protože Maclaurinovy řady obou funkcí e^x , $\sin x$ jsou absolutně konvergentní pro všechna $x \in \mathbb{R}$, platí podle Věty 4.1

$$\begin{aligned} e^x \sin x &= \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots \right) \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) = \\ &= \left(x + x^2 + \frac{1}{2!}x^3 - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right). \end{aligned}$$

Odtud dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots) - x(1+x)}{x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{30}x^2 + \dots \right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 180 z 261

7.4. Přibližný výpočet integrálů

Dosud umíme integrovat funkce, jejichž primitivní funkce jsou tzv. elementární funkce neboli konečného tvaru, tj. lze je vyjádřit pomocí základních elementárních funkcí (např. racionální, exponenciální, goniometrické nebo cyklometrické), pomocí algebraických operací a skládání v konečném počtu.

V tomto odstavci ukážeme, jak lze integrovat některé funkce, jejichž primitivní funkce nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí; takové funkce se nazývají vyšší *transcendentní funkce* a lze je vyjádřit právě mocninnými řadami.

Uveďme příklad: chceme určit primitivní funkci k funkci $\frac{\sin x}{x}$ a e^{-x^2} . Obě funkce

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{pro } x \neq 0, \\ 1 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$


jsou spojité na \mathbb{R} , tudíž k nim existují funkce primitivní. Avšak tyto primitivní funkce nelze nalézt žádnou známou integrační metodou, neboť jde o vyšší transcendentní funkce. Uvedené funkce f , g lze vyjádřit mocninnou řadou a její integraci pak určit jejich primitivní funkce ve tvaru mocninných řad.

Příklad 7.6. a) Pomocí prvních tří nenulových členů přibližně vypočtete $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ a odhadněte chybu.

b) S chybou menší než 10^{-4} přibližně vypočtete $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{1+x^4}$.

c) Pomocí prvních čtyř členů přibližně vyjádřete $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctg x}{x} dx$ a odhadněte chybu.

d) Vyjádřete mocninnou řadou funkci $\int_0^x \frac{\sqrt[4]{1+t^4}-1}{t^2} dt$.



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 181 z 261

Řešení. a) Maclaurinův rozvoj funkce e^{-x^2} jsme určili v Příkladu 6.7-d)

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Odtud integrací, přičemž řadu na pravé straně integrujeme člen po členu, dostaneme

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot n!} + \dots,$$

kde $x \in \mathbb{R}$. Určitý integrál lze pak vyjádřit řadou

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \cdot 2!} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1) \cdot n!} + \dots,$$


což je alternující číselná řada s klesajícími členy. Pro ni platí, že velikost chyby při součtu prvních tří členů je menší než absolutní hodnota čtvrtého členu (viz Věta 4.4), tj.

$$|R_3| < \frac{1}{7 \cdot 3!} = \frac{1}{42} < 0,024.$$

Přibližná hodnota integrálu $\int_0^1 e^{-x^2} dx \doteq 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} \doteq 0,77$ je určena s chybou menší než 0,03.

b) Integrovanou funkci $\frac{1}{1+x^4}$ vyjádříme mocninnou řadou

$$\frac{1}{1+x^4} = 1 - x^4 + x^8 + \dots + (-1)^n \cdot x^{4n} + \dots, \quad |x| < 1,$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 182 z 261

odkud integrací plyne


$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{1+x^4} &= \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - x^4 + x^8 - x^{12} + \dots) dx = \\ &= \left[x - \frac{x^5}{5} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{13}}{13} + \dots + (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{4n+1} + \dots \right]_0^{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 - \frac{1}{13} \left(\frac{1}{2}\right)^{13} + \dots.\end{aligned}$$

Jedná se o alternující číselnou řadu a podle zadání má být chyba menší než 10^{-4} . Pro $n = 3$ platí $|R_3| < \frac{1}{13} \left(\frac{1}{2}\right)^{13} \doteq 9,39 \cdot 10^{-6} < 10^{-4}$, proto stačí sečíst první tři členy. Hledaná hodnota je

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{1+x^4} \doteq \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \doteq 0,4940.$$

c) Nejprve poznamenejme, že integrovaná funkce $\frac{\operatorname{arctg} x}{x}$ je spojitá na $(0, \frac{1}{2})$ a ohraničená na $[0, \frac{1}{2}]$, neboť $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$. Proto je určovaný integrál vlastní Riemannův integrál. Užítím rozvoje funkce $\operatorname{arctg} x$, který jsme odvodili v Příkladu 6.7, je

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} + \dots, |x| < 1.$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 183 z 261

Dosažením do integrálu dostáváme

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} dx = \left[x - \frac{x^3}{3^2} + \frac{x^5}{5^2} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)^2} + \dots \right]_0^{\frac{1}{2}} \doteq \\ \doteq \frac{1}{2} - \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{25} \left(\frac{1}{2}\right)^5 - \frac{1}{49} \left(\frac{1}{2}\right)^7 \doteq 0,4872.$$


Jedná se o alternující číselnou řadu, a proto pro odhad chyby platí $|R_4| < a_5 = \frac{1}{81} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \doteq 2,4 \cdot 10^{-5} < 10^{-4}$. Hledaná hodnota integrálu je určena s chybou menší než 10^{-4} .

d) Užitím binomického rozvoje funkce $(1+t)^a$, kde $a = \frac{1}{4}$, $t = x^4$ dostaneme pro všechna $x \neq 0$, $x \in (-1, 1)$

$$\frac{\sqrt[4]{1+x^4} - 1}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left[\left(1 + \left(\frac{1}{4}\right)x^4 + \left(\frac{1}{2}\right)x^8 + \left(\frac{1}{3}\right)x^{12} + \dots\right) - 1 \right] = \\ = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{32}x^8 + \frac{21}{384}x^{12} - \dots \right) = \\ = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{32}x^6 + \frac{21}{384}x^{10} - \dots$$

Odtud plyne $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1+x^4} - 1}{x^2} = 0$, a proto lze integrovanou funkci spojitě dodefinovat na celé \mathbb{R}

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[4]{1+x^4} - 1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 184 z 261

K této funkci existuje primitivní funkce, kterou lze pro $x \in (-1, 1)$ vyjádřit Maclaurinovou řadou tvaru

$$\int_0^x \frac{\sqrt[4]{1+t^4} - 1}{t^2} dt = \frac{x^3}{4 \cdot 3} - \frac{3x^7}{32 \cdot 7} + \frac{21x^{11}}{384 \cdot 11} - \dots$$



7.5. Řešení diferenciálních rovnic pomocí mocninných řad

V tomto odstavci ukážeme, jak lze řešit diferenciální rovnice pomocí mocninných řad. Tato metoda spočívá v tom, že řešení definované v okolí bodu $x = x_0$ hledáme

ve tvaru mocninné řady $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$. Otázkami konvergence mocninných

řad, které jsou řešeními diferenciálních rovnic, se zabývat nebudeme. Rovněž zde nebudeme řešit obecnější úlohu, kdy rovnice má v bodě $x = x_0$ singulární bod

a řešení je třeba hledat ve tvaru *zobecněné mocninné řady* $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^{k+n}$,

$k \in \mathbb{R}$ (např. Besselova rovnice a její řešení Besselovy funkce). Podrobnosti lze nalézt např. v [9].

Příklad 7.7. Řešte diferenciální rovnice pomocí mocninné řady:

$$\text{a) } y'' + y = 0 \quad \text{b) } y'' + kxy = 0.$$

Řešení. Obecné řešení obou rovnic hledáme ve tvaru $y = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots$. Pak pro derivace této funkce platí

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2} + \dots$$

Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 185 z 261

a) Dosazením za y, y'' do diferenciální rovnice dostáváme

$$2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2} + \dots + a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + \dots = 0,$$

tj. sečtením koeficientů u stejných členů

$$(2a_2 + a_0) + (3 \cdot 2a_3 + a_1)x + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-2})x^{n-2} + \dots = 0.$$

Odtud plyne $n(n-1)a_n + a_{n-2} = 0$, tj. $a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n-1)}$, kde a_{n-2} je rekurentně určeno z předchozích kroků. Z uvedených vztahů je vidět, že přesné určení koeficientů a_n závisí na volbě a_0, a_1 . Uvažujme dva případy:

1. Je-li $a_0 = 0$, pak $a_{2n} = 0$, tj. v řadě se vyskytují pouze liché členy. Pro $a_1 \in \mathbb{R}$ libovolné dostaneme

$$a_{2n+1} = -\frac{a_{2n-1}}{2n(2n+1)} = \dots = (-1)^n \frac{a_1}{(2n+1)!}$$

a řešení rovnice je


$$y = a_1 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right) = a_1 \sin x.$$

2. Je-li $a_1 = 0$, pak $a_{2n+1} = 0$, tj. v řadě se vyskytují pouze sudé členy. Pro $a_0 \in \mathbb{R}$ libovolné je

$$a_{2n} = -\frac{a_{2n-2}}{2n(2n-1)} = \dots = (-1)^n \frac{a_0}{(2n)!},$$

tj.

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \right) = a_0 \cos x.$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 186 z 261

Poznamenejme, že je-li $a_0 = a_1 = 0$, tj. $a_n = 0$ pro všechna n , pak řešení $y \equiv 0$, což je obsaženo v předchozích případech. Dohromady je obecné řešení $y = a_0 \cos x + a_1 \sin x$, $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$.

b) Postupujeme obdobně. Po dosazení do rovnice za y, y'' dostáváme

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + kx \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0,$$

po úpravě

$$2a_2 + \dots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \dots + k(a_0 x + a_1 x^2 + \dots + a_{n-3} x^{n-2} + \dots) = 0.$$

Odtud $a_2 = 0$ a porovnáním koeficientů u mocniny x^{n-2} můžeme určit rekurentní vztah pro a_n :

$$n(n-1)a_n + k a_{n-3} = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{k}{n(n-1)} a_{n-3} \quad \text{pro } n = 3, 4, \dots$$

Proto $a_2 = a_5 = \dots = 0$ a a_0, a_1 volíme libovolně. Dostaneme tyto případy:

Je-li $a_0 \in \mathbb{R}$ libovolné, pak $a_3 = -\frac{k}{6} a_0$, $a_6 = -\frac{k}{5 \cdot 6} a_3 = \frac{k}{180} a_0$ atd.

Je-li $a_1 \in \mathbb{R}$ libovolné, pak $a_4 = -\frac{k}{12} a_1$, $a_7 = -\frac{k}{7 \cdot 6} a_4 = \frac{k}{12 \cdot 42} a_1$ atd.


Dohromady obecné řešení lze vyjádřit ve tvaru

$$y = a_0 \left(1 - \frac{k}{6} x^3 + \frac{k}{180} x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{k}{12} x^4 + \frac{k}{12 \cdot 42} x^7 + \dots \right).$$

Příklad 7.8. Určete řešení rovnic při počátečních podmínkách:

a) $y' = 1 + x - y^2$, $y(0) = 1$;

b) $xy^{(4)} + 4y''' - xy - 1 = 0$, $y(1) = -1, y'(1) = 1, y''(1) = -2, y'''(1) = 6$.



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 187 z 261

Řešení. Nejprve poznamenejme, že podle věty o existenci a jednoznačnosti Cauchyovy počáteční úlohy platí, že hledaná řešení obou úloh existují a jsou jednoznačně určena.

a) Partikulární řešení hledáme ve tvaru Maclaurinovy řady, kde hodnoty $y^{(n)}(0)$ určíme takto:

Dosadíme-li počáteční podmínku do rovnice, dostaneme $y'(0) = 0$. Postupně pro derivace vyšších řádů platí

$$\begin{aligned}y'' &= 1 - 2yy', & y''(0) &= 1, \\y''' &= -2y'y' - 2yy'', & y'''(0) &= -2, \\y^{(4)} &= -6y'y'' - 2yy''', & y^{(4)}(0) &= 4.\end{aligned}$$

Partikulární řešení splňující předepsanou počáteční podmínku je

$$y = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + \dots$$


b) Řešení nyní hledáme ve tvaru Taylorovy řady se středem v bodě $x = 1$

$$y = y(1) + \frac{y'(1)}{1!}(x - 1) + \frac{y''(1)}{2!}(x - 1)^2 + \frac{y'''(1)}{3!}(x - 1)^3 + \dots$$

Při dosazování do Taylorovy řady je třeba určit $y^{(4)}(1)$ a případně vyšší derivace. Pro určení $y^{(4)}(1)$ vyjádříme $y^{(4)}$ a dosadíme počáteční podmínky, tj.

$$y^{(4)} = \frac{-4y'' + xy + 1}{x}, \quad y^{(4)}(1) = -24.$$

Hledané partikulární řešení je tvaru $y = -1 + (x - 1) - (x - 1)^2 + (x - 1)^3 + \dots$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 188 z 261

Cvičení



7.1. Určete přibližnou hodnotu výrazu s chybou menší než je uvedeno:

a) $\cos 1^\circ$ $[10^{-6}]$ c) $\sin 10^\circ$ $[10^{-6}]$ e) $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3}$ $[10^{-5}]$

b) $\sin 1^\circ$ $[10^{-8}]$ d) $\cos 10^\circ$ $[10^{-5}]$

7.2. Určete přibližnou hodnotu výrazu pomocí prvních n členů:

a) $\operatorname{tg} 5^\circ$ $[n = 2]$ c) $\operatorname{cotg} 36^\circ$ $[n = 3]$

b) $\operatorname{tg} 1^\circ$ $[n = 2]$ d) $\operatorname{cotg} 20^\circ$ $[n = 3]$

7.3. Určete přibližnou hodnotu π s chybou menší než:

a) 10^{-5} ze vztahu $\frac{\pi}{6} = \arcsin \frac{1}{2}$

b) 10^{-10} ze vztahu $\frac{\pi}{4} = 4 \operatorname{arctg} \frac{1}{5} - \operatorname{arctg} \frac{1}{239}$

7.4. Určete přibližnou hodnotu výrazu pomocí prvních n členů:

a) $\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$ $[n = 4]$ d) e^2 $[n = 10]$ g) $(1, 5)^2$ $[n = 3]$

b) $\sqrt[3]{e}$ $[n = 3]$ e) $\frac{1}{e}$ $[n = 8]$ h) $\sqrt[7]{129}$ $[n = 2]$

c) e $[n = 9]$ f) $(1, 2)^{0,8}$ $[n = 4]$ i) $\sqrt[3]{70}$ $[n = 2]$

Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 189 z 261

j) $\sqrt[5]{40}$ [n = 3] 1) $\sqrt[5]{250}$ [n = 2]

k) $\sqrt[3]{1,015}$ [n = 3] m) $\sqrt[3]{128}$ [n = 3]

7.5. Určete přibližnou hodnotu výrazu pomocí prvních n členů:

a) $\ln 2$ [n = 3] e) $\log 5$ [n = 10] i) $\ln \frac{1}{2}$ [n = 3]

b) $\ln 3$ [n = 6] f) $\log 11$ [n = 10] j) $\ln \frac{5}{6}$ [n = 5]

c) $\ln 5$ [n = 9] g) $\log_5 2$ [n = 3] k) $\log \frac{1}{e}$ [n = 10]

d) $\ln 11$ [n = 10] h) $\log_2 3$ [n = 3]

7.6. Určete následující limity:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^5} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt[3]{1+x^2}}{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cotg x \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^3} - \sqrt[3]{1-x^4}}{x^3}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cotg^2 x \right)$


d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1-x^2} - \sqrt[3]{1+x^2}}{x^2}$

j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)$

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x \cos x}{x^3}$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 190 z 261

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + \cos x}{x^3 \sin x} - \frac{3}{x^4} \right)$$

7.7. Vyjádřete mocninnou řadou:

$$a) \int_0^x \frac{e^t}{t^2} dt$$

$$b) \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$$

$$c) \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$$

$$d) \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

$$e) \int_0^x \frac{dt}{1-t^9}$$

$$f) \int_0^x \sin t^2 dt$$

7.8. Určete přibližnou hodnotu výrazu pomocí prvních n členů nebo se zadanou přesností:

$$a) \int_{0,1}^1 \frac{e^x}{x} dx \quad [n = 6]$$


$$b) \int_0^1 \frac{\sinh x}{x} dx \quad [n = 5]$$

$$c) \int_2^4 e^{\frac{1}{x}} dx \quad [n = 4]$$

$$d) \int_1^{1,5} \frac{1}{x} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{4} dx \quad [\text{na setiny}]$$

$$e) \int_0^{0,5} \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}} \quad [\text{na tisíciny}]$$

$$f) \int_0^1 \cos x^2 dx \quad [\text{na tisíciny}]$$



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 191 z 261

7.9. Určete partikulární řešení diferenciálních rovnic:

a) $y' - y^2 - x(x+1) = 0, y(0) = 1$

b) $y' + xy^2 - 2 \cos x = 0, y(0) = 1$


c) $y'' - e^x y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 1$

d) $y'' - y \cos x - x = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$


7.10. Vyjádřete řadou obecné řešení diferenciálních rovnic:

a) $y'' + xy' + y = 0$

b) $y'' + ax^2 y = 0, \text{ kde } a \in \mathbb{R}.$



Hezké chvíle utečou jako nic. Ošklivé trvají věčně.



Užití mocninných řad

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 192 z 261



Kapitola 8

Fourierovy řady

Předmětem této kapitoly je vybudování teorie pro aproximaci periodických funkcí. Nejjednodušším netriviálním příkladem periodických funkcí jsou trigonometrické funkce $\cos nx$, $\sin nx$ ($n \in \mathbb{N}$). Nabízí se proto myšlenka obecnou 2π -periodickou funkci aproximovat buď lineární kombinací konečného počtu těchto funkcí

$$T_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad a_0, a_k, b_k \in \mathbb{R}, \quad (8.1)$$

nebo nekonečnou řadou

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (8.2)$$

Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 193 z 261


Funkce tvaru (8.1) se nazývá *trigonometrický polynom* (název polynom je odůvodněn tím, že užitím elementárních vztahů z trigonometrie lze $T_n(x)$ vyjádřit jako polynom v proměnných $\cos x$, $\sin x$), řada tvaru (8.2) se nazývá *trigonometrickou řadou*.

Ukazuje se, že při úvahách o aproximaci trigonometrickými řadami je podstatnou vlastností *ortogonalita* systému funkcí $\{\cos nx, \sin nx; n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$. Kromě systému $\{\cos nx, \sin nx\}$ existují další systémy funkcí $\{\varphi_n(x)\}$, které splňují obdobné vlastnosti, např. ortogonální polynomy a Besselovy funkce. Všechny tyto systémy mají velké aplikace při řešení parciálních diferenciálních rovnic, podrobnosti lze nalézt např. v [12, 17].

Tato kapitola je rozdělena na tři odstavce: v prvním vybudujeme obecnou teorii Fourierových řad vzhledem k libovolnému ortogonálnímu systému funkcí $\{\varphi_n(x)\}$. V druhém odstavci budeme obecné výsledky o Fourierových řadách aplikovat na trigonometrické funkce $\{\cos nx, \sin nx\}$ a v třetím odstavci uvedeme podmínky pro konvergenci těchto Fourierových řad.

8.1. Fourierovy řady vzhledem k systému $\{\varphi_n(x)\}$

Jak jsme naznačili v úvodu, při budování teorie Fourierových řad hraje podstatnou vlastnost ortogonalita (kolmost) systému funkcí $\{\varphi_n(x)\}$. Zavedme následující definice:



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 194 z 261

Definice 8.1. Buďte f, g integrovatelné funkce na intervalu $[a, b]$. Číslo

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

nazýváme *skalárním součinem* funkcí f, g . Funkce f, g se nazývají *ortogonální* (na intervalu $[a, b]$), právě když $(f, g) = 0$.


Snadno ověříme tyto vlastnosti skalárního součinu:

- (1) $(f, g) = (g, f)$
- (2) $(f + g, h) = (f, h) + (g, h)$
- (3) $(cf, g) = c(f, g)$ pro $c \in \mathbb{R}$
- (4) $(f, f) \geq 0$.

Z (2) a (3) plyne indukcí obecněji:

$$(c_1 f_1 + \dots + c_n f_n, g) = c_1 (f_1, g) + \dots + c_n (f_n, g)$$

Definice 8.2. Buď f integrovatelná funkce na intervalu $[a, b]$. *Normou funkce* f rozumíme číslo $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$. Funkce f se nazývá *normovaná*, právě když $\|f\| = 1$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 195 z 261

Je tedy $\|f\|^2 = \int_a^b f^2(x) dx$. Všimněme si ještě, že je-li f funkce s vlastností $\|f\| > 0$, pak funkce $\frac{1}{\|f\|} \cdot f$ je normovaná.

Definice 8.3. Bud' $\{\varphi_n\}$ konečná nebo spočetná posloupnost integrovatelných funkcí na intervalu $[a, b]$. Tato posloupnost se nazývá *ortogonální*, právě když každé dvě funkce φ_m, φ_n ($m \neq n$) jsou ortogonální a každá funkce φ_n má kladnou normu.

Posloupnost $\{\varphi_n\}$ se nazývá se *ortonormální*, právě když je ortogonální a každá funkce φ_n je normovaná.

Posloupnost $\{\varphi_n\}$ je tedy ortonormální, právě když platí:

$$(\varphi_m, \varphi_n) = \begin{cases} 0 & \text{pro } m \neq n \\ 1 & \text{pro } m = n \end{cases}$$


Poznamenejme ještě, že je-li $\{\varphi_n\}$ ortogonální posloupnost, pak $\left\{ \frac{1}{\|\varphi_n\|} \cdot \varphi_n \right\}$ je posloupnost ortonormální.

Věta 8.1. Bud' $\{\varphi_n\}$ ortogonální posloupnost funkcí na intervalu $[a, b]$, $\{c_n\}$ posloupnost reálných čísel. Necht' řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$$

stejněměrně konverguje k funkci f na intervalu $[a, b]$. Pak pro konstanty c_n ($n \in \mathbf{N}$) platí:

$$c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)} = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2} \quad (8.3)$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 196 z 261

Důkaz. Násobme rovnost

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$$


funkcí $\varphi_k(x)$, kde $k \in \mathbb{N}$ je libovolné:

$$f(x)\varphi_k(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)\varphi_k(x);$$

řada na pravé straně rovnice je opět stejnoměrně konvergentní, proto ji lze integrovat člen po členu

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\varphi_k(x) dx &= \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)\varphi_k(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b \varphi_n(x)\varphi_k(x) dx = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n (\varphi_n, \varphi_k). \end{aligned}$$

Protože $(\varphi_n, \varphi_k) = 0$ pro $n \neq k$, plyne odtud $(f, \varphi_k) = c_k \|\varphi_k\|^2$, tj. (8.3). □



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 197 z 261

Definice 8.4. Bud' $\{\varphi_n\}$ ortogonální posloupnost funkcí na intervalu $[a, b]$, f integrovatelná funkce na $[a, b]$. Pak čísla c_n vyjádřená vzorcem (8.3) nazýváme *Fourierovy koeficienty funkce f vzhledem k ortogonální posloupnosti $\{\varphi_n\}$ a řadu*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n,$$

kde c_n jsou Fourierovy koeficienty, *Fourierovou řadou funkce f vzhledem k ortogonální posloupnosti $\{\varphi_n\}$.*


Poznámka 8.1. V případě, kdy posloupnost $\{\varphi_n\}$ je ortonormální, platí pro Fourierovy koeficienty funkce f jednodušší vztah $c_n = (f, \varphi_n)$.

Přiřazení Fourierovy řady k dané funkci f je ovšem zatím pouze formální, neboť nevíme, zda tato řada vůbec konverguje, a v případě její konvergence, zda její součet je f . Z Věty 8.1 pouze plyne, že k libovolné integrovatelné funkci f existuje nejvýše jedna řada tvaru $\sum c_n \varphi_n$, která stejnoměrně konverguje na $[a, b]$ k f . Částečné součty Fourierovy řady funkce f však aproximují v jistém smyslu nejlépe tuto funkci mezi všemi lineárními kombinacemi funkcí φ_n . Nazvěme číslo

$$\|f - g\| = \left\{ \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx \right\}^{1/2}$$

kvadratickou odchylkou funkcí f, g . Pak platí:

Věta 8.2. *Bud' $\{\varphi_n\}$ ortogonální posloupnost funkcí na intervalu $[a, b]$, f integrovatelná funkce na $[a, b]$, bud' $n \in \mathbb{N}$. Mezi všemi lineárními kombinacemi funkcí*



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec


Strana 198 z 261

$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ má od funkce f nejmenší kvadratickou odchylku ta, jejíž koeficienty jsou Fourierovy koeficienty funkce f vzhledem k posloupnosti $\{\varphi_n\}$.

Důkaz. Buďte c_k ($k = 1, \dots, n$) Fourierovy koeficienty funkce f , d_k ($k = 1, \dots, n$) libovolná reálná čísla. Pak je

$$\begin{aligned}
 \left\| f - \sum_{k=1}^n d_k \varphi_k \right\|^2 &= \int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=1}^n d_k \varphi_k(x) \right)^2 dx \\
 &= \int_a^b f^2(x) dx - 2 \sum_{k=1}^n d_k \int_a^b f(x) \varphi_k(x) dx + \\
 &\quad + \int_a^b \left(\sum_{k=1}^n d_k \varphi_k(x) \right)^2 dx \\
 &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n d_k (f, \varphi_k) + \sum_{k=1}^n d_k^2 \int_a^b \varphi_k^2(x) dx \\
 &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n c_k d_k \|\varphi_k\|^2 + \sum_{k=1}^n d_k^2 \|\varphi_k\|^2 \\
 &= \|f\|^2 + \sum_{k=1}^n \|\varphi_k\|^2 (d_k^2 - 2c_k d_k) \\
 &= \|f\|^2 + \sum_{k=1}^n \|\varphi_k\|^2 [(c_k - d_k)^2 - c_k^2].
 \end{aligned}$$

Poslední výraz však zřejmě nabývá nejmenší hodnoty právě tehdy, když $d_k = c_k$ pro $k = 1, \dots, n$, tj. když d_k jsou Fourierovy koeficienty funkce f . \square



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 199 z 261

Poznámka 8.2. Z předchozího důkazu plyne, volíme-li $d_k = c_k$ pro $k = 1, \dots, n$, tzv. *Besselova identita*

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 \|\varphi_k\|^2.$$

Protože $\|f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k\|^2 \geq 0$, plyne odtud

$$\sum_{k=1}^n c_k^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f\|^2 \quad (8.4)$$

pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ (tzv. *Besselova nerovnost*).

Důsledek 8.1. *Necht' $\{\varphi_n\}$ je ortogonální posloupnost funkcí na intervalu $[a, b]$, f integrovatelná funkce na $[a, b]$ a necht' c_n ($n \in \mathbb{N}$) jsou Fourierovy koeficienty funkce f vzhledem k posloupnosti $\{\varphi_n\}$. Pak řada*


$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \quad (8.5)$$

konverguje a platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 \leq \|f\|^2. \quad (8.6)$$

Zejména platí $\lim c_n \|\varphi_n\| = 0$.

Důkaz. Z Besselovy nerovnosti (8.4) plyne, že posloupnost částečných součtů číselné řady (8.5) je shora ohraničená. Protože jde o řadu s nezápornými členy, je tato řada konvergentní (viz Kapitola 3).



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 200 z 261

Z Besselovy nerovnosti (8.4) také plyne, že

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = \lim \sum_{k=1}^n c_k^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f\|^2.$$

Podle Věty 1.1 je pak $\lim c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = 0$ a tedy i $\lim c_n \|\varphi_n\| = 0$. \square

Jestliže v nerovnosti (8.6) nastane rovnost, říkáme, že pro funkci f platí Parsevalova rovnost. Řekneme, že Fourierova řada $\sum c_n \varphi_n$ funkce f konverguje podle středu k funkci f , právě když platí

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right\| \rightarrow 0 \text{ pro } n \rightarrow \infty. \quad (8.7)$$


Pak platí:

Důsledek 8.2. *Bud' $\{\varphi_n\}$ ortogonální posloupnost funkcí na intervalu $[a, b]$, f integrovatelná funkce na $[a, b]$. Fourierova řada funkce f vzhledem k posloupnosti $\{\varphi_n\}$ konverguje podle středu k f právě tehdy, když pro funkci f platí Parsevalova rovnost, tj.*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \|\varphi_n\|^2 = \|f\|^2. \quad (8.8)$$

Důkaz. Jelikož

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 \|\varphi_k\|^2,$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 201 z 261

je vztah (8.7) ekvivalentní se vztahem

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 \|\varphi_k\|^2 \rightarrow 0,$$

tj. platí (8.8). □

Poznámka 8.3. Předchozí vztahy se poněkud formálně zjednoduší, je-li posloupnost $\{\varphi_n\}$ ortonormální. Besselova identita má pak tvar

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2,$$

Parsevalova rovnost má tvar

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 = \|f\|^2$$


a podle (8.6) platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \leq \|f\|^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0.$$

8.2. Fourierovy řady vzhledem k systému $\{\cos nx, \sin nx\}$

V tomto odstavci se budeme zabývat výlučně Fourierovými řadami vzhledem k systému

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}. \quad (8.9)$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 202 z 261

Protože jsou tyto funkce 2π -periodické, půjde v tomto případě o aproximaci 2π -periodických funkcí.

Lemma 8.1. *Bud' f periodická funkce s periodou 2π , jež je integrovatelná na intervalu $[0, 2\pi]$. Pak pro libovolné $a \in \mathbb{R}$ platí*

$$\int_a^{a+2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x) dx .$$

Důkaz. Platí

$$\int_a^{a+2\pi} f(x) dx = \int_a^{2\pi} f(x) dx + \int_{2\pi}^{a+2\pi} f(x) dx .$$

Substitucí $x = t + 2\pi$ ve druhém integrálu vyjde


$$\begin{aligned} \int_a^{a+2\pi} f(x) dx &= \int_a^{2\pi} f(x) dx + \int_0^a f(t + 2\pi) dt = \\ &= \int_a^{2\pi} f(x) dx + \int_0^a f(t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) dt . \end{aligned}$$

□

Lemma 8.2 (Ortogonalita trigonometrického systému). *Posloupnost (8.9) je ortogonální na libovolném intervalu $[c, c + 2\pi]$ délky 2π .*

Důkaz. Podle předcházejícího lemmatu stačí ukázat ortogonalitu na intervalu $[-\pi, \pi]$. Pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ je

$$(1, \cos nx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad (1, \sin nx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0;$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 203 z 261

pro libovolné $m, n \in \mathbb{N}$ je

$$\begin{aligned}(\sin mx, \cos nx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] \, dx = 0\end{aligned}$$

a pro libovolná $m, n \in \mathbb{N}$, $m \neq n$ je

$$\begin{aligned}(\cos mx, \cos nx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x] \, dx = 0,\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}(\sin mx, \sin nx) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x] \, dx = 0.\end{aligned}$$

Konečně je $\|1\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi$, a

$$\|\cos nx\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2nx) \, dx = \pi,$$

$$\|\sin nx\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2nx) \, dx = \pi.$$

□



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 204 z 261

Příslušná ortonormální posloupnost je

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2x, \dots \right. \\ \left. \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots \right\}.$$


Pojmy „Fourierovy koeficienty funkce f “ a „Fourierova řada funkce f “ budou tedy v dalším zásadně znamenat „Fourierovy koeficienty funkce f vzhledem k posloupnosti (8.9)“ a „Fourierova řada funkce f vzhledem k této posloupnosti“. Úvahy provedeme pro interval $[-\pi, \pi]$, lze je však beze zbytku přenést na libovolný interval $[c, c + 2\pi]$, $c \in \mathbb{R}$.

Věta 8.3. *Fourierova řada libovolné integrovatelné funkce f na intervalu $[-\pi, \pi]$ má vzhledem k systému (8.9) tvar*

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (8.10)$$

kde a_n, b_n jsou Fourierovy koeficienty funkce f , pro něž platí

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 205 z 261

Důkaz. Podle Věty 8.1 je Fourierova řada funkce f tvaru

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

a pro její Fourierovy koeficienty platí

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Aby byla odstraněna jistá nesymetrie v těchto vztazích, je obvyklé „nultý“ koeficient psát ve tvaru $\frac{a_0}{2}$; tedy Fourierova řada funkce f má uvedený tvar (8.10). \square

Důsledek 8.3. *Bud' f integrovatelná funkce na intervalu $[-\pi, \pi]$.*

Je-li f sudá funkce, má její Fourierova řada tvar


$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad \text{kde } a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n \in \mathbb{N} \cup \{0\}).$$

Je-li f lichá, má její Fourierova řada tvar

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad \text{kde } b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Důkaz. Poznamenejme, že obecně platí: Je-li g integrovatelná funkce na intervalu $[-h, h]$, která je sudá, resp. lichá, pak

$$\int_{-h}^h g(x) dx = 2 \int_0^h g(x) dx, \quad \text{resp.} \quad \int_{-h}^h g(x) dx = 0$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 206 z 261

(toto tvrzení snadno dokážeme, vyjádříme-li integrál přes interval $[-h, h]$ na součet dvou integrálů přes intervaly $[-h, 0]$ a $[0, h]$ a zavedeme-li v prvním z nich substituci $x = -t$).

Tvrzení věty nyní plyne z toho, že je-li f sudá, je $f(x) \cos nx$ sudá, $f(x) \sin nx$ lichá a je-li f lichá, je $f(x) \cos nx$ lichá, $f(x) \sin nx$ sudá. \square

Nechť f je integrovatelná funkce na intervalu $[0, \pi]$. Položíme-li pro $x \in [-\pi, 0)$ $f(x) = f(-x)$, zkonstruujeme *sudé rozšíření funkce* f na interval $[-\pi, \pi]$; Fourierově řadě sudého rozšíření funkce f říkáme rozvoj funkce f v *kosinovou řadu* na intervalu $[0, \pi]$.

Podobně, je-li f integrovatelná na $(0, \pi]$ a položíme-li $f(0) = 0$, $f(x) = -f(-x)$ pro $x \in [-\pi, 0)$, sestrojíme *liché rozšíření funkce* f na interval $[-\pi, \pi]$. Fourierova řada lichého rozšíření funkce f se nazývá rozvoj funkce f v *sinovou řadu* na intervalu $[0, \pi]$.


Poznámka 8.4. Nechť f je integrovatelná funkce na intervalu $[-\pi, \pi]$ a a_n ($n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$), b_n ($n \in \mathbb{N}$) jsou její Fourierovy koeficienty. Podle Důsledku 8.1 řada

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

konverguje a platí

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

Zejména platí, že $\lim a_n = 0$, $\lim b_n = 0$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Video

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 207 z 261

Poznámka 8.5. Fourierovu řadu (8.10) lze vyjádřit v oboru \mathbb{C} užitím vztahů (viz např. [8])

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

takto:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(e^{inx} + e^{-inx}) - b_n i(e^{inx} - e^{-inx})) &= \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - b_n i}{2} e^{inx} + \frac{a_n + b_n i}{2} e^{-inx} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \end{aligned}$$


kde Fourierovy koeficienty c_n jsou tvaru

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Vskutku, $c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ a pro $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2}(a_n - b_n i) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx - i \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (\cos nx - i \sin nx) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx \end{aligned}$$

a podobně $c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + b_n i) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 208 z 261

8.3. Konvergence Fourierovy řady

V tomto odstavci uvedeme postačující podmínky pro bodovou a stejnoměrnou konvergenci Fourierovy řady (8.10).


Všimněme si úvodem, že pokud Fourierova řada funkce f konverguje na intervalu $[-\pi, \pi]$, pak konverguje na intervalu $(-\infty, \infty)$ a její součet je periodická funkce s periodou 2π . Proto lze rozumné výsledky o aproximacích Fourierovými řadami očekávat pouze pro periodické funkce s periodou 2π a na takové se v dalším zásadně omezíme. Poznamenejme, že pro takovou funkci stačí, aby byla definována na intervalu $(-\pi, \pi)$ (nebo $[-\pi, \pi)$); pak je totiž jednoznačně určeno její 2π -periodické rozšíření na interval $(-\infty, \infty)$.

Zavedeme následující označení: Symbolem $f(x_0+)$ budeme rozumět číslo $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$, pokud tato jednostranná limita existuje. Analogicky je $f(x_0-) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$.

Nazvěme funkci f *po částech spojitou* na intervalu $[a, b]$, právě když má na tomto intervalu pouze končený počet bodů nespojitosti, přičemž tyto body jsou body nespojitosti prvního druhu (tj. v těchto bodech existují obě jednostranné limity a jsou vlastní). Nazvěme funkci f *po částech monotonní* na intervalu $[a, b]$, právě když existuje dělení tohoto intervalu (s konečným počtem bodů) tak, že uvnitř každého dělicího intervalu je daná funkce monotonní.

Věta 8.4 (Dirichletova). *Necht' funkce f je po částech spojitá a po částech monotonní na intervalu $[-\pi, \pi]$. Pak její Fourierova řada konverguje na $[-\pi, \pi]$ a její součet je roven:*

(1) $f(x_0)$ v každém bodě $x_0 \in (-\pi, \pi)$, v němž je f spojitá,



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 209 z 261

(2) $\frac{1}{2}[f(x_0-) + f(x_0+)]$ v každém bodě $x_0 \in (-\pi, \pi)$, v němž je f nespojitá,

(3) $\frac{1}{2}[f(-\pi+) + f(\pi-)]$ v krajních bodech intervalu $[-\pi, \pi]$.

Důkaz. Důkaz spočívá na řadě důležitých lemmat; jeho provedení překračuje rámec těchto skript. Přesný důkaz lze nalézt např. v [15]. Naznačme pouze některé klíčové kroky důkazu:

▷ Označme symbolem $S_n(f)$ n -tý částečný součet Fourierovy řady funkce f . Funkci f lze na intervalu $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$ vyjádřit jako $f = g - h$, kde g, h jsou neklesající na tomto intervalu. Z vlastností skalárního součinu plyne

$$S_n(f) = S_n(g) - S_n(h);$$

můžeme proto předpokládat přímo, že f je neklesající na $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$.

▷ Buď f integrovatelná funkce na intervalu $[-\pi, \pi]$, $x_0 \in [-\pi, \pi]$, $n \in \mathbb{N}$. Pak platí

$$S_n(f)(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x_0 + 2t) + f(x_0 - 2t)] \cdot \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} dt.$$


Označme

$$D_n(t) = \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}$$

pro $n \in \mathbb{N}$; tato funkce bývá někdy nazývána n -tým Dirichletovým jádrem.

▷ Tzv. princip lokalizace: Buď f integrovatelná funkce na intervalu $[-\pi, \pi]$, $x_0 \in [-\pi, \pi]$, $\delta \in \mathbb{R}$, $0 < \delta \leq \frac{\pi}{2}$. Pak platí

$$\lim \left[S_n(f)(x_0) - \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x_0 + 2t) + f(x_0 - 2t)] D_n(t) dt \right] = 0.$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 210 z 261

Princip lokalizace ukazuje, že o tom, zda Fourierova řada funkce f konverguje v bodě $x_0 \in [-\pi, \pi]$ a k jakému součtu, rozhodují pouze vlastnosti funkce f v (libovolně malém) okolí bodu x_0 .

▷ Buď $h \in \mathbb{R}$, $h > 0$ a necht' f je monotonní funkce na intervalu $[0, h]$. Pak platí

$$\lim \int_0^h f(t) \frac{\sin nt}{t} dt = \frac{\pi}{2} f(0+).$$

▷ Píšeme $D_n(t)$ ve tvaru

$$D_n(t) = \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} = \frac{\sin(2n+1)t}{t} + \sin(2n+1)t \cdot \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right)$$

a dokážeme, že

$$\lim \int_0^\delta [f(x_0+2t) + f(x_0-2t)] \cdot \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right) \cdot \sin(2n+1)t dt = 0.$$


▷ Dokážeme platnost vztahu

$$\lim \frac{1}{\pi} \int_0^\delta [f(x_0+2t) + f(x_0-2t)] D_n(t) dt = \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2},$$

odkud již $\lim S_n(f)(x_0) = \frac{1}{2}[f(x_0+) + f(x_0-)]$. □

Poznámka 8.6. Necht' funkce f je po částech spojitá na intervalu $[-\pi, \pi]$. Funkci f^* nazveme 2π -periodickým rozšířením funkce f , jestliže

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-\pi, \pi), \\ f(x - 2k\pi), & x \in ((2k-1)\pi, (2k+1)\pi), \quad k \in \mathbb{Z}, \\ \frac{1}{2}[f(-\pi+) + f(\pi-)], & x = (2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 211 z 261

Jestliže Fourierova řada funkce f konverguje na intervalu $[-\pi, \pi]$ k funkci určené v Dirichletově větě (Věta 8.4), pak konverguje na $(-\infty, \infty)$ k 2π -periodickému rozšíření této funkce.

Zejména, je-li funkce f spojitá na intervalu $[-\pi, \pi]$, Fourierova řada konverguje na $(-\infty, \infty)$ k 2π -periodickému rozšíření f^* funkce f .

Poznámka 8.7. Ukažme, jak lze odvozených výsledků využít k nalezení Fourierových řad periodických funkcí s periodou $p \neq 2\pi$. Označme kvůli jednoduchosti $p = 2h$ a předpokládejme, že f je integrovatelná funkce na intervalu $[-h, h]$. Pak funkce

$$g(t) = f\left(\frac{h}{\pi}t\right)$$


je periodická s periodou 2π ; je-li přitom f po částech spojitá a po částech monotónní na $[-h, h]$, zřejmě je také funkce g po částech spojitá a po částech monotónní na $[-\pi, \pi]$. Proto lze funkci g rozvinout do Fourierovy řady (8.10) na $[-\pi, \pi]$, odkud zpětnou transformací $t = \frac{\pi}{h}x$ obdržíme Fourierovu řadu funkce f na $[-h, h]$ ve tvaru

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{h}x + b_n \sin \frac{n\pi}{h}x \right),$$

kde Fourierovy koeficienty jsou dány vztahy

$$a_n = \frac{1}{h} \int_{-h}^h f(x) \cos \frac{n\pi}{h}x \, dx \quad (n \in \mathbb{N} \cup \{0\}),$$

$$b_n = \frac{1}{h} \int_{-h}^h f(x) \sin \frac{n\pi}{h}x \, dx \quad (n \in \mathbb{N}).$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 212 z 261

Příklad 8.1. Najděte Fourierovu řadu funkce $f(x) = x^2$ na intervalu $[-\pi, \pi]$.

Řešení. Protože f je po částech monotonní a spojitá na $[-\pi, \pi]$, přičemž $f(-\pi) = f(\pi)$, konverguje její Fourierova řada na $[-\pi, \pi]$ k f . Dále je f sudá, takže $b_n = 0$ pro $n \in \mathbb{N}$ a

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2}{3}\pi^2, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx.$$

Dvojití aplikací metody per partes dostaneme

$$a_n = \frac{4}{n^2} \cos n\pi = \frac{4}{n^2} \cdot (-1)^n.$$

Tedy pro $x \in [-\pi, \pi]$ platí:


$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

Položíme-li zde $x = \pi$, obdržíme

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \text{odkud} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Položíme-li $x = 0$, obdržíme

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad \text{odkud} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 213 z 261

Poznamenejme ještě, že nalezená Fourierova řada konverguje na $(-\infty, \infty)$ a její součet je funkce, jež je 2π -periodickým rozšířením funkce f ; její graf je na Obr. 8.2.



Řešme příklad 8.1 nejprve metodou „krok za krokem“. Spočítáme koeficienty a_0 , a_n a b_n , kde $n \in \mathbb{N}$.

```
> a[0]:=1/Pi*int(x^2, x=-Pi..Pi);
```

$$a_0 := \frac{2}{3} \pi^2$$

```
> assume(n, integer);
```

```
> a[n]:=1/Pi*int(x^2*cos(n*x), x=-Pi..Pi);
```

$$a_{n\sim} := 4 \frac{(-1)^{n\sim}}{n\sim^2}$$

Protože funkce je sudá, bude koeficient b_n roven nule. Tuto skutečnost ověříme výpočtem.

```
> b[n]:=1/Pi*int(x^2*sin(n*x), x=-Pi..Pi);
```

$$b_{n\sim} := 0$$

Fourierova řada funkce $f(x) = x^2$ má tedy tvar:

```
> x^2=a[0]/2+sum(a[n]*cos(n*x)+b[n]*sin(n*x),
```

```
> n=1..infinity);
```

$$x^2 = \frac{1}{3} \pi^2 + \left(\sum_{n\sim=1}^{\infty} 4 \frac{(-1)^{n\sim} \cos(n\sim x)}{n\sim^2} \right)$$

Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 214 z 261

Nyní znázorníme Fourierovy polynomy grafem. Nejdříve vytvoříme funkci `four`, která pro zadané m vytvoří funkci proměnné x z prvních m členů Fourierovy řady.

- ```
> four := m -> a[0] / 2 + sum(a[n] * cos(n * x) + b[n] * sin(n * x),
> n = 1..m):
```

Například Fourierův polynom  $F_3(x)$  má tvar:

- ```
> F[3](x) = four(3);
```

$$F_3(x) = \frac{1}{3} \pi^2 - 4 \cos(x) + \cos(2x) - \frac{4}{9} \cos(3x)$$

Načteme knihovnu `plots` obsahující funkce pro kreslení grafů.

- ```
> with(plots):
```

Do proměnné `graf1` uložíme graf funkce  $x^2$ .

- ```
> graf1 := plot(x^2, x = -Pi..Pi, color = aquamarine,  
> thickness = 3):
```

Do proměnné `graf2` graf polynomu $F_3(x)$.

- ```
> graf2 := plot(four(3), x = -Pi..Pi, color = red):
```

Grafy zobrazíme společně pomocí příkazu `display` (Obr. 8.1).

- ```
> display(graf2, graf1);
```


Nyní vytvoříme `animaci` znázorňující aproximaci funkce x^2 Fourierovou řadou.

Pro animaci použijeme prvních 10 členů Fourierovy řady.

- ```
> clenou := 10:
```

Do proměnné `anim` uložíme animaci polynomu  $F_m(x)$  při rostoucí hodnotě  $m$ .

- ```
> anim := animate(four(m), x = -3 * Pi..3 * Pi,  
> m = 0..clenou, frames = clenou + 1, color = red,  
> numpoints = 150):
```



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 215 z 261



Obr. 8.1: Funkce x^2 , $x \in (-\pi, \pi)$ a její Fourierův polynom pro $n = 3$

Pro společné zobrazení spolu s grafem funkce x^2 opět použijeme příkaz `display`.


```
> display(anim, graf1);
```

Jak je na [animaci](#) vidět, řada konverguje k periodickému rozšíření funkce x^2 . Nyní se pokusíme tento postup zautomatizovat pomocí vhodných procedur:

```
> restart:
```

```
> with(plots):
```

Funkce `Period(f, a, b)` vytvoří periodické rozšíření funkce f zadané na intervalu $\langle a, b \rangle$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 216 z 261


```

> Period:=proc(f, a::realcons, b::realcons)
> local f2, modL, L;
> L:=abs(b-a):
> modL := x->x-floor((x-a)/L)*L:
> f2:=x->f(modL(x)):
> eval(f2):
> end:

```

Funkce ClenyFourierRady(f , a , b , m) vytvoří seznam prvních m členů Fourierovy řady funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

```

> ClenyFourierRady:=proc(f, a::realcons,
> b::realcons, m::integer)
> local a0, L, N, i, rozvoj, pom;
> rozvoj:=[]:

```

Zjistíme délku intervalu.

```

> L:=abs(b-a):

```

Spočítáme koeficient a_0 , koeficienty a_n a b_n budeme počítat až pro konkrétní hodnoty n .

```

> a0:=eval(1/L*int(f(x), x=a..b)):


```

Počítáme postupně všechny členy a přidáváme je do seznamu.

```

> for i from 0 to (m-1) do
> if i=0 then rozvoj:=a0:
> else

```



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 217 z 261

```

> pom:=2/L*int(f(x)*cos(2*Pi/L*i*x),
> x=a..b)*cos(2*Pi/L*i*x)+ 2/L*int(f(x)
> *sin(2*Pi/L*i*x),x=a..b)*sin(2*Pi/L*i*x):
> rozvoj:=rozvoj,pom:
> fi:
> od:
> eval([rozvoj]):
> end:

```

Funkce VytvorPol(sezclenu, m) vytvoří pomocí seznamu členů Fourierovy řady sezclenu Fourierův polynom $F_m(x)$.

```

> VytvorPol:=proc(sezclenu::list, m::integer)
> local i, f, rada;

```

Sečteme prvních $m + 1$ členů rozvoje a ze součtu vytvoříme funkci proměnné x .

```

> rada:=sum(sezclenu[i+1], i=0..m):
> f:=unapply(rada, x):
> f:
> end:


```

Animaci znázorňující konvergenci Fourierovy řady vytvoří funkce

AnimGrafFourierFce(f, rada, int1, int2, limit, pocclen, inc).

1. parametr – funkce.

2. parametr – seznam členů Fourierovy řady (získaný výstupem procedury ClenyFourierRady).



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 218 z 261

- 3. parametr** – horizontální rozsah grafu.
- 4. parametr** – vertikální rozsah grafu.
- 5. parametr** – celkový počet Fourierových polynomů použitých k animaci.
- 6. parametr** – udává, kterým polynomem se začne.
- 7. parametr** – udává rozdíl indexů dvou po sobě následujících polynomů. Například, budeme-li chtít pouze polynomy $F_1(x)$, $F_3(x)$ a $F_5(x)$, bude roven dvěma.
- 8. parametr** – souřadnice referenčního bodu pro výpis indexu Fourierova polynomu. Údaj je vypisován napravo od zadaného referenčního bodu. Parametr je volitelný.

```
> AnimGrafFourierFce:=proc() local fce, rada,
int1, int2, poccLen, inc, limit, i, g1, g2, g3, f,
anim, barva2, bod;
> fce:=args[1]:
> rada:=args[2]:
> int1:=args[3]:
> int2:=args[4]:
> limit:=args[5]:
> poccLen:=args[6]:
> inc:=args[7]:
> if (nargs>7) then bod:=args[8]: fi:
```



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 219 z 261

```
> anim:=[]:
```

Zkontrolujeme, zda má seznam členů dostatečný počet položek.

```
> if ((nops(rada))<(pocclen+(limit-1)*inc)) then
> ERROR(cat(`Seznam clenu obsahuje pouze `,
> nops(rada), ` polozek, je pozadovano alespon `,
> ((limit-1)*inc+1), ` polozek.`), NULL);
> fi:
```

Do g1 uložíme graf původní funkce nakreslený zelenomodře.

```
> g1:=plot(fce, int1, int2, color=aquamarine,
> discont=true, thickness=3, numpoints=100);
```

V cyklu budeme vytvářet grafy funkcí odpovídající Fourierovým polynomům.

```
> for i from 0 to (limit-1) do
> f:=VytvorPol(rada, pocclen+i*inc):
```


Vytvoříme barevný přechod pro lepší rozlišení jednotlivých polynomů.

```
> barva2:=COLOR(RGB, i/limit, 0, 0.9-i/limit):
> g2:=plot(f, int1, int2, color=barva2,
> thickness=1, numpoints=200):
```

Pokud jsme zadali více než sedm argumentů, budeme vypisovat i údaj o hodnotě indexu m polynomu $F_m(x)$.

```
> if (nargs>7) then
> g3:=textplot([bod[1], bod[2],
> convert(`m`=pocclen+i*inc, string)],
> color=barva2, align=RIGHT):
> anim:=anim, display(g3, g2, g1):
```

V opačném případě vykreslíme pouze proložené grafy polynomiálních funkcí.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 220 z 261

```

> else
> anim:=anim, display(g2, g1):
> fi:
> od:
> end:

```



Řešme nyní příklad 8.1 s pomocí těchto nových procedur. Spočítáme prvních dvacet členů Fourierovy řady funkce x^2 na intervalu $(-\pi, \pi)$.

```
> rada:=ClenyFourierRady(x->x^2, -Pi, Pi, 20):
```

Vytvoříme periodické rozšíření funkce x^2 .

```
> fce:=Period(x->x^2, -Pi, Pi):
```

Do proměnné graf1 uložíme graf periodického rozšíření (Obr. 8.2).

```

> graf1:=plot(fce, -3*Pi..3*Pi, -1.5..11,
> color=aquamarine, thickness=3, discontin=true):
> display(graf1);

```

Nyní spočítáme polynom $F_0(x)$ a vykreslíme jeho graf společně s periodickým rozšířením (Obr. 8.3).

```

> pol:=VytvorPol(rada, 0):
> pol(x);

```

$$\frac{1}{3} \pi^2$$

```

> graf2:=plot(pol, -3*Pi..3*Pi, -1.5..11,
> color=red, numpoints=200):
> display(graf2, graf1);

```

Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 221 z 261



Obr. 8.2: Period. rozšíření funkce x^2



Obr. 8.3: Fourierův pol. pro $n = 0$


Totéž pro Fourierův polynom $F_2(x)$ (Obr. 8.4).

- > `pol:=VytvorPol(rada, 2):`
- > `pol(x);`

$$\frac{1}{3} \pi^2 - 4 \cos(x) + \cos(2x)$$

- > `graf2:=plot(pol, -3*Pi..3*Pi, -1.5..11,`
- > `color=red, numpoints=200):`
- > `display(graf2, graf1);`

Pomocí funkce `AnimGrafFourierFce` znázorníme první čtyři Fourierovy polynomy do jednoho obrázku (8.5).



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět



Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 222 z 261



Obr. 8.4: Fourierův polynom pro $n = 2$ Obr. 8.5: Fourierovy polynomy pro $n = 0, 1, 2, 3$


- > anim:=AnimGrafFourierFce(fce, rada,
- > -3*Pi..3*Pi, -1.5..11, 4, 0, 1):
- > display(anim, insequence=false);

Použijeme-li v příkazu `display` volbu `insequence=true`, místo prokládaného grafu vytvoříme **animaci**.

- > anim:=AnimGrafFourierFce(fce, rada,
- > -3*Pi..3*Pi, -1.5..11, 10, 0, 1, [-7, 10]):
- > display(anim, insequence=true);



Příklad 8.2. Najděte Fourierovu řadu funkce $f(x) = e^x$ na intervalu $[0, 2\pi]$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 223 z 261

Řešení. Platí

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi} [e^x]_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi} (e^{2\pi} - 1).$$

Dále metodou per partes nalezneme primitivní funkci k funkci $e^x \cos nx$ ve tvaru

$$\frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{n^2 + 1}$$

a primitivní funkci k funkci $e^x \sin nx$ ve tvaru

$$\frac{e^x (\sin nx - n \cos nx)}{n^2 + 1};$$

je tedy

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{n^2 + 1} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi} \frac{e^{2\pi} - 1}{n^2 + 1},$$


$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^x (\sin nx - n \cos nx)}{n^2 + 1} \right]_0^{2\pi} = -\frac{1}{\pi} (e^{2\pi} - 1) \frac{n}{n^2 + 1}.$$

Protože f je monotonní a spojitá na $[0, 2\pi]$, je součet její Fourierovy řady na $(0, 2\pi)$ roven přímo f . V krajních bodech tohoto intervalu je součet roven $(e^{2\pi} + 1)/2$, viz Obr. 8.6.

Pro $x \in (0, 2\pi)$ tedy platí:

$$e^x = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi} \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} \cos nx - \frac{n}{n^2 + 1} \sin nx \right) \right]$$

a pro $x = 0, x = 2\pi$ je součet řady na pravé straně roven $(e^{2\pi} + 1)/2$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 224 z 261

Odtud obdržíme

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi(e^{2\pi} + 1) - (e^{2\pi} - 1)}{2(e^{2\pi} - 1)}.$$




Obr. 8.6: Periodické rozšíření funkce e^x , $x \in (0, 2\pi)$

Příklad 8.3. Funkci $f(x) = x$ rozviňte na intervalu $[0, \pi]$ do kosinové řady.

Řešení. Sudé periodické rozšíření této funkce je znázorněno na Obr. 8.7. Přitom platí

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \pi,$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 225 z 261

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2}{n\pi} [x \sin nx]_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2}{n^2\pi} [(-1)^n - 1].$$

Tedy pro $x \in [0, \pi]$ platí

$$x = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \cos nx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$




Obr. 8.7: Sudé periodické rozšíření funkce x , $x \in (0, \pi)$

Příklad 8.4. Najděte Fourierův rozvoj funkce $f(x) = x$ na intervalu $[-1, 1]$.

Řešení. Periodické rozšíření této funkce je uvedeno na Obr. 8.8.

V tomto případě je $h = 1$; dále je f lichá, a proto $a_n = 0$ pro $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a

$$\begin{aligned} b_n &= 2 \int_0^1 x \sin n\pi x \, dx = \\ &= -\frac{2}{n\pi} [x \cos n\pi x]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \cos n\pi x \, dx = \\ &= -\frac{2}{n\pi} \cos n\pi + \frac{2}{n^2\pi^2} [\sin n\pi x]_0^1 = \frac{2}{n\pi} (-1)^{n-1}. \end{aligned}$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 226 z 261




Obr. 8.8: Periodické rozšíření funkce $x, x \in (-1, 1)$

Tedy

$$x = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin n\pi x \quad \text{pro } x \in (-1, 1).$$

Na závěr se budeme zabývat otázkou, kdy Fourierova řada dané funkce f konverguje stejnoměrně na $[-\pi, \pi]$. V této souvislosti je vhodné si všimnout, že pokud f je nespojitá v alespoň jednom bodě $x_0 \in [-\pi, \pi]$, pak její Fourierova řada nemůže konvergovat stejnoměrně, neboť součet stejnoměrně konvergentní trigonometrické řady je podle Věty 5.8 spojitá funkce na $[-\pi, \pi]$. Stejnou konvergenci lze proto očekávat pouze u Fourierových řad spojitých funkcí. Důkaz následujícího tvrzení neuvádíme, lze jej nalézt např. v [8].

Věta 8.5. *Necht' 2π -periodická funkce $f(x)$ je spojitá na intervalu $[-\pi, \pi]$ a její derivace $f'(x)$ je na témže intervalu po částech spojitá. Pak její Fourierova řada konverguje k funkci $f(x)$ stejnoměrně na intervalu $(-\infty, \infty)$.*



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 227 z 261

Poznámka 8.8. Lze dokázat (viz např. [8]) větu o jednoznačnosti pro součet trigonometrické řady (tzv. Heineho-Cantorova věta): Jestliže trigonometrická řada

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

a trigonometrická řada


$$\frac{a_0^*}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^* \cos nx + b_n^* \sin nx)$$

mají stejný součet pro všechna $x \in \mathbb{R} \setminus M$, kde M je nejvýše spočetná množina, pak platí $a_n = a_n^*$, ($n = 0, 1, 2, \dots$), $b_n = b_n^*$, ($n = 1, 2, \dots$).

Cvičení

8.1. Nalezněte Fourierovu řadu funkce $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ na intervalu $[-\pi, \pi]$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x \in [-\pi, 0), \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x \in (0, \pi]. \end{cases}$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 228 z 261

Postup je stejný jako v příkladě 8.1. Nejprve ukážeme řešení metodou „krok za krokem“.

```
> assume(n, integer);
```

Všimněme si, že funkce $\text{sgn}(x)$ je lichá, proto budou členy a_0 a a_n rovny nule.

Ověříme výpočtem:

```
> a[0]:=1/Pi*(int(signum(x), x=-Pi..Pi));
```

$$a_0 := 0$$

```
> a[n]:=1/Pi*(int(signum(x)*cos(n*x),
```

```
x=-Pi..Pi));
```

$$a_{n\sim} := 0$$

```
> b[n]:=1/Pi*(int(signum(x)*sin(n*x),
```

```
x=-Pi..Pi));
```

$$b_{n\sim} := -2 \frac{(-1)^{n\sim} - 1}{\pi n\sim}$$


Je vidět, že pro n sudé je $b_n = 0$; proto další úpravy provádíme pro n liché, tj. $n = 2k - 1$.

```
> assume(k, integer);
```

```
> b[n]:=simplify(subs(n=2*k-1,b[n]));
```

$$b_{n\sim} := 4 \frac{1}{\pi (2k\sim - 1)}$$

Fourierova řada funkce $\text{sgn}(x)$:



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 229 z 261

```
> `sgn(x)`=Sum(b[n]*sin((2*k-1)*x),
> k=1..infinity);
```

$$sgn(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 4 \frac{\sin((2k-1)x)}{\pi(2k-1)}$$

Fourierovy polynomy opět znázorníme grafem (Obr. 8.9) a animací.

```
> four:=m->sum(b[n]*sin((2*k-1)*x), k=1..m):
```

Pro $k = 2$ ($n = 3$) dostáváme:

```
> F[2](x)=four(2);
```

$$F_2(x) = 4 \frac{\sin(x)}{\pi} + \frac{4}{3} \frac{\sin(3x)}{\pi}$$


```
> with(plots):
> graf1:=plot(signum(x), x=-Pi..Pi,
> color=aquamarine, discont=true, thickness=3):
> graf2:=plot(four(2), x=-Pi..Pi,
> color=red):
> display(graf2, graf1);
> anim:=animate(four(m), x=-6..6, m=1..10,
> frames=10, numpoints=250, color=red):
> display(anim, graf1);
```

Nyní ukážeme řešení s využitím Mapleovských procedur. Do proměnných a a b uložíme krajní body intervalu.

```
> a:=-Pi:b:=Pi:
```

Definujeme funkci.

```
> fcel:=x->signum(x):
```



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 230 z 261



Obr. 8.9: Funkce $\text{sgn}(x)$, $x \in (-\pi, \pi)$ a její Fourierův polynom pro $n = 3$

Spočítáme prvních dvacet členů Fourierovy řady.

```
> rada:=ClenyFourierRady(fce1, a, b, 20):
```

Vytvoříme periodické rozšíření funkce $\text{sgn}(x)$.


```
> fce:=Period(fce1, a, b):
```

Graf periodického rozšíření uložíme do proměnné graf1.

```
> graf1:=plot(fce, -8..8, -1.5..1.5,
```

```
> color=aquamarine, thickness=3, discontin=true):
```

Spočítáme hodnotu polynomu $F_1(x)$ a vykreslíme jeho graf spolu s periodickým rozšířením funkce $\text{sgn}(x)$ (Obr. 8.10).



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít


Konec

Strana 231 z 261


```
> pol:=VytvorPol(rada, 1):
> pol(x);
```

$$4 \frac{\sin(x)}{\pi}$$

```
> graf2:=plot(pol, -8..8, -1.5..1.5,
> color=red, numpoints=200):
> display(graf1, graf2);
```




Obr. 8.10: Fourierův pol. pro $n = 1$



Obr. 8.11: Fourierův pol. pro $n = 5$

Podobně Fourierův polynom $F_5(x)$ je tvaru (Obr. 8.11):

```
> pol:=VytvorPol(rada, 5):
> pol(x);
```



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 232 z 261

$$4 \frac{\sin(x)}{\pi} + \frac{4}{3} \frac{\sin(3x)}{\pi} + \frac{4}{5} \frac{\sin(5x)}{\pi}$$


- > graf2:=plot(pol, -8..8, -1.5..1.5,
- > color=red, numpoints=200):
- > display(graf2, graf1);

Podobně jako v předcházejícím příkladě použijeme pro vytvoření prokládaného grafu funkci AnimGrafFourierFce (Obr. 8.12) a [animace](#).

- > anim:=AnimGrafFourierFce(fce, rada, -8..8,
- > -1.5..1.5, 3, 2, 2):
- > display(anim, insequence=false);
- > anim:=AnimGrafFourierFce(fce, rada, -8..8,
- > -1.5..1.5, 10, 1, 2, [-7.8, 1.3]):
- > display(anim, insequence=true);

8.2. Rozložte ve Fourierovu řadu funkci

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, 0], \\ \sin x, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa



Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 233 z 261





Obr. 8.12: Fourierovy polynomy pro $n = 1, 3, 5$

8.3. Mějme zadánu funkci

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \frac{\pi}{2}], \\ -\cos x, & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]. \end{cases}$$

Rozložte tuto funkci v kosinovou Fourierovu řadu.

Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 234 z 261

8.4. Určete rozvoj periodické funkce s periodou 2π , která je v základním intervalu periodicity definována:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi, 0], \\ x, & x \in (0, \pi]. \end{cases}$$

8.5. Rozviňte ve Fourierovu řadu na intervalu $[-\pi, \pi]$ funkci


$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}(\pi + x), & x \in (-\pi, 0], \\ \frac{1}{2}(\pi - x), & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

8.6. Rozviňte ve Fourierovu řadu funkci $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$.

8.7. Rozviňte ve Fourierovu řadu funkci $f(x) = \arcsin(\sin x)$.

8.8. Rozložte funkci $f(x) = x(\pi - x)$ v sinovou Fourierovu řadu na intervalu $(0, \pi)$. Najděte součet řady

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} + \dots$$



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 235 z 261

8.9. Funkci $f(x) = \pi^2 - x^2$ rozložte ve Fourierovu řadu na intervalu $(-\pi, \pi)$. Najděte součty řad

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

8.10. Určete Fourierův rozvoj periodické funkce $f(x) = x$ se základním intervalem periodicity $(0, 2\pi)$. Určete součet řady

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

8.11. Rozložte ve Fourierovu řadu funkci $f(x) = |x|$ na intervalu $(-l, l)$.


8.12. Nakreslete liché periodické rozšíření funkce $\frac{1}{2}(\pi - x)$, $x \in [0, \pi]$ a srovnajte s Obr. 5.2, 5.3. Z Fourierovy řady této funkce

$$\frac{1}{2}(\pi - x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

integrací dokažte vztah

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

pro každé $x \in [0, 2\pi]$.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 236 z 261

8.13. Pomocí Parsevalovy rovnosti dokažte, že pro sudou funkci $f(x)$ na intervalu $(-\pi, \pi)$ platí vztah $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(x) dx$ a odtud pro $f(x) = x^2$ odvoďte vzorec

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$



8.14. Udejte příklad trigonometrické řady, jež není Fourierovou řadou žádné funkce.


Návod: Uvažte Poznámku 8.4.

8.15. Udejte příklad trigonometrické řady, jež bodově konverguje na $[-\pi, \pi]$, ale není Fourierovou řadou žádné integrovatelné funkce.

Návod: Podle Dirichletova kritéria řada $\sum \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$ konverguje pro každé $x \in [-\pi, \pi]$. Kdyby tato řada byla Fourierovou řadou funkce f , pak podle Poznámky 8.4 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$, což je spor.

8.16. Dokažte: Jestliže na intervalu $[-\pi, \pi]$ trigonometrická řada stejnoměrně konverguje, pak je Fourierovou řadou svého součtu.

 Další příklady rozvoju funkcí do Fourierových řad zpracované pomocí Maplu  najdete [zde](#).



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 237 z 261



Člověk občas narazí na pravdu, ale většinou se otřepe a jde zase dál.



Fourierovy řady

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 238 z 261



Kapitola 9

Videoukázky

Tato kapitola obsahuje pomocné texty pro sledování videonahrávek. Doporučujeme v jednom okně sledovat videonahrávku, a v druhém mít otevřené tyto texty.

9.1. Klip1: přednáška – nekonečné číselné řady

Video spustíte otevřením [tohoto odkazu](#) (předpokladem je instalace webového prohlížeče a software pro přehrávání videa ve formátu MPEG 1 a jeho asociace s koncovkou .mpg).

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots}_{s_n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (a_n \in \mathbb{R})$$

Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 239 z 261

Součet řady:

Určíme jako limitu posloupnosti n -tých částečných součtů

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$


1. $\exists \lim s_n = s \in \mathbb{R} \dots \sum a_n$ konverguje. Platí: $\sum_1^\infty a_n = s \Rightarrow \lim a_n = 0$ (nutná podmínka konvergence řady)
2. $\exists \lim s_n = \pm\infty \dots \sum a_n$ diverguje
3. $\nexists \lim s_n \dots \sum a_n$ diverguje

Kritéria konvergence

Na konvergenci či divergenci řady nemá vliv chování konečně mnoha členů, nemusíme tedy striktně psát $\sum_{n=1}^\infty a_n$, budeme psát zkráceně $\sum a_n$.

Podle typu nekonečné řady rozlišujeme kritéria

1. řada s nezápornými členy $\sum a_n$, $a_n > 0$
 - **Srovnávací kritérium** – jestliže pro dostatečně velká n je $a_n \leq b_n$, pak platí
 $\sum b_n$ konverguje $\Rightarrow \sum a_n$ konverguje
 $\sum a_n$ diverguje $\Rightarrow \sum b_n$ diverguje
 - **Podílové a odmocninové kritérium**
 $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ nebo $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 240 z 261

$$q \begin{cases} < 1 & \text{konverguje} \\ > 1 & \text{diverguje} \\ = 1 & \text{nelze nic říci} \end{cases}$$

- **Limitní srovnávací kritérium**

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = L \quad \begin{array}{l} L < \infty, \sum b_n \text{ konv.} \Rightarrow \sum a_n \text{ konverguje} \\ L > 0, \sum b_n \text{ div.} \Rightarrow \sum a_n \text{ diverguje} \end{array}$$

- **Integrální kritérium** $\sum a_n$ konv. $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx$ konverguje, kde f je klesající a platí $f(n) = a_n$.

2. Alternující řady $\sum_1^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$, $a_n > 0$

Leibnizovo kritérium: řada konverguje, jestliže je posloupnost a_n klesající a $\lim a_n = 0$.

3. Řady s libovolnými členy $\sum a_n$, $a_n \in \mathbb{R}$


- **absolutní konvergence** ($\sum |a_n|$ konverguje)

$$\sum a_n \text{ absolutně konverguje} \Rightarrow \sum a_n \text{ konverguje}$$

- neabsolutní konvergence pro řady typu $\sum a_n b_n$

- **Dirichletovo kritérium:** $\sum a_n b_n$ konverguje, jestliže $\lim a_n = 0$, $|b_1 + \dots + b_n| \leq c$ (řada $\sum b_n$ má omezené částečné součty)

- **Abelovo kritérium:** $\sum a_n b_n$ konverguje, jestliže $|b_n| \leq c$ a $\sum a_n$ konverguje.



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 241 z 261

Operace s nekonečnými řadami

1. Algebraické operace

(a) **součet**

$\sum a_n + \sum b_n = \sum (a_n + b_n)$ za předpokladu konvergence obou řad


(b) **součin** – situace je mnohem komplikovanější, existuje nekonečně mnoho způsobů, jak definovat součin řad – viz Kapitola 4.

2. Základní zákony pro součet nekonečných řad

(a) **Distributivní zákon** $k(\sum_1^{\infty} a_n) = \sum_1^{\infty} ka_n$ za předp. konvergence $\sum a_n$

(b) **Asociativní zákon** $(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \dots = a_1 + (a_2 + a_3) + \dots$ za předp. konvergence $\sum a_n$

(c) **Komutativní zákon** $a_1 + a_2 + a_3 + \dots = a_3 + a_1 + a_2 + \dots$ platí pouze za předp. absolutní konvergence $\sum a_n$



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 242 z 261

9.2. Klip2: cvičení – řešené příklady na konvergenci řad

Video spustíte otevřením [tohoto odkazu](#) (předpokladem je instalace webového prohlížeče a software pro přehrávání videa ve formátu MPEG 1 a jeho asociace s koncovkou .mpg).

Zjistěte konvergenci řad:

1.
$$\sum \frac{n^2}{(2 + \frac{1}{n})^n}$$

Jedná se o řadu s nezápornými členy, použijeme [odmocninové kritérium](#):

$$\lim \frac{\sqrt[n]{n^2}}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

Výsledek: řada konverguje.

2.
$$\sum \frac{1}{n \ln n}$$


Opět se jedná o řadu s nezápornými členy, nyní ale použijeme [integrální kritérium](#)

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_2^{\infty} \frac{dt}{t} = \infty.$$

Použili jsme substituci $\ln x = t$. Jelikož integrál diverguje, i daná řada diverguje.

3.
$$\sum \arccos \frac{n}{n+1}$$

Jedná se opět o řadu s nezápornými členy, nevíme, co čekat – porovnáme tuto



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 243 z 261

řadu s harmonickou řadou $\sum \frac{1}{n}$. **Limitní srovnávací kritérium:**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arccos \frac{n}{n+1}}{\frac{1}{n}} &= \frac{0}{0} \stackrel{\text{L'Hosp.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arccos \frac{n}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^2}} \cdot \frac{n+1-n}{(n+1)^2}}{-\frac{1}{n^2}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt{\frac{2n+1}{(n+1)^2}} \cdot (n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt{2n+1} \cdot |n+1|} = \infty > 0 \end{aligned}$$

Řada $\sum \frac{1}{n}$ diverguje \Rightarrow daná řada diverguje.

4. $\sum \frac{\sin n}{6^n}$


Nyní máme řadu s libovolnými členy, zkusíme absolutní konvergenci:

$$\left| \frac{\sin n}{6^n} \right| \leq \frac{1}{6^n}.$$

Řada $\sum \frac{1}{6^n}$ konverguje (např. **odmocninové kritérium**: $\lim \sqrt[n]{\frac{1}{6^n}} = \frac{1}{6} < 1$) \Rightarrow podle **srovnávacího kritéria** daná řada konverguje absolutně.

5. $\sum (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$

Jedná se o řadu alternující, ale nelze použít Leibnizovo kritérium, protože $\left\{ \frac{\sin^2 n}{n} \right\}$ není klesající. Musíme tedy použít nějaký jiný způsob – upravíme dle



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 244 z 261

vzorce pro poloviční úhel výraz $\sin^2 n = \frac{1 - \cos 2n}{2}$ a rozdělíme původní řadu na dvě řady:

- (a) $\sum (-1)^n \frac{1}{2n}$ – konverguje podle **Leibnizova kritéria**.
(b) $\sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n}$ – řada s libovolnými členy. Upravíme:


$$(-1)^n \cos 2n = \cos n\pi \cos 2n = \frac{1}{2}(\cos n(\pi + 2) + \cos(\pi - 2)).$$

Řada $\sum \cos nx$ má omezené částečné součty pro $x \neq 2k\pi$, $\lim \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow$ podle **Dirichletova kritéria** konvergují řady

$$\sum \frac{\cos n(\pi + 2)}{n}, \quad \sum \frac{\cos n(\pi - 2)}{n},$$

a proto konverguje i řada $\sum (-1)^n \frac{\cos 2n}{2n}$.

Jelikož obě tyto řady konvergují, konverguje i řada původní.



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 245 z 261

9.3. Klip3: přednáška – nekonečné řady funkcí

Video spustíte otevřením [totoho odkazu](#) (předpokladem je instalace webového prohlížeče a software pro přehrávání videa ve formátu MPEG 1 a jeho asociace s koncovkou .mpg).

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in I$$

Stejněměrná konvergence

- Posloupnost $\{s_n(x)\}$, $x \in I$ konverguje k funkci $s(x)$:

$$\forall x \in I \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x),$$

$$\forall x \in I \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n > n_0 : |s_n(x) - s(x)| < \varepsilon$$


- Posloupnost $\{s_n(x)\}$, $x \in I$ stejněměrně konverguje k $s(x)$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n > n_0 \forall x \in I : |s_n(x) - s(x)| < \varepsilon$$

- Řada $\sum f_n(x)$ stejněměrně konverguje na intervalu I , jestliže stejněměrně konverguje posloupnost n -tých částečných součtů.

Weierstrassovo kritérium: $\sum f_n(x)$ stejněměrně konverguje, jestliže

$$|f_n(x)| \leq a_n \quad \forall x \in I \quad \text{a} \quad \sum a_n \text{ konverguje.}$$



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 246 z 261

Vlastnosti stejnoměrně konvergentních posloupností a řad

- $\{s_n(x)\}$ stejnoměrně konverguje k $s(x)$ a funkce s_n jsou spojité na $I \Rightarrow s$ je spojitá na I .

Př. $\{e^{-nx}\}$, $I = [0, \infty)$

$$s(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx} = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$$

Proto posloupnost není stejnoměrně konvergentní.

- **Derivace řady.** Platí


$$\left(\sum f_n(x) \right)' = \sum f_n'(x) \quad \text{na } I$$

za předpokladu, že $\sum f_n(x)$ konverguje na I a $\sum f_n'(x)$ konverguje stejnoměrně na I .

- **Integrace řady.** Platí

$$\int_a^b \sum f_n(x) dx = \sum \int_a^b f_n(x) dx$$

za předpokladu, že jsou funkce f_n integrace schopné na $[a, b]$ a jestliže je $\sum f_n$ na $[a, b]$ stejnoměrně spojitá.



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 247 z 261

Mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n \in \mathbb{R}$$

Existuje číslo $0 \leq r \leq \infty$ s vlastností

$(-\infty, -r) \cup (r, \infty)$	diverguje
$(-r, r)$	konverguje

O krajních bodech intervalu $(-r, r)$ nelze obecně nic říci, je třeba je vyšetřit zvlášť. Číslo r se nazývá *poloměr konvergence*.

Každá mocninná řada je stejnoměrně konvergentní na každém uzavřeném podintervalu $[-\rho, \rho]$ intervalu $(-r, r)$, kde $\rho < r$. Použití: rozvoj funkcí do mocninných řad.


Příklad 9.1. Rozviňte do mocninné řady funkci $\arctg x$.

Řešení. Nejprve danou funkci zderivujeme a tuto derivaci snadno rozvineme do mocninné řady:

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots \quad \text{platí pro } |x| < 1.$$

Nyní pravou stranu zintegrujeme člen po členu a dostáváme požadovaný výsledek

$$\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad \text{pro } |x| < 1.$$



Videoukázky

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 248 z 261



Výsledky cvičení

Kapitola 1

1.1. a) 1 b) $\frac{11}{18}$ c) $\frac{23}{90}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{3}{2}$ f) 3 g) 5 h) $\frac{14}{15}$ **1.2.** a) $-\frac{4}{33}$ b) $\frac{27}{50}$
1.3. a)–c) divergují **1.4.** a) $x = 10$ b) $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ nebo $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$. **1.5.**
Součet obvodů $8(2 + \sqrt{2})$, součet obsahů 8. **1.6.** Úloha vede k určení součtu nekonečné geometrické řady: $48 + 24 + 12 + 6 + \dots$, jejíž součet je $s = 96$ **1.7.**
Obsah Sierpiňského koberce je $P = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8^n}{9^{n+1}} = 0$.

Kapitola 2

2.1. a) konverguje b) konverguje c) konverguje d) diverguje e) konverguje pro $0 < a < 1$, diverguje pro $a \geq 1$ f) diverguje g) konverguje pro $a > 1$, diverguje pro $a \in (0, 1]$ h) konverguje i) konverguje j) konverguje k) konverguje l) diverguje m) konverguje n) diverguje o) diverguje pro $a \geq \frac{\pi}{2}$, konverguje pro $0 < a < \frac{\pi}{2}$ p) diverguje q) diverguje. **2.2.** $a_{2n-1} = \frac{1}{2^{2n-1}}$, $a_{2n} = \frac{1}{3^{2n}}$. **2.3.** Neexistuje [Návod: je-li $\limsup \sqrt[n]{a_n} > 1$, pak existuje

Výsledky cvičení

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 249 z 261


$\{n_k\}$, $n_k \rightarrow \infty$ tak, že $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{a_{n_k}} \geq 1$. Označíme-li $b_k = a_{n_k}$, je řada $\sum b_k$ divergentní. Protože $a_n \geq 0$, je divergentní i řada $\sum a_n$. **2.4.** viz [5].

Kapitola 3

3.1. a) konverguje b) konverguje c) diverguje d) diverguje e) konverguje
 f) konverguje. **3.2.** a) konverguje neabsolutně b) konverguje absolutně c)
 konverguje neabsolutně d) diverguje e) konverguje absolutně f) konverguje
 absolutně g) konverguje absolutně h) konverguje neabsolutně. **3.3.** a) Pro
 $x > 0$ řada konverguje absolutně, pro $x \leq 0$ řada diverguje. b) Pro $x \in (\frac{1}{e}, e)$
 řada konverguje absolutně, pro ostatní x řada diverguje. c) Pro $|x| < 2$ řada
 konverguje absolutně, pro $|x| > 2$ a $x = 2$ diverguje, pro $x = -2$ konverguje
 neabsolutně. d) Pro $x \geq 0$ řada konverguje absolutně, pro $x < 0$ řada diverguje.

Kapitola 4

4.1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = e^{x+y}$ **4.2.** Cauchyův součin je $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{q^{n+1}} = \frac{1}{(q-1)^2}$, odkud plyne
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{q^n} = \frac{q}{(q-1)^2}$ **4.3.** a) $n = 5$ [Využijte Větu 4.5] b) $n = 7$ [Využijte Větu 4.6]
 c) $n = 5$ [Využijte Větu 4.4] **4.4.** a) $3(n+1)(n+2)(n+3) > 10^4$ b) $\ln n > 10^4$
 c) $\frac{5^n \ln^2 5}{n \ln 5 + 1} > 10^4$.



Výsledky cvičení

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec


Strana 250 z 261

Kapitola 5

5.1. a) ne (neboť $\lim f_n(x) = 0$ a $f_n(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{4}$) b) ano (podle definice) **5.2.** a) $x \in (\frac{1}{e}, e)$ b) $x \in (-2, 2)$ c) $x \in (-\infty, -1) \cup (-\frac{1}{3}, \infty)$. **5.3.** Majorantní řady:
a) $\frac{1}{n^2}$ b) $\frac{1}{n^3}$ c) $\frac{1}{2^n}$ d) $\frac{1}{n^2}$ e) $\frac{1}{n(n+1)}$. f) $\frac{2}{n^2}$ **5.4.** a) – Weierstrassovo kritérium ($\frac{1}{\sqrt[3]{n^4}}$) b) – Weierstrassovo kritérium ($\frac{a^2}{n \ln^2 n}$) c) – Dirichletovo kritérium ($|\sum_{k=1}^n \sin x \sin kx| \leq 2, \{\frac{1}{\sqrt{n+x}}\} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$). **5.5.** $\frac{1-r \cos x}{1-2r \cos x+r^2}$ **5.6.** $\frac{1}{2}$.

Kapitola 6

6.1. a) $r = 1, (-1, 1)$ b) $r = \frac{1}{\sqrt{2}}, (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ c) $r = 1, (-1, 1]$ d) $r = 3, [-3, 3)$ e) $r = \infty$ f) $r = 1, (-1, 1)$ g) $r = 1, (-1, 1)$ h) $r = 1, [-1, 1]$ i) $r = 4, (-4, 4)$ j) $r = \infty$ k) $r = \infty$ **6.2.** a) $\frac{2x}{(1-x)^3}, |x| < 1$ b) $(x+1) \ln(1+x) - x, x \in (-1, 1]$ c) $\arctg x, |x| \leq 1$ d) $\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, |x| < 1$ e) $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, |x| < 1$ f) $\arctg x, |x| \leq 1$ g) $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x}, |x| < 1$ h) $2x \arctg x - \ln(1+x^2), |x| \leq 1$ i) $\ln \frac{1}{1-x}, x \in [-1, 1)$ j) $\frac{1+x}{(1-x)^3}, |x| < 1$. **6.3.** a) $\ln \frac{3}{2}$ b) $\frac{80}{27}$ c) $\frac{128}{343}$. **6.4.** a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(2n)!}$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{4n-2}}{(2n-1)!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ f) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1}$ g) $\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} x^n$ h) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right) x^n$ i) $\ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^4}{192} + \dots$ j) $e \cdot (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} - \dots)$ k) $1 - \frac{n}{2} x^2 + \frac{3n^2 - 2n}{24} x^4 + \dots$ l) $x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2} + \dots + \frac{x^{n+1}}{(n-1)!} + \dots$ m) $x + x^2 + \frac{2x^3}{3!} - \frac{4x^5}{5!} + \dots$ n) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \dots$ **6.5.** a)



Výsledky cvičení

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 251 z 261

$$1 + \frac{3}{2}((x-1) + \frac{1}{2} \frac{(x-1)^2}{2!} - \frac{(x-1)^3}{2 \cdot 3!} + \dots) \quad \text{b) } \frac{1}{3} - \frac{x-3}{9} + \frac{(x-3)^2}{27} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{(x-3)^{n-1}}{3^n} + \dots$$

$$\text{c) } e^{-2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n!} \right) \quad \text{d) } (x-1) - \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3 + \dots + (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n} + \dots$$



Kapitola 7

7.1. a) 0,99984 b) 0,0174524 c) 0,17364 d) 0,9848 e) 0,5235. **7.2.** a) 0,0874 b) 0,017455 c) 1,37 d) 2,74. **7.3.** a) 3,1415 b) 3,141592654. **7.4.** a) 0,778 b) 1,39 c) 2,71828 d) 7,389 e) 0,3678 f) 1,157 g) 2,25 h) 2,0022 i) 4,12 j) 2,09 k) 1,004975 l) 3,017 m) 5,03968. **7.5.** a) 0,693 b) 1,0986 c) 1,6094 d) 2,39 e) 0,7 f) 1,04 g) 0,43 h) 1,58 i) $-0,693$ j) $-0,2$ k) $-0,435$. **7.6.** a) $\frac{1}{3}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $-\frac{7}{12}$ e) -1 f) $\frac{5}{6}$ g) $-\frac{1}{12}$ h) $\frac{1}{3}$ i) $\frac{2}{3}$ j) $-\frac{1}{3}$ k) 0 l) $\frac{1}{60}$. **7.7.** a) $-\frac{1}{x} + \ln|x| + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{2 \cdot 3!} + \dots + \frac{x^n}{n \cdot (n+1)!} + \dots$ $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ b) $x - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} - \frac{x^4}{4^2} + \dots + (-1)^n \frac{x^{(n+1)}}{(n+1)^2} + \dots$ $x \in (-\infty, \infty)$ c) $x + \frac{x^4}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{8 \cdot 7} + \frac{x^{10}}{16 \cdot 10} + \dots$ $x \in [-1, 1]$ d) $1 + \frac{x^5}{2 \cdot 5} + \frac{x^9}{8 \cdot 3} + \frac{5x^{13}}{16 \cdot 13} + \dots$ $x \in (-1, 1)$ e) $x + \frac{x^{10}}{10} + \frac{x^{19}}{19} + \dots + \frac{x^{9n-8}}{9n-8} + \dots$ $x \in [-1, 1)$ f) $\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{4n+3}}{(4n+3)(2n+1)!} + \dots$ $x \in (-\infty, \infty)$. **7.8.** a) 3,518 b) 1,0573 c) 2,834 d) 0,12 e) 0,497 f) 0,905. **7.9.** a) $y = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{19}{12}x^4 + \dots$ b) $y = 1 + 2x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 + \dots$ c) $y = 2 + x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \dots$ d) $y = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots$ **7.10.** a) $y = a_0 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{48}x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{15}x^5 - \frac{1}{100}x^7 + \dots \right)$ b) $y = a_0 \left(1 - \frac{a}{12}x^4 + \frac{a^2}{672}x^8 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{a}{20}x^5 + \frac{a^2}{800}x^9 + \dots \right)$.

Výsledky cvičení

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet


Zavřít

Konec

Strana 252 z 261

Kapitola 8

8.1. $\operatorname{sgn}(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ **8.2.** $f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2-1}$ **8.3.**
 $f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos 2nx}{4n^2-1}$ **8.4.** $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\sin kx}{k}$ **8.5.** $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ **8.6.** $f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}$.
8.7. $f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^2}$. **8.8.** $f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}, \frac{\pi^3}{32}$ **8.9.** $\pi^2 -$
 $-x^2 = \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\cos kx}{k^2}, \frac{\pi^2}{12}, \frac{\pi^2}{6}$ **8.10.** $x = \pi - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}, \frac{\pi}{4}$ **8.11.**
 $|x| = \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{l}$.



Výsledky cvičení

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 253 z 261



Použitá literatura

- [1] Berman G. N.: *Sbornik zadač po kursu matematičeskogo analiza*, Nauka, Moskva, 1971.
- [2] Děmidovič B. P.: *Sbornik zadač i upražněnij po matematičeskomu analizu*, Nauka, Moskva, 1964.
- [3] Došlá Z. – Došlý O.: *Metrické prostory, teorie a příklady*, Masarykova univerzita, Brno, 1996.
- [4] Edwards, C. H.: *The Historical Development of the Calculus*, Springer-Verlag, 1979.
- [5] Fichtengolc G. M. : *Kurs diferencialnogo i integralnogo isčislenija II, III*, Nauka, Moskva, 1966.
- [6] Heck A.: *Introduction to Maple*, Springer-Verlag, New York, 1993.
- [7] Israel R.: *Maple Advisor Database*, <http://www.math.ubc.ca/~israel/advisor/>, 1998.
- [8] Jarník V.: *Diferenciální počet II*, Academia, Praha, 1974.

Použitá literatura

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa


Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 254 z 261

- [9] Jarník V.: *Diferenciální rovnice*, Academia, Praha, 1956.
- [10] Kroutil P.: *Absolutní konvergence číselných řad a řady funkcí*, diplomová práce MU Brno, 1998.
- [11] Kuběna P.: *Nekonečné řady s programem Maple*, diplomová práce MU Brno, 2001.
- [12] Kufner A. – Kadlec J.: *Fourierovy řady*, Academia, Praha, 1969.
- [13] Novák V.: *Diferenciální počet v \mathbb{R}* , skriptum Masarykovy Univerzity, Brno, 1996.
- [14] Novák V.: *Integrální počet v \mathbb{R}* , skriptum Masarykovy Univerzity, Brno, 1996.
- [15] Novák V.: *Nekonečné řady*, skriptum UJEP, Brno, 1981.
- [16] Rovenski V.: *Geometry of Curves and Surfaces with Maple*, Birkhäuser, Boston, 2000.
- [17] Tichonov A. N. – Samarskij A. A.: *Rovnice matematické fyziky*, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1955 (překlad z ruštiny).
- [18] Veselý J.: *Matematická analýza pro učitele*, Matfyzpres Praha, 1997.
- [19] Walz A. F.: *The math package*, <http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/maple/mplmath.htm>, 2001.
- [20] Westermann T.: *Mathematische Begriffe visualisiert mit Maple V*, Springer, Heidelberg, 2000.
- [21] Wright F.: *Computing with Maple*, CRC Press, Boca Raton, 2002.



Použitá literatura

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět


Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 255 z 261



Rejstřík

- Abel, [75](#)
- Achilles, [13](#)
- d'Alembert, [50](#)
- Archimedes, [13](#)

- Bernoulli, [29](#)
- Bessel, [185](#), [200](#)
- Besselova
 - identita, [200](#)
 - nerovnost, [200](#)
- binomická
 - řada, [157](#)
 - věta, [157](#)
- Bolzano, [55](#)

- Cantor, [228](#)
- Cauchy, [55](#)

- derivace
 - mocnné řady, [142](#)
 - posloupnosti funkcí, [120](#)
 - řady funkcí, [123](#)
- diferenciální rovnice, [185](#)
- Dini, [117](#)
- Dirichlet, [75](#)
- Dirichletovo jádro, [210](#)
- divergence
 - číselné řady, [15](#)
 - vybraných řad, [78](#)

- Fourier, [113](#)
- Fourierovy koeficienty, [198](#), [205](#)
- funkce
 - cyklometrická, [175](#)
 - elementární, [181](#)

Rejstřík

[Rejstřík](#)

[Obsah](#)

[Verze k tisku](#)



[Zpět](#)

[Videa](#)

[Dif. počet](#)

[Zavřít](#)

[Konec](#)

Strana **256** z **261**

konečného tvaru, 181
mocninné, 102
po částech monotonní, 209
po částech spojitá, 209
vyšší transcendentní, 181

Grandi, 29

Heine, 228

l'Hospital, 178

integrace

mocninné řady, 141
posloupnosti funkcí, 118
řady funkcí, 122

klip

cvičení – řešené příklady na
konvergenci řad, 243
přednáška – nekonečné číselné
řady, 239
přednáška – nekonečné řady
funkcí, 246

kombinační číslo, 157

konvergence

absolutní, 33, 70
bodová, 102, 104, 107

číselné řady, 15


Fourierovy řady, 209, 227
neabsolutní (relativní), 70
nutná podmínka, 26, 66
podle středu, 201
stejnoměrná, 102, 106, 108,
109, 227

konvergenční interval, 129

kritérium

Abelovo, 75, 76, 112
Cauchyovo-Bolzanovo, 28
Dirichletovo, 75, 112
integrální, 56
Kummerovo, 54
Leibnizovo, 66–69, 93, 96
limitní podílové, 99
limitní Raabeovo, 54, 55, 74
limitní srovnávací, 42
odmocninové, 71
odmocninové (Cauchyovo), 47
podílové, 71, 72
podílové (d'Alembertovo), 50,
55
srovnávací, 41, 47, 71

kritérium stejnoměrné konvergence



Rejstřík

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 257 z 261

Cauchyovo-Bolzanovo pro
posloupnost funkcí, [109](#)
Cauchyovo-Bolzanovo pro řady
funkcí, [110](#)
Dirichletovo a Abelovo, [112](#)
Weierstrassovo, [111](#)
Kummer, [54](#)
kvadratickou odchylka, [198](#)

Leibniz, [29](#)


Maclaurin, [144](#)
Maclaurinův rozvoj
arcsin x , [172](#)
arctg x , [158](#)
tg x , [162](#)
elementárních funkcí, [150](#)
logaritmické funkce, [144](#), [158](#)
Mercator, [165](#)
Moivre, [75](#)

norma funkce, [195](#)
normovaná funkce, [195](#)

obor konvergence
mocninné řady, [129](#)
posloupnosti funkcí, [105](#)

řady funkcí, [105](#)
odhad zbytku
alternující řady, [96](#), [98](#)
číselné řady, [96](#)
řady, [95](#), [97](#), [98](#)
Oresme, [27](#), [34](#)
ortogonalita
systému funkcí, [194](#)
trigonometrického systému,
[203](#)
ortogonální funkce, [195](#)

Parsevalova rovnost, [201](#)
periodická funkce, [209](#)
poloměr konvergence, [129](#)
posloupnost funkcí, [102](#)
bodově konvergentní, [102](#), [107](#)
neklesající, [112](#)
nerostoucí, [112](#)
ortogonální, [196](#)
ortonormální, [196](#)
stejněměrně konvergentní, [106](#),
[108](#)
stejněměrně ohraničená, [112](#)
princip lokalizace, [210](#)
přerovnění řady, [77](#), [79](#)



Rejstřík

[Rejstřík](#)

[Obsah](#)

[Verze k tisku](#)



[Zpět](#)

[Videa](#)

[Dif. počet](#)

[Zavřít](#)

[Konec](#)

Strana **258** z **261**

přibližný výpočet

čísla π , [174](#)

integrálů, [181](#)

logaritmů, [176](#)

odmocnin, [171](#)

příkazy Maplu

AnimGrafFourierFce, [218](#),
[222](#), [233](#)

AnimR, [114](#)

ClenyFourierRady, [217](#), [218](#)

convert, [19](#)

CSsoucetR, [113](#)

csum, [46](#), [58](#), [131](#)

display, [223](#)

four, [215](#)

geom, [37](#)

kvocgeom, [37](#)

limraabk, [62](#)

limsrovk, [46](#)

Period, [216](#)

Polomer, [132](#), [136](#)

poslcass, [19](#)

preskl, [81](#), [82](#)

PSconv, [134](#), [136](#), [137](#)

rieman, [81](#), [82](#)

sierpkob, [36](#)

sum, [20](#), [37](#)

sumplots, [20](#)

taylor, [153](#)

TaylorAnimat, [155](#)

TaylorAnimat2, [155](#)

TaylorPol, [153](#)

Tplots, [154](#)

TRada, [153](#)

Raabe, [54](#), [55](#)

Riemann, [183](#)

rozšíření funkce

liché, [207](#)

periodické, [209](#)

sudé, [207](#)

řada

absolutně konvergentní, [70](#)

alternující, [66](#), [96](#)

binomická, [157](#)

číselná, [15](#)

divergentní, [15](#)


Fourierova, [113](#), [198](#), [205](#)

funkcí, [101](#), [104](#)

geometrická, [16](#), [158](#), [165](#)

Grandiho, [29](#)

harmonická, [26](#)



Rejstřík

[Rejstřík](#)

[Obsah](#)

[Verze k tisku](#)



[Zpět](#)

[Videa](#)

[Dif. počet](#)

[Zavřít](#)

[Konec](#)

Strana **259** z **261**

konvergentní, 15
kosinová, 207
Leibnizova, 67, 98
Maclaurinova, 148
mocninná, 128, 165
 stejněměrná konvergence,
 140
neabsolutně konvergentní, 70
oscilující, 15
sinová, 207
Taylorova, 147, 148
trigonometrická, 194
určitě divergentní, 15
vzniklá přerovnáním, 77, 79

řada funkcí
 bodově konvergentní, 104
 stejněměrně konvergentní, 109

Sierpińského koberec, 35
Sierpiński, 35
skalární součin funkcí, 195
součet
 číselné řady, 15
 dvou řad, 30
 mocninné řady, 140
 řady funkcí, 101, 104

Taylorovy řady, 148
součin řad, 89
 absolutně konvergentních, 90
 Cauchyův, 92–94, 99, 100
 Dirichletův, 91–93

spojitost
 limitní funkce, 117
 součtu řady funkcí, 122


Swineshead, 14

Taylorův
 polynom, 147, 152, 153
 zbytek, 148

trigonometrický polynom, 194

věta
 Abelova, 144
 Diniho, 117
 Dirichletova, 209
 Heineho-Cantorova, 228
 Mertensova, 93
 Moivreova, 75
 Riemannova, 79
 Taylorova, 147

videonahrávky, 11
 klip1, 239
 klip2, 243



Rejstřík

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 260 z 261

klip3, 246

Weierstrass, 111

zákon

asociativní, 32


distributivní, 30, 88

komutativní, 65, 77, 78

o sdružení, 32

pro pedagogy, 64

Zenon z Eleje, 13



Rejstřík

Rejstřík

Obsah

Verze k tisku



Zpět

Videa

Dif. počet

Zavřít

Konec

Strana 261 z 261