


### Šroubovice

Stoupání - 5,4 Å/závit


1,5 Å / zbytek

### Skládaný list

3,25 resp. 3,47 Å / zbytek pro paralelní resp. antiparalelní




Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e  
Figure 6.10




$\beta$ -ohyb – můstek z CO na NH - 3 zbytky dopředu  
výhodný u glycinu a prolinu

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e  
Figure 6.12




# Predikce sekundární struktury

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e  
Figure 6.39




Saunders College Publishing



**TABLE 3.1** Hydrophathy scale for amino acid residues


<b>Amino acid</b>	<b>Free-energy change for transfer (kJ mol<sup>-1</sup>)</b>
Isoleucine	3.1
Phenylalanine	2.5
Valine	2.3
Leucine	2.2
Methionine	1.1
Tryptophan	1.5 <sup>b</sup>
Alanine	1.0
Glycine	0.67
Cysteine	0.17
Tyrosine	0.08
Proline	-0.29
Threonine	-0.75
Serine	-1.1
Histidine	-1.7
Glutamate	-2.6
Asparagine	-2.7
Glutamine	-2.9
Aspartate	-3.0
Lysine	-4.6
Arginine	-7.5

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e  
Figure 5.7



Saunders College Publishing

Typy struktur



RNasa