

METABOLISMUS POLYSACCHARIDŮ


Katabolismus

Z této široké skupiny látek se budeme zabývat především zásobními polysacharidy škroblem a glykogenem a některými významnými disacharidy. Jejich **degradace** spočívá ve štěpení glykosidické vazby, s výjimkou fosforolýzy glykogenu je to obecně hydrolýza. Zúčastněné enzymy patří tedy do skupiny hydroláz, podskupiny C-O hydroláz a podpodskupiny glykosidáz.

Hydrolýza škrobu je katalyzována řadou enzymů označovaných jako **amylázy**. Je to široká skupina enzymů lišících se způsobem hydrolýzy a výslednými produkty. Tak α -amylázy (název získaly podle konfigurace hydrolýzou vzniklého poloacetalového hydroxylu) štěpí glykosidické vazby uvnitř molekuly škrobu za vzniku kratších oligosacharidů o několika desítkách glukosových jednotek zv. dextriny. Jsou proto též (zejména v technologické oblasti) nazývány **dextrogenními** amylázami. β -amylázy zase odštěpují od konce oligosacharidového řetězce disacharid maltosu. Tyto jsou označovány jako **sacharogenní**, neboť produkují redukující a metabolizovatelný produkt. Vedle nich nacházíme málo aktivní glukoamylasy odštěpující glukosové zbytky z oligosacharidů. Glukosa je též produktem působením maltáz na maltosu.

Z metabolického hlediska jsou amylasy důležitými trávicími enzymy (i ve smyslu štěpení škrobu v rostlinách event. mikroorganismy). Vedle toho je třeba zmínit jejich významnou roli v mnoha technologických oborech, především potravinářském průmyslu a fermentačních biotechnologiích.

Degradace glykogenu v potravě se děje podobně jako u škrobu působením glukosidáz, tento pochod je však vzhledem k jeho malému zastoupení málo významný. Naproti tomu nitrobuněčná degradace glykogenu je podstatně odlišná a její mechanismus spočívá ve fosforolytickém štěpení glykosidické vazby. Katalysuje ho enzym fosforyláza glykogenu, která pomocí anorganického fosfátu odštěpuje koncovou glukosu polysacharidového řetězce za produkce glukosa-1-fosfátu (Glc1P):








Schéma štěpení glykogenu, vedle fosforylázy jsou naznačena i místa působení tzv. odvětvovacích enzymů.

Tento způsob štěpení glykogenu znamená úsporu energie, neboť glukosa vstupuje do dalších metabolických pochodů jako fosforečný ester – viz dále.

Fosforylázková reakce je výchozím pochodem mobilisace sacharidových energetických rezerv buňky a dochází k ní zejména v čase potřeby zvýšeného příslušného energie (stres, námaha atd.) Je proto regulována změnou aktivity klíčového enzymu, k jeho aktivaci dochází působením adrenalinu. Proces je několikastupňový a schematicky je naznačen na následujícím obrázku:



Adrenalin (=epinefrin) se naváže na membránový receptor a do buňky sám nevstupuje. Tato interakce prostřednictvím konformačních změn bílkovinného komplexu (patří mezi tzv. G-proteiny pro účast GTP v těchto pochodech) aktivuje membránový enzym adenylátkinázu katalysující produkci cyklického AMP (vlastní nitrobeněčný efektor, tento způsob regulace se nazývá mechanismus „druhého posla“ – viz kap. o hormonech):




cAMP pak zahajuje kaskádu aktivačních pochodů vazbou na regulační podjednotku proteinkinázy, která předtím blokovala aktivitu katalytické podjednotky C. Pochod pokračuje 2 stupni aktivace enzymů pomocí jejich fosforylace a poslední – aktivní fosforyláza efektivně štěpí glykogen. Kaskádové uspořádání zesiluje primární signál, vyváženosti systému je dosaženo protichůdným působením fosfatáz inaktivujících zúčastněné enzymy.

Ze strukturních polysacharidů zmíníme pouze celulosu.

Z **disacharidů** byla již zmíněna hydrolyza maltosy maltasou, dalšími významnými disacharydy jsou sacharosa a laktosa.

První z nich je hydrolyzována sacharasami, které mají širší specifitu vůči fruktosidům (odtud fruktofuranosidasy), produktem hydrolyzy je směs fruktosy a glukosy, tzv. invertní cukr, proto jsou tyto enzymy nazývány též invertasami.


Mléčný cukr laktosa je významným zdrojem energie pro mláďata savců. Jeho využití je podmíněno jeho hydrolyzou pomocí laktasy, která vykazuje specifitu vůči β -galatosidům (název β -galatosidasa). Produktem hydrolyzy je směs glukosy a galaktosy. Aktivita tohoto enzymu s věkem klesá (též v závislosti na lidské rase) a způsobuje problémy s využitím laktosy (možná náhrada).




Anabolismus

Syntéza polysacharidů vyžaduje kromě stavebních jednotek energii, proto do reakcí vstupují příslušné monosacharidy vázány na UDP. Podrobněji zde popíšeme syntézu glykogenu, jiné polysacharidy i disacharidy vznikají obdobně.


Syntéza glykogenu začíná navázáním glukosové jednotky na nosnou bílkovinu glycogenin. Ta je přenesena transglykosidázou z UDP-Glc na Tyr bílkoviny:




Následuje prodlužování polysacharidového mechanismem transglykosidace pomocí UDP-Glc - glykogentransglykosidázy




Dalším procesem je větvení molekuly pomocí tzv „větvícího enzymu“ amylo- α -1,4 → 1,6-transglykosidázy. Ten po dosažení určité délky lineárního řetězce přenese jeho část na jeden z hydroxylů na C6 v předcházejícím úseku:



Molekula glykogenu je tak mnohonásobně větvena dalšími přenosy



až dosáhne typické keříčkovité struktury.



(b)

