



Centrum pro výzkum
toxických látek
v prostředí

Techniky pro ošetření sedimentů a problematika sedimentů



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenční
schopnost



UNIVERSITAS
MASARYKIANA BRUNENSIS

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Proč ošetřování a odstraňování SEDIMENTŮ?

Sedimenty jsou v trofizovaných nádržích zdrojem:



**Živin
Organických látek (kyslíkových deficitů)
Inokula sinic**




Centrum pro výzkum
toxických látek
v prostředí

Možnosti ošetření sedimentů


- Mechanické
 - těžba na sucho
 - Těžba sacími bagry
 - Překrývání inertními materiály, příp. sorbenty a kompozity (volné, v rohožích atd.)
- Chemické
 - Oxidace dusičnanů
 - Klasická, nebo difúzní aerace vzduchem (příp.s příměsi kyslíku, ozonu)
 - Srážení fosforu (Fe,Al.)
- Biologické
 - Podpora přirozené aktivity mikroorganismů
 - Bioaugmentace




Odsávání sedimentu



Těžba sedimentu




Srážení síranem hlinitým




Aplikace hydroxidu železa

Ošetření hydroxyoxidem železa



Ošetření chloridem železitým





Srážení trojmocným železem



Provzdušňování

Rozptýlené provzdušňování




Zařízení HYPOX




Centrum pro výzkum
toxicitkých látek
v prostředí

Difúzní mikroaerace


- Čím větší je povrch bublinek, tím je účinnější přestup kyslíku do vody
- bublina o průměru 20mm má objem 4.19 cm³ a povrch 12.6 cm².
- Z této velké bubliny můžeme udělat 296 jemných bublinek, každá o průměru 3mm. Tyto jemné bublinky budou mít celkovou plochu 83.6 cm².
- To je 6.6-krát větší plocha!!!
- Malá bublinka stoupá pomaleji



Provzdušňování – účinná technika




Provzdušňování hypolimnia



Södra Hörken, Švédsko



Ošetření sedimentu



Bioaugmentace in situ?

Možnosti:

Patentované kultury

Smesné mikrobiální preparáty

Probiotické kompozice s enzymy a živinami

Podpora nativních bakterií živinami a aerací




„Brno – City in the Centre of Europe
Fireworks Competition – Harmony of the
light and music“

Brněnská přehrada

(294 ha, 17 mil m³, max. hl. 18 m,
přítok 8 m³/s),

2,8 mil. m³ sedimentů

toxic cyanobacterial bloom (from June
to half of October) more than 15 years



Centrum pro výzkum
toxických látek
v prostředí

Integrované hodnocení sedimentů

Nutnost provést integrované hodnocení sedimentů:

- Kvantifikace a mapa dna
- Chemické analýzy
- Ekotoxikologické analýzy
- Kvantifikace infekceschopného inokula

Rozhodnout:

- Prioritní oblasti pro těžbu, ošetření a konzervaci sedimentů
- Možnosti nakládání se sedimenty



Sampling and analyses of sediments:

- 140 points to measure sediment thickness and describe quality
- 43 samples were taken for:

Chemical analysis:

- total N, P, org. C
- heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
- non-polar extractable substances,
- chlorinated pesticides (HCB, SDDT, p,p'-DDT, p,p'-DDD, p,p'-DDE, SHCH, a-HCH, b-HCH, g-HCH)
- PCB (SPCB and PCB 28, 62, 101, 118, 138, 153, 180)
- PAHs (SPAH, dibenz(ah)antracen, indeno(123cd)pyren, benzo(a)pyren, benzo(k)fluoranten, benzo(b)fluoranten, chrysen, benz(a)antracen, pyren, fluoranten, antracen, fenantren, naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren)
- radioactive isotopes (^{126}Ra , ^{128}Ra , ^{137}Cs , ^{4}K) (chosen because of uranium mining until 1965)

Biological analysis and ecotoxicological biotests:

- quantification of cyanobacterial inoculum
- Inhibition of growth of *Sinapis alba* root and biomarkers of oxidative stress
- Mortality of *Tubifex tubifex* and biomarkers of oxidative stress
- Inhibition of growth *Pseudomonas putida*



Výsledky

Prakticky žádná ekotoxicita, ani radioaktivita,

Vysoký obsah živin


Vysoký objem sedimentů (2,8mil. m³)



Těžba, nebo biologické ošetření je možné !



Výsledky




Centrum pro výzkum
toxických látek
v prostředí

Kvantifikace inokula cyanobakterií v sedimentech nádrže




Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí




Výsledky

High content of primary nutrients



Výsledky



Generally no significant ecotoxicity (only in sporadic samples)





Výsledky

Content of contaminants – not high


Limits are presented according to Methodical recommendation of Ministry of the Environment of the Czech Republic 8/1996




Kovy



Statistical evaluation of analytical chemistry, ecotoxicological bioassays and biomarkers I.



Statistical evaluation of analytical chemistry, ecotoxicological bioassays and biomarkers II.



Krásná věda, ale co s tím???

Možnosti :



- snížit hladinu o 8-9m a nechat přes léto letnit a za sucha odvodněné sedimenty vyhrnout
- hluboké části odtěžit sacím bagrem (nejvíce org. látek, nejvíce inokula sinic!!!)
- aerace + mineralizace in situ!!!**



Reálný objem k těžení či ošetření je 1,78 milionů m³... Zbytek ponechat



Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí

Zároveň s projekty na ošetření sedimentů realizovat preventivní opatření!!!




Centrum pro výzkum
toxicitkých látek
v prostředí

Prevence transportu živin:

12 nových ČOV a 17 rekonstrukcí s terciálním dočištění v povodí nad nádrží



Konstrukce přednádrží



Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí

Protierozní opatření - Změny v užívání krajiny

Návrh revitalizace toků

Zranitelné oblasti – přikázané způsoby hospodaření dle NV 103/2003 Sb


Studie protierozní ochrany v prostoru před vtokem do brněnské přehrady

Studie protierozní ochrany v prostoru před vtokem do vodní nádrže Vír

Hranice zájmového území



Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí



Definice oblastí citlivých k erozi v citlivých oblastech konstrukce protierozních bariér

- Zahájení KPÚ
- Realizace navržených protierozních opatření ve schválených KPÚ
- Protierozní opatření a delimitace kultur na ohrožených půdách
- Hranice zájmového území



Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí



Závěr:

- Sedimenty jsou klíčovým parametrem v procesu obnovy nádrže a povodí
- Kumulují živiny a inokulum sinic
- Řešení je finančně a odborně náročné
- Nutná volba prioritních lokalit
- Sedimenty má smyl řešit až poté, když je omezen přísun živin a částic z povodí nad nádrží.....prevence!!!





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace tohoto předmětu je spolufinancována
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky



Centrum pro výzkum
toxicických látek
v prostředí