

**legenda:**

- M – mykorhizní houba
- S – saprofytická houba
- P – parazitická houba
- B – po zmáčknutí/ škrábnutí/ řezání mění Barvu
- H – hydrofágní = nasává vodu (za mokra je tmavší barva)
- VP- výtrusní prach

**Seznam hub nalezených v areálu Řečkovic dne 18.9.2013 + stručné poznámky k nim**

- Holubinka akvamarínová (*Russula chloroides*) M  
/holubinky: chuťově hořké nebo palčivé nesbírejte - jsou nejedlé, jinak jsou jedlé
- Vláknička Godeyova (*Inocybe godeyi*) M  
/páchne jako hermelín, VP je šedo-hnědý a od toho jsou zbarveny i lupeny,  
/obsahuje muskarin – Jedovaté!
- Líha (*Lyophyllum*) S  
/“obskurní“, bílý VP, mnohé voní jako čerstvě pomletá mouka, B
- Čírůvka šedožemlová (*Tricholoma scalpturatum*) M  
/vykrojené lupeny (= lupeny se před třenem sužují), B- žlutne, jedlá
- Holubinka parková (*Russula pulchella*) M - pod břízami  
/krémové lupeny, B – třen černá, vybledává klobouk (mladá je růžovo-červená, později vybledne do bíla až světle zelená), chuťově palčivá – nejedlá
- Kropenatec otavní (*Panaeolina foenicisii*) S - na trávách  
/H, nerovnoměrné dozrávání výtrusů
- Vláknička hořkomandlová (*Inocybe hirtella*) M  
/žlutá, smrdí po marcipánu
- Líha nahloučená (*Lyophyllum decastes*) S  
/výskyt v trsech, jedlá
- Hnojník (*Coprinus*)... (hrozně moc druhů) M  
/černohnědý VP, autolýza (= houba se sama rozpustí na tekutinu s výtrusy)
- Hnojník řasnatý (*Coprinus/Parasola plicatilis*) S
- Mechovka obecná  
/zbláhavé lupeny, klobouk bílý, lupeny pletově růžové, jako hermelín vypadá i voní, roste při hříbech, jedlá
- Muchomůrka šiškovitá (*Amanita strobiliformis*) M  
/bíla barva, prsten a šupinky na třeni, výskyt: dubo-habřiny a parky, je vzácnější, bez „kulovitého“ zakončení a bez pochvy (muchomůrka zelená to všechno má)
- Čechratka podvinutá (*Paxillus involutus*) M

/lupeny jdou hezky oddělit od dužniny klobouku, příbuzná s hříby, měkká, B- hnědne, Smrtelně JEDOVATÁ!!! - ne nevyhnutně napoprvé, - tehdy se ti vytvoří protilátky a při druhém požití ti ty protilátky zaútočí na krvinky a zemřeš na imunitní reakci

- Ryzec pýřitý (*Lactarius pubescens*) M  
/chlupatý (šupinatý) okraj klobouku, bílé mléko, nejedlý
- Kozák březový (*Leccinum scabrum*) M  
/černo-šedé šupinky na třeni, B -rezaví, tmavohnědý klobouk, jedlý – výborný
- Špička větevná (*Marasmiellus ramealis*) S  
/(ta miniaturní)
- Ryzec osikový (*Lactarius controversus*) M – topole, osiky, (vrby)  
/ bez šupin na okraji klobouku, bílé mléko, palčivý – nejedlý
- Křehutka (*Psathyrella*) S  
/H, příbuzné hnojníkům, tmavý VP, není rýhovaná ale vypadá tak protože jí prosvítají lupeny
- Pečárka polní (*Agaricus campestris*) S  
/volné lupeny, jedlá
- Pečárka zápašná (*Agaricus xanthoderma*) S  
/B- žloutne (jedlá to nedělá), nejedlá (jedlá jen pro někoho, ale radši nezkoušet pokud nechcete blít).
- Pečárka lesní (*Agaricus silvaticus*) S
- Pečárka ovčí (*Agaricus arvensis*) S  
/ po rozkrojení voní hezky po anízu
- Klouzek sličný (*Suillus grevillei*) M  
/B, jedlý (ale nevhodný k sušení)
- Helmovka jesenní (*Mycena avenacea*) S  
/zbarvené hrany lupenů do hněda > cystidy - neplodné buňky
- Třepenitka svazčitá (*Hypholoma fasciculare*) S  
/ trsnatá, zářivě žlutá, VP je purpurově tmavý, používá se na barvení vlny, nejedlá - mírně jedovatá
- Slzečník žlutkový (*Bolbitius vitellinus*) S
- Plešivka (pýchavka) dlabaná (*Calvatia utriformis*) S  
/pastviny
- Špička obecná (*Marasmius oreades*) S  
/gumený pevný třen, aroma (vylučuje kyanovodík), jedlá
- Penízečka drobnovýtrusá (*Baeospora myosura*) S  
/roste na šiškách

- Lžičkovec šiškový (*Auriscalpium vulgare*) S  
/ostnatý hymenofor, roste na borových šiškách
- Bedlička hřebenitá (*Lepiota cristata*) S
- Vláknička pomíchaná (*Inocybe mixtilis*) M  
/má kuličku jako zakončení třenu
- Hřib koloděj (*Boletus luridus*) M  
/B – modrá, má žluto-oranžový klobouk, rourky oranžovo-červené, plastická síť na třeni, příbuzný satanovi, jedlý (jenom po tepelné úpravě – vařením se ničí toxicita)
- Březovník obecný (*Piptoporus betulinus*) P  
/ patří do skupiny tzv „chorošů“