

legenda:

- M – mykorhizní houba
- S – saprofytická houba
- P – parazitická houba
- B – po zmáčknutí/ škrábnutí/ řezání mění Barvu
- H – hygrofánní = nasává vodu (za mokra je tmavší barva)
- VP – výtrusný prach

Seznam hub nalezených v areálu Řečkovic dne 25.9.2013 + stručné poznámky k nim

- Křehutka Candolleova (*Psathyrella candolleana*) S (na zbytcích dřeva)
/ bílý třeň, tmavé lupeny, bílo-šedý nafialovělý klobouk, roste na podzim hojná, v skupinkách, jedlá, H
- Křehutka vodomilná (*Psathyrella piluliformis*) S
/ šedé velum na okraji klobouka
- Hnojník inkoustový (*Coprinus atramentarius*) S
/ autolýza, trsy, černý VP, jedlý ale min. 2 dni před a po konzumaci se nesmí pít alkohol!!!
- Hnojník třpytivý (*Coprinus micaceus*) S
/ autolýza, bělavá zrníčka vlna (třpytivý efekt)
- Hnojník domácí (*Coprinus domesticus*) S
/ autolýza
- Kržatka zimní (*Tubaria hiemalis*) S
/ ryšavý VP, oranžová, zbytky vlna na klobouku
- Slzivka (*Hebeloma*) M (topol, křoviny)
/ za mokra slizká, hnědý VP, vláknitý vločkatý třeň, celkově hnědé nenápadné, nejedlé, vůně sladká kakaovo - skleповá
- Ryzec osikový (*Lactarius controversus*) M
/ bílé mléko, bílý celkově, růžové lupeny, nejedlý
- Ryzec šeredný (*Lactarius turpis*) M (smrky, břízy)
/ bílé mléko, pálí (karcinogenní), na třeni zelené skvrnky - „dubky“, jedovatý!
- Ryzec syrovátkový (*Lactarius serifluus*) M
/ mléko řídké, suchý voní jako maggi, nejedlý
- Ryzec klamný (*Lactarius decipiens*) M
/ bílé mléko po chvíli zežloutne
- Křemenáč osikový (*Leccinum rufum*) M (osiky, břízy)
/ bílé šupinky na třeni
- Helmovka tuhonohá (*Mycena galericulata*) M
/ třeň „kořenující“ tuhý, moučné aroma, klobouky jedlé

- Helmovka rýhonohá (*Mycena galericulata*) S
- Helmovka růžová (*Mycena rosea*) S
- Hlízenka ovocná (*Monilia fructigena*)
/ kruhy teček na jablkách
- Líha nahloučená (*Lyophyllum decastes*) S
/ parky, cesty, bílý VP, jedlá
- Holubinka révová/ slanečková (*Russula xerampelina/graveolens*) M (listnaté)
/B- žlutne až hnědne, smrdí jako mořské ryby, jedlá, test: modrá se zelenou skalicí
- Holubinka měnlivá (*Russula rissigalina*) M
/ naše nejmenší, jedlá
- Holubinka křehká (*Russula fragilis*) M
/ lupeny mají zubaté ostří, vůně – kokos, chuť jako čilli – pálí, nejedlá
- Holubinka olivová (*Russula olivacea*) M
/ narůžovělý třeň, jedlá
- Holubinka sličná (*Russula lepida*) M
/ tvrdá, červená
- Holubinka černající (*Russula nigricans*) M
/ řídké lupeny, B -černá, jedlá ale nic moc, na jaře se dají nalézt „mumie“ této houby
- Čirůvka bílá (*Tricholoma album*) M
/ bílé lupeny, v mládí klobouk bílý - pak hnědne, hořká, smrdí, nejedlá
- Čirůvka sírožlutá (*Tricholoma sulphureum*) M
/ strašně žlutá, smrdí, jedovatá
- Penízovka dubová (*Gymnopus dryophilus*) S
/ v skupinách, dělá „čarodějné kruhy“, jedlá
- Slizečka ocasatá (*Xerula radicata*) S
/ jedlá, velice dlouhý třeň
- Muchomůrka citronová (*Amanita citrina*) M
/ citronově žlutá se zbytky vela na klobouku, pochva, mírně jedovatá – bufotenin (trochu i halucinogenní)
- Muchomůrka zelená (*Amanita phalloides*) M
/ chabý prsten, olivová (ale má i bílou formu), lupeny bílé, pochva, selhávají z ní játra, jedovatá!
- Vláknička zemní (*Inocybe geophylla*) M
/ 2 variety: bílá a fialová – většinou se vyskytují spolu, obsahují muskarin, jedovaté!
/ bílá – hnědé lupeny, smrdí

- Vlákniče kuželovitá (*Inocybe rimosa*) M
/ smrdí, jedovatá
 - Vlákniče Bongardova (*Inocybe bongardii*) M
/ voní sladce
- (některé vlákniče obsahují také psilocybin - halucinogenní)
- Řasnatka síromléčná (*Peziza succosa*) M
/ roní žluté mléko
 - Pavučinec (*Cortinarius*) M
/ rezavý VP, „pavučina“
 - Štítovka jelení (*Pluteus cervinus*) S
/ volné růžové lupeny, páchne jako brambory ve sklepě, jedlá ale nechutná, roste na dřevě co je pod zemí
 - Voskovička plodová (*Hymenoscyphus fructigenus*) S
 - Hrotnatka zápašná (*Sarcodontia crocea*) P
/ na starých jabloních, smrdí, sírově žlutá
 - Lakovka obecná (*Laccaria laccata*) M
/ růžově- oranžové lupeny, bílý až bezbarvý VP, jedlá
 - Štítovka hlížečkatá (*Pluteus semibulbosus*) S
/ H
 - Třepenitka svazčitá (*Hypholoma fasciculare*) S
/ trsy na dřevě
 - Strmělka anýzka (*Clitocybe odora*) S
/ sbíhavé lupeny, zelenavě bílá, jedlá
 - Bedla vysoká (*Macrolepiota procera*) S
/ Velice jedlá
 - Bedlička vlnatá (*Lepiota clypeolaria*) S
/ jedovatá

„Klackomycety“

- Troudnatec kopytovitý (*Fomes fomentarius*) PS
/ póry světle šedé, bílý VP, víceletá houba, na dřevě listnatých stromů
- Pevník plstnatý (*Stereum subtomentosum*) S
/ pevné, jako velice placatý troudnatec, B- žlutne
- Pevník chlupatý (*Stereum hirsutum*) S
/ „super- běžná“ houba
- Hlinák červenající (*Hapalopilus rutilans*) S

/ B- tmavne, odumírající listnáče, jedovatý

- Outkovka hrbatá (*Trametes gibbosa*) S
/ 1 letá, tuhá, bílá, „hrb“

- Smolokorka buková (*Ischnoderma resinosum*) S

„Břichatky“

- Pýchavka obecná (*Lycoperdon perlatum*) S

/ ostny odpadávají – ostávají po nich areoly - „dolíčky“, za mlada- bílá je jedlá

- Pýchavka ježatá (*L.echinatum*) S

- Pýchavka hruškovitá (*L. pyriforme*) S

/ bílé rhizomorfy, roste na dřevě

- Pestřec bradavčitý (*Scleroderma verrucosum*)

M

/ má jakoby třeň, nejedlý!

- Číšenka rýhovaná (*Cyathus striatus*) S

/ má uvnitř „penízky“ - peridioly