

legenda:

- M – mykorhyzní houba
- S – saprofytická houba
- P – parazitická houba
- B – po zmáčknutí/ škrábnutí/ řezání mění Barvu
- H – hygrofánní = nasává vodu (za mokra je tmavší barva)
- VP- výtrusní prach

Seznam hub nalezených v Řečkovících – Mokrá hora? dne 23.10.2013 + stručné poznámky**Řád: Russulales**

- Ryzec osmahlý /*Lactarius quieticolor*
/ oranžové mléko, jedlý
- Ryzec šeredný /*Lactarius turbis*
/ hnusně smrdí, bílé mléko, olivový odstín houby
- Ryzec syrovátkový /*Lactarius serifluus*
/vodnaté mléko, nejedlý
- Ryzec žlutohnědý /*Lactarius fluvissimus*
/bílé mléko, nejedlý
- Ryzec klamný /*Lactarius decipiens*
/mléko prvně bílé, pak ale zežloutne – zkoušet na papíře, nejedlý
- Pevník chlupatý /*Stereum hirsutum*
/ barevný, s viditelnými „vrstvami“, plyšový na dotek
- Lžičkovec šiškový /*Auriscalpium vulgare*
/ roste na opadlých šiškách, klobouk ledvinovitý, třeň nemá napojen ve středě ale víc na boku, ze spoda má ostny, v mládí bleďohnědý, pak tmavne, nejedlý

Řád: Boletales

- Pestřec bradavčitý /*Scleroderma verrucosum*
/ ostře páchne, má kořenující nohu, nepravidelně poraskaný vzor na vrchu, jedovatý
- Lištička pomerančová /*Hygrophoropsis aurantiaca*
- Suchohřib sametový (Podzimní babka) /*Xerocomus purinatus*
- Hřib hnědý /*Boletus badius*
/okrový třeň, Hnědý klobouk, bledé rourky, jedlý
- Hřib žlutomasý /*Boletus chrysenteron* „Babka“
/třeň do ruda, klobouk hnědý rozpraskaný, rourky žluté, jedlý

Hřib žlutomasý neboli babka či praskáč způsobuje rakovinu! Nedávné šokující tvrzení mykologa a autora houbařských atlasů Jiřího Baiera pořádně nadzvedlo českou houbařskou populaci. Jak to tedy je?
„Lidé si neuvědomují, že babky mají na rozpraskaném povrchu parazita, takzvaného nedohuba (mikroskopická plíseň – pozn. red.),“ řekl nedávno v Českém rozhlasu Jiří Baier a šokoval dále: „My to v mykologické společnosti víme asi 40 let, ale ono je potřeba, aby se populace přece jen zmenšila. Do atlasů hub jsme to nepsali. Úmyslně. **Aby dost lidí vymřelo.**“

Řád: Polyporales

- Síťkovec načervenalý /*Daedaleopsis confragosa*
/ zvrchu rovný, ze spoda síťovitý vzor
- Bělochoroš modravý /*Postia caesia*
/bílo-modrý, B -modrá
- Outkovka pestrá /*Trametes versicolor*

Řád: Hypocreales

- Nedohub zlatovýtrusný /*Hypomyces chrysospermus*
/roste na houbách, zlatožluté pomočení

Řád: Xylariales

- Dřevnatka parohatá /*Xylaria hypoxylon*
/parohovitě rozvětvené tuhé černé stromata, v létě a na podzim jsou na koncích bílé od tvořících se konidií, roste na roskládajícím se dřevě listnáčů, nejedlá

Řád: Auriculariales

- Boltcovitka - ucho Jidášovo /*Auricularia auricula - judae*
/roste na baze a jasanu, hnědé, velice pružné, jedlé (i za syrova)
- Černorosol uťatý /*Exidia truncata*
/ na dřevě, vypadá jak gumený trus, nejedlý

Řád: Hymenochaetales

- Ohňovec statný /*Phellinius robustus*
/v mládí je hlízovitý, později kopytovitý, bokem přirostlý k substrátu. Povrch klobouku je široce pásovaný, v mládí má rezavou barvu, později šedohnědou až téměř černou, někdy je porostlý řasami, přirůstající okraj je oblý, rezavý. Rourky jsou vrstevnaté, žlutohnědé, s drobnými žlutohnědými až tmavě hnědými póry. Dužnina je tvrdá, dřevnatá, rezavě světle hnědá. Výtrusný prach je bílý, výtrusy bezbarvé

Řád: Pleosporales

- Strupatka jabloňová /*Venturia inaequalis*

Řád: Thelephorales

- Plesňák zemní /*Thelephora terrestris*
/roste na kyselých půdách

Řád: Agaricales

- Helmovka slizká /*Mycena epipterygia*
/ žlutý, za vlhka slizký třeň, klobouček bílý, drobná houba
- Helmovka krvavá /*Mycena sanguinolenta*
/načervenalá
- Helmovka zlatobřítá /*Mycena aurantiomarginata*
/velice-oranžová ze spoda klobouku
- Helmovka rýhonohá /*Mycena polygramma*
/ rýhovaný třeň pod kloboučkem, šedavá barva, rýhovaný špičatý klobouk

- Helmovka mléčná /*Mycena galopus*
/ po poranění vytéká z báze třeně mléko
- Helmovka šedolupenná /*Mycena aetites*
- Lysohlávka tajemná = česká = moravská = srbská /*Psilocybe bohemica = moravia = serbica* S
/ B – zeleno-modrá, hnědý VP, roste po prvních mrazech na rozkládajících se větvičkách, H
- Lakovka ametystová /*Laccaria amethystina*
/fialová houba, jedlá, patří k houbám se schopností výrazně koncentrovat z prostředí arzen a cezium
- Václavka smrková /*Armillaria ostoyae*
/ šupinkatá hnědo-oranžová houba s prstenem, jedlá
- Šťavnatka tečkovaná /*Hygrophorus pustulatus*
/šedý klobouk s tmavšími šupinkami – tečkami, lupeny bílé, tlusté a řídké, jedlá
- Šťavnatka drvopleňová /*Hygrophorus cossus*
/ roste pod dubmi, páchne kyselé jak housenka motýla drvopleňového
- Šupinovka šedohlínová /*Pholiota lenta*
/za mokra tlustá vrstva slizu (to se pozná za sucha tak, že na klobouku jsou přilepeny nečistoty), zbytky pavučinkového vela na třeni
- Čepičatka jehličnanová /*Galerina marginata*
/ryšavý VP, obsahuje amanitin = Jedovatá !
- Strmělka mlženka /*Clitocybe nebularis*
/špinavě bílá, vyzerá jak oplesnivělá ale není, páchne zvláště, jedlá
- Cystidovka rybovonná /*Macrocystidia cucumis*
/páchne jako syrová ryba -kapr
- Pavučinec polokrvavý /*Cortinarius semisanguineus*
- Pavučinec sivonohý /*Cortinarius glaucopus*
/za vlhka slizký
- Pavučinec červenokaštanový /*Cortinarius vernus*
/ hnědý klobouk, jarní ,vínově červený třen na bázi
- Vláknička zemní - bílá/ fialová varieta) /*Inocybe geophylla /lilacina*
/drobná houba, bývá jich více na jednom místě, bílá i fialová rostou často pospolu
- Vláknička pomíchaná /*Inocybe mixtilis*
- Kržatka zimní /*Tubaria hiemalis*
- Závojenka sp. /*Entoloma*

- Kalichovka oranžová /*Rickenella fibula*
/roste na mechových polštářech, nejedlá
- Penízovka máslová – kuželovitá /*Rhodocollybia butyracea f. asema*
/kuželovitý a dutý třeň, H
- Penízovka splývavá /*Gymnopus confluens*
/bledá houba, trsnatá, chlupatý třeň, husté volné lupeny, nejedlá
- Penízovka červenotřenná /*Gymnopus erythropus*
- Pařezník obecný /*Panellus stypticus*
/pod duby, hořký
- Štítovka Romellova /*Pluteus romellii*
- Muchomůrka zelená = hlíznatá /*Amanita phalloides*
/zelený až olivový klobouk, světlý třeň s dlouhou typickou sukňí, výrazná pochva, jedovatá jak sviňa
- Čirůvka zemní /*Tricholoma terreum*
/ myšově šedá, nežloutne, bez pachu, bez tmavých šupinek aké má šedožemlová, jedlá
- Slzečník žlutkový /*Bolbitius vitellinus*

Holubinky: chuťově hořké nebo palčivé nesbírejte - jsou nejedlé; nepálivé jsou jedlé.

- Holubinka měnlivá /*Russula risigallina* M
/jedlá
- Holubinka brunátna /*Russula badia* M
/nejedlá
- Holubinka akvamarínová /*Russula chloroides* M
/jedlá
- Holubinka křehká /*Russula fragilis* M
/nejedlá

Lišejník

- Hlavnatka sp.
/ široký zelený listovitý útvar, ze kterého ze spoda čouhají bílé špičaté výrůstky