

## MYKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

Bi7529

### legenda:

M – mykorhizní houba

S – saprofytická houba

P – parazitická houba

B – po zmáčknutí/ škrábnutí/ řezání mění Barvu

H – hygrofánní = nasává vodu (za mokra je tmavší barva)

VP- výtrusný prach

### Seznam hub nalezených v Řečkovících dne 30.10.2013 + stručné poznámky

#### **Řád: Russulales**

- Ryzec plstnatý                    */Lactarius vellereus*    M

    /bílé mléko, pálí, nejedlý

- Ryzec šeredný                    */Lactarius turpis*        M

    / hnusně smrdí, bílé mléko, olivový odstín houby

- Ryzec dubový                    */Lactarius quietus?*    M

    / oranžové mléko, jedlý

- Pevník dubový                    */Stereum gausapatum*    S

#### **Řád: Boletales**

- Hvězdák vláhojevný            */Astraeus hygrometricus*    M

    /příbuzný pestřeci, hygroskopické pohyby – otvárá sa a zatvára sa

**Řád: Polyporales**

- Síťkovec dubový                    /*Daedalea quercina* S

**Řád: Thelephorales**

- Vatička                                /*Tomentella sp.* M

/roste na zemi, skále, bordovo-fialovo -biely huňatý povlak

**Řád: Agaricales**

- Špička listová                        /*Marasmius epiphyllus* S

/roste na spadáném listí

- Bedla zardelá                         /*Leucoagaricus leucothites* S

/Bílý VP, bílá houba, má prsten, jedlá

- Bedla štíhlá                          /*Macrolepiota mastoidea* S

/jedlá

- Límcovka věnčená                    /*Stropharia coronilla* S

/šedo-fialové lupeny, oranžvoý slizký klobouk

- Helmovka tuhonohá                  /*Mycena galericulata* S

- Helmovka leponohá                  /*Mycena inclinata* S

/trsy, pařezy dubů, třeh dühový

- Helmovka růžová                     /*Mycena rosea* S

- Helmovka mléčná            /*Mycena galopus*        S  
                                   / po poranění vytéká z báze třeně bílé mléko
  
- Helmovka šedolupenná   /*Mycena aetites*        S
  
- Lakovka obecná            /*Laccaria laccata*       M  
                                   /oranžová
  
- Šťavnatka holubinková   /*Hygrophorus russula*    M  
                                   / slizký růžový klobouk
  
- Šupinovka šedohlínová   /*Pholiota lenta*         S  
                                   /za mokra tlustá vrstva slizu (to se pozná za sucha tak, že na klobouku jsou přilepeny nečistoty), zbytky pavučinkového vela na třeni, bez znaků – vypadá jak václavka ale bez šupin
  
- Hlíva ústříčná            /*Pleurotus ostreatus*   P-S  
                                   / roste na dřevě, jedlá, má masožravé mycélium :-O
  
- Pavučinec nevlídný        /*Cortinarius torvus*     M  
                                   / smrdí jako nevyprané plavky z plovárně a levný jablečný šampon :D
  
- Pavučinec sivonohý        /*Cortinarius glaucopus*   M  
                                   /za vlhka slizký klobouk
  
- Pavučinec purpurový       /*Cortinarius purpurascens* M
  
- Pavučinec osikový        /*Cortinarius trivialis*   M  
                                   /celý slizký, výrazne cípovité napojení prstenu na třeně

- Pavučinec kolouší            /*Cortinarius hinnuleus*        M  
                                   /bílý prsten, rezavá houba, řídké lupeny, nejedlý
  
- Závojenka vmáčklá           /*Entoloma rhodopolium*        S/M?  
                                   /páchne nitrózne, VP růžový, hranaté spory, jedovatá
  
- Kalichovka oranžová         /*Rickenella fibula*         P  
                                   /roste v mechových polštářích, nejedlá
  
- Křehutka vodomilná         /*Psathyrella piluliformis*     S  
                                   /hnědá, trsnatá na dřevě, H
  
- Penízovka kuželovitá         /*Rhodocollybia asema*         S?  
                                   /kuželovitý třeň, jedlá
  
- Penízovka sametonohá       /*Flammulina velutipes*        S  
                                   /Klobouk má medově zbarvený, 3 až 5 cm široký, lepkavý, lupeny husté, bělavé a tenké, válcovitý třeníček, zabalený do hustého hnědého kožíšku. Za mrazů zmrzne na kost, ale to jí nijak nevadí, jakmile přijde obleva, roste si vesele dál. jedlá
  
- Penízovka červenonohá       /*Gymnopus erythropus*         S  
                                   /nejedlá
  
- Muchomůrka slámožlutá       /*Amanita gemmata*         M  
                                   /jedovatá
  
- Muchomůrka růžovka         /*Amanita rubescens*         M  
                                   /jedlá

- Čirůvka mýdlová                    */Tricholoma saponaceum*    M  
/voní jako saponát, bledožlutavá houba, B- červená, nejedlá

- Čirůvka opálená                    */Tricholoma ustaloides*        M  
/hnědý klobouk (i třeň - ale s bílou zónou), bílé lupeny, nejedlá

- Čirůvka bílá                         */Tricholoma album*        M  
/nejedlá

- Čirůvka hořká                      */Tricholoma acerbum*        M  
/ zebernatě rýhovaný okraj klobouku

- Čirůvka sírožlutá                 */Tricholoma sulphureum*    M  
/jedovatá, smrdí

**Holubinky: chuťově hořké nebo palčivé nesbírej - jsou nejedlé; nepálivé jsou jedlé.**

- Holubinka citlivá                    */Russula luteotacta*    M  
/nejedlá, B- žlutne

- Holubinka slanečková              */Russula graveolens*    M  
/smrdí po rybíně, B- hnědne, jedlá

- Holubinka křehká                    */Russula fragilis*        M  
/nejedlá

***Lišejník***

- Dutohlávka třásnitá                */Cladonia fimbriata*

/ kalich na stopke - zelený