

# Názvosloví

## Prvky, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny

# Prvky

Bohrium	Bh	Curium	Cm	Darmstadtium	Ds
Einsteinium	Es	Flerovium	Fl	Hassium	Hs
Kalifornium	Cf	Kopernicium	Cn	Livermorium	Lv
Lutecium	Lu	Meitnerium	Mt	Promethium	Pm
Rhenium	Re	Rhodium	Rh	Roentgenium	Rg
Ruthenium	Ru	Rutherfordium	Rf	Seaborgium	Sg
Tellur	Te	Thalium	Tl	Thulium	Tm
Ytterbium	Yb	Yttrium	Y		

# Předpony a přípony

Oxidační číslo	Kation	Sůl	Kyselina
I	-ný	-nan	-ná
II	-natý	-natan	-natá
III	-ity	-itan	-itá
IV	-ičitý	-ičitan	-ičitá
V	-ičný -ečný	-ičnan -ečnan	-ičná -ečná
VI	-ový	-an	-ová
VII	-istý	-istan	-istá
VIII	-ičelý	-ičelan	-ičelá

Číslovka	Předpona
1/2	hemi-
1	mono-
2	di-
3	tri-
4	tetra-
5	penta-
6	hexa-
7	hepta-
8	okta-
9	nona-
10	deka-
11	undeka-
12	dodeka-

# Oxidační číslo

- ▶ Oxidační číslo je formální náboj, který by atom měl, pokud bychom všechny vazebné elektrony přisoudili elektronegativnějšímu prvku.
- ▶ Součet oxidačních čísel všech atomů molekuly je roven nule.
- ▶ Součet oxidačních čísel všech atomů iontu je roven jeho náboji (vč. znaménka).
- ▶ **Vodík** se ve sloučeninách vyskytuje nejčastěji v oxidačním stavu I, výjimkou jsou hydridy, kde má oxidační číslo -I.
  - ▶  $H_2{}^I O^{-II} - 2 \times 1 + (-2) = 0$  - voda (oxan)
  - ▶  $Ca^{II} H_2{}^{-I} - 2 + 2 \times (-1) = 0$  - hydrid vápenatý
- ▶ **Kyslík** tvoří sloučeniny ve třech oxidačních stavech
  - ▶ Oxidy:  $K_2{}^I O^{-II} - 2 \times 1 + (-2) = 0$  - oxid draselný
  - ▶ Peroxydy  $K_2{}^I O_2{}^{-I} - 2 \times 1 + 2 \times (-1) = 0$  - peroxid draselný
  - ▶ Hyperperoxydy  $K^I O_2{}^{-1/2} - 1 + 2 \times (-1/2) = 0$  - hyperoxid draselný
- ▶  $(S^{VI} O_4{}^{-II})^{2-} - 6 + 4 \times (-2) = -2$  - síran
- ▶  $(Cl^{VII} O_4{}^{-II})^- - 7 + 4 \times (-2) = -1$  - chloristan

# Kyseliny a soli

$\text{H}_2\text{S}^{\text{VI}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	kyselina sírová
$\text{Na}_2\text{S}^{\text{VI}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	síran sodný
$\text{H}_3\text{P}^{\text{V}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	kyselina trihydrogenfosforečná
$\text{Na}_3\text{P}^{\text{V}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	fosforečnan sodný
$\text{Na}_2\text{H}\text{P}^{\text{V}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	hydrogenfosforečnan sodný
$\text{NaH}_2\text{P}^{\text{V}}\text{O}_4^{-\text{II}}$	dihydrogenfosforečnan sodný
$\text{Al}^{\text{III}}\text{H}_3^{-\text{I}}$	alan (hydrid hlinitý)
$\text{Se}^{\text{II}}\text{H}_2^{-\text{I}}$	selan
$\text{P}^{\text{III}}\text{H}_3^{-\text{I}}$	fosfan
$\text{P}^{\text{V}}\text{H}_5^{-\text{I}}$	fosforan
$\text{H}_2\text{O}_2^{-\text{I}}$	peroxid vodíku
$\text{Na}^{\text{I}}\text{N}^{\text{III}}\text{O}_2^{-\text{II}} \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	dekahydrát dusitanu sodného
$\text{Al}_2^{\text{III}}\text{S}_3^{-\text{II}}$	sulfid hlinitý
$\text{K}^{\text{I}}\text{C}^{\text{II}}\text{N}^{-\text{III}}$	kyanid draselný

# Názvy iontů a atomových skupin

$\text{PH}_4^+$	fosfonium	$\text{PH}_4\text{Cl}$	chlorid fosfonia
$\text{H}_2\text{NO}_3^+$	nitratacidium	$(\text{H}_2\text{NO}_3)\text{SO}_4$	síran nitratacidia
$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}]^+$	trimethylamonium	$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}]\text{Br}$	bromid
$\text{NH}_2^-$	amid	$\text{NaNH}_2$	trimethylamonia
$\text{N}^{3-}$	azid	$\text{Hg}_3\text{N}_2$	amid sodný
$\text{C}^{4-}$	karbid	$\text{Ca}_2\text{C}$	azid rtuťnatý
			karbid vápenatý

## Atomové skupiny

OH	hydroxyl	CO	karbonyl	NO	nitrosyl
$\text{NO}_2$	nitryl	PO	fosforyl	VO	vanadyl
SO	thionyl	$\text{SO}_2$	sulfuryl	SeO	seleninyl
$\text{SeO}_2$	selenonyl	$\text{CrO}_2$	chromyl	$\text{UO}_2$	uranyl
ClO	chlorosyl	$\text{ClO}_2$	chloryl	$\text{ClO}_3$	perchloryl

$\text{COCl}_2$  - chlorid karbonylu


$\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$  - dusičnan uranylu

# Koordinační sloučeniny


Koordinační sloučenina je sloučenina obsahující alespoň jednu donor-akceptorovou vazbu. Název těchto sloučenin se tvoří pojmenováním centrálního atomu a jednotlivých ligandů.

Vzorec	Ion	Ligand
$\text{SO}_4^{2-}$	Síran	Sulfato-
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	Thiosíran	Thiosulfato-
$\text{PO}_4^{3-}$	Fosforečnan	Fosfato-
$\text{CH}_3\text{COO}^-$	Octan	Acetato-
$\text{F}^-$	Fluorid	Fluoro-
$\text{O}^{2-}$	Oxid	Oxido-
$\text{H}^-$	Hydrid	Hydrido-
$\text{SCN}^-$	Thiokyanatan	Thiokyanato-


# Koordinační sloučeniny - organické ligandy




ur  
moèovina




py  
pyridin



H<sub>4</sub>edta  
Chelaton 2  
kyselina ethylendiamintetraoctová



Hacac  
acetylacetone  
2,4-pentadion



phen  
1,10-fenantrolin

# Koordinační sloučeniny - izomerie

a) Ligand se koordinuje k centrálnímu atomu různými donorovými atomy.  
Jev se nazývá vazebná izomerie a izomery rozlišujeme rozdílnými názvy ligandů

$-NO_2$  nitro  $-ONO$  nitrito

b) Koordinují se izomerní ligandy za vzniku polohových izomerů. I tento případ se vystihne rozdílným názvem ligandů

$H_2NCH_2CH(NH_2)CH_3$  1,2-diaminopropan

$CH_3NHCH_2CH_2NH_2$  N-methylethyldiamin

c) Komplex má zaměněny ionty v koordinační a iontové sféře. Tuto situaci, nazývanou ionizační izomerie, řeší název komplexu

$[Co(NH_3)_5SO_4]Br$  bromid pentaammin-sulfatokobaltitý


$[Co(NH_3)_5Br]SO_4$  síran pentaammin-bromokobaltitý

d) U koordinačních sloučenin s komplexním kationtem i aniontem se může měnit rozdělení ligandů mezi koordinačními sférami obou centrálních atomů (koordinační izomerie)


$[Pt(NH_3)_4][CuCl_4]$  tetrachloroměď'natan tetramminplatnatý

$[Cu(NH_3)_4][PtCl_4]$  tetrachloroplatnat an tetraamminměď'natý

# Koordinační sloučeniny - organické ligandy



*cis*-dichloro-tetramminochromitan



*trans*-dichloro-tetramminochromitan

