

M5VM05 Statistické modelování

3. Testování statistických hypotéz

Jan Koláček (kolacek@math.muni.cz)

Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno



Testování statistických hypotéz

Mějme náhodný výběr $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$ rozsahu n z rozdělení o distribuční funkci $F(x; \boldsymbol{\theta})$, kde $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_m)' \in \Theta \subset \mathbb{R}^m$. Množina Θ necht' je neprázdná a otevřená.

Předpokládejme, že o parametru $\boldsymbol{\theta}$ existují dvě konkurující si hypotézy:

$$H_0: \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \subset \Theta$$

$$H_1: \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0$$

Tvrzení $\begin{matrix} \boxed{H_0} \\ \boxed{H_1} \end{matrix}$ se nazývá **nulovou hypotézou**.
alternativní hypotézou.

O platnosti této hypotézy se má rozhodnout na základě náhodného výběru

$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$, a to tak, že $\begin{cases} \nearrow \text{zamítáme} \textit{ nebo} \\ \searrow \text{nezamítáme} \end{cases}$ platnost hypotézy H_0 .

Testování statistických hypotéz

Na testování použijeme statistiku $T_n = T(\mathbf{X})$, kterou nazýváme **testovací statistikou**. Množinu hodnot, které může testovací statistika nabýt, rozdělíme na dvě disjunktní oblasti. Jednu označíme W_α , a nazveme ji **kritickou oblastí** (nebo také *oblastí zamítnutí hypotézy*) a druhá je doplňkovou oblastí (*oblast nezamítnutí testované hypotézy*).

Na základě realizace náhodného výběru $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)'$ vypočítáme hodnotu testovací statistiky $t_n = T(\mathbf{x})$.

- Pokud hodnota testovací statistiky t_n nabude hodnoty z kritické oblasti, tj. $t_n = T(\mathbf{x}) \in W_\alpha$, pak **nulovou hypotézu zamítáme**.
- Pokud hodnota testovací statistiky nabude hodnoty z oblasti nezamítnutí, tj. $t_n = T(\mathbf{x}) \notin W_\alpha$, tak **nulovou hypotézu nezamítáme**, což ovšem neznamená že přijímáme alternativu.

Testování statistických hypotéz

H_0	PLATÍ	NEPLATÍ
ZAMÍTÁME $t_n = T(\mathbf{x}) \in W_\alpha$	chyba 1. druhu (α_0 je hladina testu) $\alpha_0 = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(T(\mathbf{X}) \in W_\alpha H_0) \leq \alpha$	O.K. (tzv. síla testu či silo-funkce) $1 - \beta(\theta) = P_\theta(T(\mathbf{X}) \in W_\alpha H_1)$ pro $\theta \in \Theta_1$
NEZAMÍTÁME $t_n = T(\mathbf{x}) \notin W_\alpha$	O.K.	chyba 2. druhu $\beta(\theta) = P_\theta(T(\mathbf{X}) \notin W_\alpha H_1)$ pro $\theta \in \Theta_1$

Definice 1

Chybu, která spočívá **v nesprávném zamítnutí nulové hypotézy, i když je správná**, budeme nazývat **chybou prvního druhu**, pravděpodobnost

$$\alpha_0 = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(T(\mathbf{X}) \in W_{\alpha} | H_0)$$

nazveme **hladinou významnosti** (též **hladinou testu**).

Chybu, která spočívá **v nesprávném přijetí nulové hypotézy, i když neplatí**, budeme nazývat **chybou druhého druhu** a její pravděpodobnost pro $\forall \theta \in \Theta_1$ označíme

$$\beta(\theta) = P_{\theta}(T(\mathbf{X}) \notin W_{\alpha} | H_1) .$$

Pravděpodobnost $1 - \beta(\theta)$ nazýváme **silou testu** (též **silou kritické oblasti** W_{α}) a jakožto funkci $\theta \in \Theta_1$ ji také nazveme **silofunkcí testu**.

Vztah mezi testy a intervalovými odhady

Mějme náhodný výběr $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$ rozsahu n z rozdělení, které závisí na parametru $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_m) \in \Theta$ a parametrickou funkci $\gamma(\boldsymbol{\theta})$.

A Hypotéza $H_0 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) = \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$ proti (tzv. *oboustranné*) alternativě $H_1 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) \neq \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$:

Mějme **intervalový odhad** $(D_n(\mathbf{X}), H_n(\mathbf{X}))$ parametrické funkce $\gamma(\boldsymbol{\theta})$ o spolehlivosti $1 - \alpha$. Pokud platí nulová hypotéza, pak

$$1 - \alpha = P_{\boldsymbol{\theta}} (D_n(\mathbf{X}) \leq \gamma(\boldsymbol{\theta}_0) \leq H_n(\mathbf{X})),$$

takže **kritický obor** tohoto testu má tvar:

$$W_\alpha = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n : \gamma(\boldsymbol{\theta}_0) \notin (D_n(\mathbf{X}), H_n(\mathbf{X}))\}$$

Vztah mezi testy a intervalovými odhady

Zjistíme-li v konkrétní situaci, že

$$\gamma(\boldsymbol{\theta}_0) \notin (d_n(\mathbf{x}), h_n(\mathbf{x}))$$

tj. realizace $\mathbf{x} \in W_\alpha$

potom

- buď nastal jev, který má pravděpodobnost α (volí se blížká nule),
- nebo neplatí nulová hypotéza.

Protože při obvyklé volbě $\alpha = 0.05$ nebo $\alpha = 0.01$ je tento jev „prakticky nemožný“, proto nulovou hypotézu H_0 **zamítáme ve prospěch alternativy** H_1 .

V opačném případě, tj. pokud

$$\gamma(\boldsymbol{\theta}_0) \in (d_n(\mathbf{x}), h_n(\mathbf{x}))$$

tj. realizace $\mathbf{x} \notin W_\alpha$

nulovou hypotézu H_0 **nezamítáme**.

- B** Hypotéza $H_0 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) = \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$ proti (tzv. *jednostranné*) alternativě $H_1 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) > \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$:

V tomto případě využijeme **dolní odhad** $D_n(\mathbf{X})$ parametrické funkce $\gamma(\boldsymbol{\theta})$ o spolehlivosti $1 - \alpha$. Pokud platí nulová hypotéza, pak

$$1 - \alpha = P_{\boldsymbol{\theta}} (D_n(\mathbf{X}) \leq \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)),$$

takže **kritický obor** tohoto testu má tvar:

$$W_{\alpha} = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n : D_n(\mathbf{X}) > \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)\}.$$

- C Hypotéza $H_0 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) = \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$ proti (tzv. *jednostranné*) alternativě $H_1 : \gamma(\boldsymbol{\theta}) < \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)$ V tomto případě využijeme **horní odhad** $H_n(\mathbf{X})$ parametrické funkce $\gamma(\boldsymbol{\theta})$ o spolehlivosti $1 - \alpha$. Pokud platí nulová hypotéza, pak

$$1 - \alpha = P_{\boldsymbol{\theta}}(\gamma(\boldsymbol{\theta}_0) \leq H_n(\mathbf{X})),$$

takže **kritický obor** tohoto testu má tvar:

$$W_{\alpha} = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n : H_n(\mathbf{X}) < \gamma(\boldsymbol{\theta}_0)\}.$$

Testy o parametrech normálního rozdělení


H_0	H_1	Hypotézu H_0 zamítáme, pokud $\mathbf{X} \in W_\alpha$, tj.	Předpoklady
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ \bar{X} - \mu_0 \sqrt{n} \geq \sigma u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	σ^2 známé
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n} \geq \sigma u_{1-\alpha}$	σ^2 známé
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n} \leq -\sigma u_{1-\alpha}$	σ^2 známé
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ \bar{X} - \mu_0 \sqrt{n} \geq S t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	σ^2 neznámé
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n} \geq S t_{1-\alpha}(n-1)$	σ^2 neznámé
$\mu = \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$(\bar{X} - \mu_0) \sqrt{n} \leq -S t_{1-\alpha}(n-1)$	σ^2 neznámé
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \notin \left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1), \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right)$	μ neznámé
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$	μ neznámé
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_\alpha^2(n-1)$	μ neznámé

Příklad

Příklad 1 (Výška desetiletých chlapců)

V roce 1961 byla u 15 náhodně vybraných chlapců z populace všech desetiletých chlapců žijících v Československu zjištěna výška:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	140	136	141	139	133	149	151	139	136	138	142	127	139	147



Je známo, že každá následující generace je v průměru o něco vyšší než generace předcházející. Můžeme se tedy ptát, zda průměr $\bar{x} = 139.133$ zjištěný v náhodném výběru rozsahu $n = 15$ znamená, že na 5% hladině máme zamítnout nulovou hypotézu $H_0 : \mu = 136,1$ (zjištění z roku 1951) ve prospěch alternativní hypotézy $H_1 : \mu > 136,1$.

Rozptyl $\sigma^2 = 6,4^2 \text{ cm}^2$, zjištěný v roce 1951 (kdy se provádělo rozsáhlé šetření), můžeme považovat za známý, neboť variabilita výšek zůstává (na rozdíl od střední výšky) téměř nezměněná.


Řešení (I) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ PIVOTOVÉ STATISTIKY $U_{\bar{X}}$ A KRITICKÉ HODNOTY.

Protože kritický obor W_0 lze ekvivalentně vyjádřit i takto

$$W_0 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha} > \mu_0 \right\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : u_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\alpha} \right\},$$

počítejme $u_{\bar{x}} = \frac{139,133 - 136,1}{6,4} \sqrt{15} = 1,835$. Protože $u_{\bar{x}} = 1,835$ překračuje kritickou hodnotu $u_{1-\alpha} = u_{0,95} = 1,645$, nulovou hypotézu na 5% hladině **zamítneme** ve prospěch alternativní hypotézy, že se střední výška desetiletých hochů zvětšila.

(II) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ p -HODNOTY



Dosažená hladina odpovídající testové statistice (tj. tzv. p -hodnota, anglicky *P-value*, *significance value*), což je nejmenší hladina testu, při které bychom ještě hypotézu H_0 zamítli, je rovna 0,033, takže například při $\alpha = 2,5\%$ by již dosažený výsledek nebyl statisticky významný.

Protože p -hodnota je menší než zvolená hladina významnosti $\alpha = 0.05$, hypotézu **zamítáme**.

(III) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ INTERVALU SPOLEHLIVOSTI $\langle D, +\infty \rangle$

Protože jde o jednostranný test, použijeme **dolní odhad** střední hodnoty μ

$$d = \bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha} = 139,133 - \frac{6,4}{\sqrt{15}} 1,645 = 136,415$$

Protože interval spolehlivosti $\langle 136,415, +\infty \rangle$ nepokrývá hodnotu 136,1, proto nulovou hypotézu na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ **zamítáme**.

Testy dvou nezávislých výběrů

- první náhodný výběr $\underline{X} = \{X_1, \dots, X_{n_1}\} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$,
- druhý náhodný výběr $\underline{Y} = \{Y_1, \dots, Y_{n_2}\} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,
- označme

$$S_{12}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$


H_0	H_1	H_0 zamítáme, pokud $(\mathbf{X}', \mathbf{Y}')' \in W_\alpha$	Předpoklady
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$ \bar{X} - \bar{Y} \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	σ_1^2, σ_2^2 známé
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$ \bar{X} - \bar{Y} \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_{12} \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ neznámé
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} \notin (F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1), F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1))$	μ_1, μ_2 neznámé

Příklad

Příklad 2 (Dva nezávislé náhodné výběry z normálního rozdělení při neznámých ale stejných rozptylech)

Bylo vybráno 13 polí stejné kvality. Na 8 z nich se zkoušel nový způsob hnojení, zbývajících 5 bylo ošetřeno běžným způsobem. Výnosy pšenice uvedené v tunách na hektar jsou označeny X_i u nového a Y_i u běžného způsobu hnojení. Je třeba zjistit, zda způsob hnojení má vliv na výnos pšenice.

X_i	5,7	5,5	4,3	5,9	5,2	5,6	5,8	5,1
Y_i	5,0	4,5	4,2	5,4	4,4			



Řešení Budeme nejprve testovat hypotézu $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$ proti alternativě

$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$. Za pivotovou statistiku zvolíme statistiku

$$F = \frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

(a) Můžeme například vypočítat statistiku F za platnosti nulové hypotézy a porovnat ji s příslušnými oboustrannými kvantily.

$$f = \frac{0,27}{0,24} = 1,1243$$

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = 0,1811$$


$$F_{1 - \frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = 9,0741$$

H_0 **nezamítáme.**

(b) Další možností je spočítat p -hodnotu a srovnat se zvolenou hladinou testu α :

$$p\text{-value} = 0,9656 \gg 0,05$$

Protože p -hodnota je výrazně větší než zvolená hladina testu, hypotézu o rovnosti rozptylů proti alternativě nerovnosti **nezamítáme**.




- (c) A naposledy můžeme ještě zkonstruovat $100(1 - \alpha)\%$ interval spolehlivosti pro podíl rozptylů $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

$$\left\langle \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right\rangle.$$

a zjistit, zda pokrývá hodnotu 1. Protože dostáváme interval $\langle 0, 1239; 6, 2088 \rangle$, který pokrývá jedničku, hypotézu nezamítáme.

(I) TESTOVÁNÍ POMOCÍ STATISTIKY T A KRITICKÉ HODNOTY
Vypočítáme-li hodnotu statistiky



$$T_{\bar{X}-\bar{Y}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{12}} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

a porovnáme s kvantilem Studentova rozdělení, tj.

$$t_{\bar{x}-\bar{y}} = 2.3697 > t_{1-\alpha/2}(11) = 2.201,$$

takže **hypotézu**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

zamítáme.

(II) TESTOVÁNÍ POMOCÍ p -HODNOTY

Vypočítáme-li p -hodnotu a porovnáme se zvolenou hladinou významnosti $\alpha = 0.05$

$$p = P(|T_{\bar{X}-\bar{Y}}| > t) = 2(1 - P(|T_{\bar{X}-\bar{Y}}| \leq t)) = 0.037169 < \alpha$$

takže **hypotézu**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

zamítáme.

(III) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ INTERVALU SPOLEHLIVOSTI

$$\begin{aligned}\bar{x} - \bar{y} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu) s_{12} \sqrt{\frac{n_1+n_2}{n_1 n_2}} &= \langle 0,6875 \pm 2,201 \cdot 0,5089 / 1,7541 \rangle \\ &= \langle 0,048958; 1,326 \rangle\end{aligned}$$

Protože interval spolehlivosti nepokrývá nulu, na dané hladině významnosti **hypotézu zamítáme** ve prospěch alternativy.

Příklad 3 (Párový test)

Na sedmi rostlinách byl posuzován vliv fungicidního přípravku podle počtu skvrn na listech před a týden po použití přípravku. Otestujte, zdali má přípravek vliv na počet skvrn na listech. Data udávající počet skvrn na listech před a po použití přípravku:

<i>před použitím přípravku</i>	X_1		9	17	31	7	8	20	10
<i>po použití přípravku</i>	X_2		10	11	18	6	7	17	5

(I) TESTOVÁNÍ POMOCÍ STATISTIKY T A KRITICKÉ HODNOTY
Položme

$$Z = X_1 - X_2.$$

Vypočítáme-li hodnotu statistiky

$$T = \frac{\bar{z}}{s/\sqrt{n}}$$


a porovnáme s kvantilem Studentova rozdělení, tj.

$$t = \frac{\bar{z}}{s/\sqrt{n}} = 2,2736 \not\geq t_{1-\alpha/2}(n-1) = 2,4469,$$

takže **hypotézu**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

nezamítáme.



(II) TESTOVÁNÍ POMOCÍ p -HODNOTY

Vypočítáme-li p -hodnotu a porovnáme se zvolenou hladinou významnosti $\alpha = 0,05$


$$p = P(|T| > t) = 2(1 - P(|T| \leq t)) = 0,06335 > \alpha$$

takže **hypotézu**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

nezamítáme.

(III) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ INTERVALU SPOLEHLIVOSTI



$$\begin{aligned} \bar{z} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot s / \sqrt{n} \\ = 4 \pm 2,4469 \cdot 4,6547 / 2,6458 = [-0,30492; 8,3049] \end{aligned}$$

Protože interval spolehlivosti pokrývá hodnotu $Z = 0$, na dané hladině významnosti **hypotézu nezamítáme**.

Shrneme-li předchozí výsledky slovně, pak nulovou hypotézu o tom, že

PŘÍPRAVEK NEMÁ VLIV NA POČET SKVRN

na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ **nemůžeme zamítnout** oproti alternativě o jeho vlivu.

Asymptotické testy

Nechť $\perp\{X_1, \dots, X_n\} \simeq \mathcal{L}(\mu(\boldsymbol{\theta}), \sigma^2(\boldsymbol{\theta}))$ s konečnými druhými momenty (s výběrovým průměrem $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ a se $S_*^2 = S_*^2(\mathbf{X})$, což je (**slabě**)

konzistentní odhad rozptylu $\sigma^2(\boldsymbol{\theta})$):

H_0	H_1	H_0 zamítáme, pokud $\mathbf{X} \in W_\alpha$	Předpoklady
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\frac{ \bar{X} - \mu_0 }{S_*} \sqrt{n} \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$0 < \sigma^2(\boldsymbol{\theta}) < \infty$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\frac{ \bar{X} - \mu_0 }{\sqrt{\bar{X}}} \sqrt{n} \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$\perp\{X_1, \dots, X_n\} \simeq Po(\mu)$
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$\frac{ \bar{X} - p_0 }{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$\perp\{X_1, \dots, X_n\} \simeq A(p)$

Příklad 4

Při 40 hodech mincí byl rub zaznamenán 22krát. Je důvod se domnívat, že rub nepadá stejně často jako líc?

Řešení Označme X_i , $i = 1, \dots, 40$ náhodnou veličinou nabývající hodnoty 1, pokud padne rub a hodnoty 0, pokud padne líc. Zřejmě $X_i \sim A(p)$. Testujeme hypotézu $H_0 : p = 0,5$ proti alternativní hypotéze $H_1 : p \neq 0,5$.

Vypočteme průměr $\bar{x} = \frac{22}{40} = 0,55$ a směrodatnou odchylku

$$s = \sqrt{\bar{x}(1 - \bar{x})} = 0,4974.$$

(I) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ PIVOTOVÉ STATISTIKY $U_{\bar{X}}$ A KRITICKÉ HODNOTY.

Protože kritický obor W_0 lze ekvivalentně vyjádřit i takto

$$W_0 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : u_{\bar{x}} = \left| \frac{\bar{x} - p}{\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}} \sqrt{n} \right| > u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\},$$

počítejme $u_{\bar{x}} = \frac{0,55-0,5}{0,4974} \sqrt{40} = 0,6356$. Protože $u_{\bar{x}} = 0,6356$ nepřekračuje kritickou hodnotu $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0,975} = 1,96$, nulovou hypotézu na 5% hladině **nezamítáme**.

(II) TESTOVÁNÍ POMOCÍ p -HODNOTY

Vypočítáme p -hodnotu a porovnáme se zvolenou hladinou významnosti $\alpha = 0,05$

$$p = P(|U_{\bar{x}}| > u_{\bar{x}}) = 2(1 - P(|U_{\bar{x}}| \leq u_{\bar{x}})) = 0,525 \gg \alpha$$

takže **hypotézu**

$$H_0 : p = 0,5$$

nezamítáme.

(III) TESTOVÁNÍ NULOVÉ HYPOTÉZY POMOCÍ INTERVALU SPOLEHLIVOSTI

Interval spolehlivosti pro p :

$$\bar{x} \pm u_{0,975} \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,55 \pm 1,96 \cdot \frac{0,4974}{\sqrt{40}} = (0,396; 0,701).$$

Protože interval spolehlivosti $(0,396; 0,701)$ pokrývá hodnotu $0,5$, nulovou hypotézu na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ **nezamítáme**.

Úlohy k procvičení

Příklad 5.1

Spotřeba téhož auta byla testována u 11 řidičů s výsledky 8,8; 8,9; 9,0; 8,7; 9,3; 9,0; 8,7; 8,8; 9,4; 8,6; 8,9 (l/100 km). Můžeme na hladině významnosti 0,05 zamítnout hypotézu, že je pravdivá výrobcem udávaná spotřeba 8,8 l/100 km? Můžeme na stejné hladině významnosti popřít tvrzení, že rozptyl spotřeby je 0,1? [ne, ne]

Příklad 5.2

Na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte hypotézu $H_0 : \sigma_0 = 300$ o směrodatné odchylce normálně rozdělené náhodné veličiny, jestliže je zaznamenáno $n = 25$, $\bar{X} = 3118$, $s = 357$. [nezamítáme]

Příklad 5.3

Denní přírůstky váhy selat (v dkg) byly při krmení směsí A : 62, 54, 55, 60, 53, 58, u směsi B : 52, 56, 50, 49, 51. Je mezi nimi statisticky významný rozdíl? [ano]

Úlohy k procvičení

Příklad 5.4

Pro bavlněnou přízi je předepsána horní mez variability pevnosti vlákna: rozptyl pevnosti (která má normální rozdělení) nemá překročit $\sigma_0^2 = 0,36$. Při zkoušce 16 vzorků byly zjištěny výsledky 2,22, 3,54, 2,37, 1,66, 4,74, 4,82, 3,21, 5,44, 3,23, 4,79, 4,85, 4,05, 3,48, 3,89, 4,90, 5,37. Je důvod k podezření na vyšší nestejnou měrnost než je stanoveno?

[ano]

Příklad 5.5

Bylo provedeno měření obsahu SiO_2 ve strusce dvěma metodami

<i>analyticky</i>	20,1	19,6	20,0	19,9	20,1	
<i>fotokolorometricky</i>	20,9	20,1	20,6	20,5	20,7	20,5

Je mezi rozptyly výsledků jednotlivých metod podstatný rozdíl?

[není]

Úlohy k procvičení

Příklad 5.6

Starosta obdržel při posledních volbách 60% hlasů. Bude stejně úspěšný i při příštích, když ze 100 náhodně vybraných občanů je pro něj 48?

[nebude]

Příklad 5.7

Na základě testu máme na 5% hladině významnosti rozhodnout, zda produkce vajec plemene kornýšek černých je nižší než plemene leghornek bílých. Náhodně jsme vybrali 50 kornýšek a 40 leghornek, u nichž byla zjištěna roční produkce vajec. Byl vypočten roční průměr produkce na slepici – kornýška 275, leghornka 280. Z dřívějších jsou známy rozptyly $\sigma_{kor}^2 = 48$, $\sigma_{leg}^2 = 41$.

[H_0 zamítáme, kornýšky mají horší produkci vajec než leghornky]