

Osnova přednášky „Jednofaktorová MANOVA“

- 1. Popis problému**
- 2. Test hypotézy o shodě vektorů středních hodnot**
- 3. Simultánní testy o složkách vektorů středních hodnot**
- 4. Vícerozměrná obdoba mnohonásobného porovnávání**
- 5. Simultánní testy v mnohonásobném porovnávání**
- 6. Předpoklady v MANOVĚ a jejich ověřování**
- 7. Aplikace MANOVY v psychologickém výzkumu**

Vícerozměrná analogie analýzy rozptylu jednoduchého třídění (jednofaktorová MANOVA)

1. Popis problému

Předpokládáme, že faktor A má $r \geq 3$ úrovní a přitom na h -té úrovni bylo provedeno n_h p -rozměrných pozorování $X_{h11}, \dots, X_{h1p}, \dots, X_{hn_h 1}, \dots, X_{hn_h p}$, která považujeme za realizaci p -rozměrného náhodného výběru rozsahu n_h , $h = 1, \dots, r$. Na každé úrovni faktoru musí být provedeno více pozorování než je závisle proměnných veličin, tj. $n_h > p$, $h = 1, \dots, r$. Výsledky lze zapsat do tabulky:

| faktor A | výsledky |
|----------|---------------------------------|
| úroveň 1 | X_{111}, \dots, X_{11p} |
| | |
| | $X_{1n_1 1}, \dots, X_{1n_1 p}$ |
| | |
| úroveň r | X_{r11}, \dots, X_{r1p} |
| | |
| | $X_{rn_r 1}, \dots, X_{rn_r p}$ |

Zavedeme následující označení:

h ... index skupiny, i ... index objektu, j ... index proměnné

$n = \sum_{r=1}^h n_r$... celkový rozsah všech r výběrů

$M_{hj} = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} X_{hij}$... výběrový průměr j -té proměnné v h -té skupině, $j = 1, \dots, p$, $h = 1, \dots, r$

$\mathbf{M}_h = \begin{pmatrix} M_{h1} \\ \vdots \\ M_{hp} \end{pmatrix}$... vektor výběrových průměrů v h -té skupině, $h = 1, \dots, r$

$\mathbf{M} = \frac{1}{n} \sum_{h=1}^r n_h \mathbf{M}_h$... vektor celkových průměrů

$\mathbf{S}_h = \frac{1}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} (\mathbf{X}_h - \mathbf{M}_h)(\mathbf{X}_h - \mathbf{M}_h)^T$... výběrová varianční matice v h -té skupině,

$h = 1, \dots, r$

$\mathbf{S} = \frac{1}{n - r} \sum_{h=1}^r (n_h - 1) \mathbf{S}_h$... vážený průměr výběrových variančních matic

Celková variabilita obsažená v datech je vyjádřena maticí \mathbf{T} :

$$\mathbf{T} = \sum_{h=1}^r \sum_{i=1}^{n_h} (\mathbf{X}_{hi} - \mathbf{M})(\mathbf{X}_{hi} - \mathbf{M})^T .$$

Matici \mathbf{T} lze rozložit na součet dvou matic: $\mathbf{T} = \mathbf{E} + \mathbf{B}$,

kde \mathbf{E} je matice reziduální variability

$$\mathbf{E} = \sum_{h=1}^r \sum_{i=1}^{n_h} (\mathbf{X}_{hi} - \mathbf{M}_h)(\mathbf{X}_{hi} - \mathbf{M}_h)^T = \sum_{h=1}^r (n_h - 1)\mathbf{S}_h$$

a \mathbf{B} je matice meziskupinové variability

$$\mathbf{B} = \sum_{h=1}^r n_h (\mathbf{M}_h - \mathbf{M})(\mathbf{M}_h - \mathbf{M})^T .$$

Vliv faktoru, který způsobuje rozpad datové matice na skupiny, se může projevit jen v matici \mathbf{B} . Variabilitu projevující se v matici \mathbf{E} tedy považujeme za reziduální, způsobenou buď náhodnými vlivy nebo faktory, kterou nejsou z našeho hlediska podstatné.

2. Test hypotézy o shodě vektorů středních hodnot

Nadále budeme předpokládat, že náhodný výběr příslušející h -té úrovni faktoru A , tedy posloupnost stochasticky nezávislých p -rozměrných náhodných vektorů $\mathbf{X}_{h1}, \dots, \mathbf{X}_{hn_h}$, pochází z p -rozměrného normálního rozložení $N_p(\boldsymbol{\mu}_h, \boldsymbol{\Sigma})$, $h = 1, \dots, r$ a jednotlivé náhodné výběry jsou stochasticky nezávislé.

Na hladině významnosti α testujeme nulovou hypotézu $H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \dots = \boldsymbol{\mu}_r$ proti alternativní hypotéze H_1 : aspoň jedna dvojice vektorů středních hodnot se liší.

Při testování této hypotézy můžeme použít až čtyři různé testy založené na

- Wilksově kritériu,
- Lawleyově – Hotellingově kritériu,
- Pillaiově kritériu,
- Royově kritériu.

Každé z těchto kritérií je určitým způsobem založeno na vlastních číslech matice $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{E}$.

Označme λ_g g -té vlastní číslo této matice a s počet nenulových vlastních čísel, přičemž $s = \min(p, r - 1)$.

Uvedeme vzorce pro vyjádření jednotlivých kritérií:

$$\text{Wilksovo kritérium: } \Lambda = \frac{\det(\mathbf{E})}{\det(\mathbf{E} + \mathbf{B})} = \prod_{g=1}^s \frac{1}{1 + \lambda_g},$$

$$\text{Lawleyovo – Hotellingovo kritérium: } T^2 = \text{tr}(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{E}) = \sum_{g=1}^s \lambda_g,$$

$$\text{Pillaiovo kritérium: } P = \text{tr}(\mathbf{B}(\mathbf{B} + \mathbf{E})^{-1}) = \sum_{g=1}^s \frac{\lambda_g}{1 + \lambda_g},$$

Royovo kritérium: $V = \lambda_{(1)}$, kde $\lambda_{(1)}$ je největší vlastní číslo matice $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{E}$.

V praxi je nejpoužívanější Wilksovo kritérium. Nabývá hodnot mezi 0 a 1, přičemž vyšší hodnoty znamenají, že střední hodnoty se liší méně.

Testová statistika F_w pro test shody vektorů středních hodnot vznikne transformací Λ :

$$F_w = -\left(n - \frac{p+r}{2} - 1\right) \ln \Lambda. \text{ V případě platnosti nulové hypotézy se statistika } F_w \text{ asymptoticky řídí}$$

rozložením $\chi^2(p(r-1))$. H_0 tedy zamítáme na asymptotické hladině významnosti α , když tato statistika nabude hodnoty větší nebo rovné $1 - \alpha$ kvantilu uvedeného rozložení, tj. $F_w \geq \chi^2_{1-\alpha}(p(r-1))$. Znamená to, že jsme s rizikem omylu nejvýše $100\alpha\%$ prokázali, že alespoň dvě skupiny nemají stejné vektory středních hodnot.

3. Simultánní testy o složkách vektorů středních hodnot

Prokážeme-li na zvolené hladině významnosti α rozdíl mezi vektory středních hodnot, budeme dále zjišťovat, které ze sledovaných p kvantitativních proměnných X_1, \dots, X_p způsobují rozdíl mezi skupinami. Provedeme tedy tzv. simultánní testy. Ty odhalí, které jednotlivé proměnné jsou závislé na faktoru A. Současně tedy testujeme p hypotéz

$$H_{01} : \mu_{11} = \dots = \mu_{1r}, \dots, H_{0p} : \mu_{p1} = \dots = \mu_{pr}.$$

Použijeme testovou statistiku založenou na Wilksově kritériu:

$$K_j = - \left(n - \frac{p+r}{2} - 1 \right) \ln \frac{e_{jj}}{t_{jj}},$$

kde e_{jj} resp. t_{jj} je j -tý diagonální prvek matice \mathbf{E} resp. \mathbf{T} , $j = 1, \dots, p$.

V případě platnosti nulové hypotézy se statistika K_j asymptoticky řídí rozložením $\chi^2(p(r-1))$.

H_{0j} tedy zamítáme na asymptotické hladině významnosti α , když $K_j \geq \chi^2_{1-\alpha}(p(r-1))$.

Upozornění: Může však nastat situace, kdy hypotéza o shodě vektorů středních hodnot byla na hladině významnosti α zamítnuta, avšak simultánní testy neprokáží žádný rozdíl mezi složkami vektorů středních hodnot. V takovém případě jsou rozdíly mezi skupinami způsobeny nějakou kombinací sledovaných p proměnných.

4. Vícerozměrná obdoba mnohonásobného porovnávání

Dalším krokem, který následuje po zamítnutí hypotézy o shodě vektorů středních hodnot, je provedení vícerozměrné obdoby mnohonásobného porovnávání. Chceme totiž zjistit, které dvojice vektorů středních hodnot se liší na zvolené hladině významnosti α . Budeme tedy pro všechny indexy $h, h^* = 1, \dots, r, h \neq h^*$ testovat hypotézu $H_0 : \boldsymbol{\mu}_h = \boldsymbol{\mu}_{h^*}$ proti $H_1 : \boldsymbol{\mu}_h \neq \boldsymbol{\mu}_{h^*}$.

Těchto testů je $\binom{r}{2}$.

Nulovou hypotézu zamítneme na hladině významnosti α , když testová statistika (založená na

Lawleyově – Hotellingově kritériu) $\frac{n - r - p + 1}{(r - 1)p} \cdot \frac{n_h n_{h^*}}{n_h + n_{h^*}} (\mathbf{M}_h - \mathbf{M}_{h^*})^T \mathbf{E}^{-1} (\mathbf{M}_h - \mathbf{M}_{h^*})$

nabude hodnoty aspoň $F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$, kde $v_1 = \frac{(r - 1)p(n - r - p)}{n - 2 - (r - 1)p}$, $v_2 = n - r - p + 1$. Pak jsme

s rizikem omylu nejvýše $100\alpha\%$ prokázali, že h -tá a h^* -tá skupina nemají stejné vektory středních hodnot.

5. Simultánní testy v mnohonásobném porovnávání

Provedení MANOVY uzavřeme tím, že odhalíme případné rozdíly mezi jednotlivými proměnnými v rámci dvojic skupin. Pro všechny indexy h, h^* , $h \neq h^*$ a všechny indexy $j = 1, \dots, p$ testujeme na hladině významnosti α hypotézu $H_0 : \mu_{hj} = \mu_{h^*j}$ proti $H_1 : \mu_{hj} \neq \mu_{h^*j}$.

Zajímá nás tedy rozdíl mezi středními hodnotami j -té proměnné v h -té a h^* -té skupině. Těchto testů je $\frac{pr(r-1)}{2}$.

Testová statistika má tvar:

$$\frac{n-r-p+1}{(r-1)p(n-r)} \cdot \frac{n_h n_{h^*}}{n_h + n_{h^*}} \cdot \frac{(M_{hj} - M_{h^*j})^2}{S_j^2} \quad (S_j^2 \text{ je } j\text{-tý diagonální prvek matice } \mathbf{S}).$$

V případě platnosti nulové hypotézy se tato statistika asymptoticky řídí rozložením $F(v_1, v_2)$,

$$\text{kde } v_1 = \frac{(r-1)p(n-r-p)}{n-2-(r-1)p}, \quad v_2 = n-r-p+1.$$

Hypotézu o shodě j -tých složek vektorů středních hodnot v h -té a h^* -té skupině zamítneme na hladině významnosti α , když tato testová statistika nabude hodnoty větší nebo rovné kvantilu $F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$.

Upozornění:

Vícerozměrnou obdobu mnohonásobného porovnávání ani simultánní testy v mnohonásobném porovnávání systém STATISTICA neposkytuje. Problém lze vyřešit tím, že na zvolenou hladinu významnosti α aplikujeme Bonferroniho korekci.

V prvním případě (tj. pro vícerozměrnou obdobu mnohonásobného porovnávání) provedeme pro každou dvojici skupin vícerozměrný dvouvýběrový t-test (tj. Hotellingův T^2 test) a jeho

vypočtenou p-hodnotu porovnáme s číslem $\frac{\alpha}{\binom{r}{2}}$. Je-li $p \leq \frac{\alpha}{\binom{r}{2}}$, považujeme rozdíl ve vektorech

středních hodnot příslušných dvojic skupin za prokázaný.

Ve druhém případě (tj. pro simultánní testy v mnohonásobném porovnávání) provedeme pro každou proměnnou a každou dvojici skupin dvouvýběrový t-test a jeho vypočtenou p-hodnotu

porovnáme s číslem $\frac{\alpha}{\frac{pr(r-1)}{2}}$. Je-li $p \leq \frac{\alpha}{\frac{pr(r-1)}{2}}$, zamítáme hypotézu o shodě středních hodnot

příslušné proměnné v daných dvou skupinách.

6. Předpoklady v MANOVĚ a jejich ověřování

Vícerozměrná normalita: V každé z r skupin bychom měli testovat hypotézu, že vektor proměnných $(X_1, \dots, X_p)^T$ se řídí p -rozměrným normálním rozložením. Testy na vícerozměrnou normalitu však nejsou běžnou součástí statistických programových systémů. V praxi se spokojíme s tím, že otestujeme normalitu pro každou jednotlivou proměnnou zvlášť. Výsledky těchto testů však posuzujeme jen orientačně. Menší odchylky od normality nebrání provedení MANOVY, při větším porušení používáme vhodné transformace.

Shoda variančních matic: Je-li třídění vyvážené, tj. ve všech skupinách je stejný počet pozorování, je MANOVA odolná vůči porušení předpokladu shody variančních matic. V případě nevyváženého třídění je nutné provést Boxův test shody variančních matic. Na hladině významnosti α testujeme hypotézu $H_0 : \Sigma_1 = \dots = \Sigma_r$ proti alternativní hypotéze H_1 : aspoň jedna dvojice variančních matic se liší. Testová statistika má tvar:

$$T_0 = \frac{1}{C_p} \left[(n - r) \ln |\mathbf{S}| - \sum_{h=1}^r (n_h - 1) \ln |\mathbf{S}_h| \right], \text{ kde}$$

$$C_p = 1 + \frac{2p^2 + 3p - 1}{6(r-1)(p+1)} \left(\sum_{h=1}^r \frac{1}{n_h - 1} - \frac{1}{n - r} \right) \text{ je konstanta zlepšující aproximaci.}$$

V případě platnosti nulové hypotézy se statistika T_0 asymptoticky řídí rozložením

$$\chi^2 \left(\frac{(r-1)p(p+1)}{2} \right). \text{ Pokud testová statistika nabude hodnoty aspoň } \chi^2_{1-\alpha} \left(\frac{(r-1)p(p+1)}{2} \right),$$

hypotézu o shodě variančních matice zamítneme na asymptotické hladině významnosti α .

Linearita vztahů: Vzhledem k tomu, že MANOVA patří do skupiny obecných lineárních modelů, předpokládá se, že v každé skupině existuje mezi závisle proměnnými veličinami přibližně lineární vztah. Tento předpoklad lze orientačně ověřit pomocí dvourozměrných tečkových diagramů. Výskyt nelineárních vztahů snižuje sílu testů v MANOVĚ.

7. Aplikace MANOVY v psychologickém výzkumu

Informace o projektu „Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií“

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je součástí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vědecká činnost tohoto institutu je zaměřena na sledování psychických a sociálních charakteristik dětí, adolescentů a jejich rodin. V současné době je zde mj. řešen projekt Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií – základní determinanty v období adolescence a časně dospělosti. Tento projekt se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení – s dyslexií. Podle současných poznatků je právě tato skupina nadaných studentů ve značně znevýhodňující vzdělávací pozici, která jí často znemožňuje dosahovat úspěchů ve škole i v životě. Hlavním cílem projektu je sledování klíčových proměnných, které mohou být zodpovědné za tento stav.


V rámci projektu byly vyšetřeny řádově stovky studentů. Zaměříme se na data o 166 studentech bez dyslexie a s diagnostikovanou dyslexií, u nichž byla změřena inteligence Ravenovým testem (maximální skóre je 60 bodů, za nadané jsou považováni studenti se skóre aspoň 56 bodů) a kteří vyplnili dotazník zaměřený na tyto aspekty:

- **vědomí vlastní účinnosti** (přesvědčení jedince, že dokáže úspěšně realizovat chování, které je potřebné k dosažení specifických cílů), výsledky jsou zaznamenány v proměnné skóre H, která může nabývat hodnot od 10 do 40;
- **osobní standardy** (tendence dávat si vysoké cíle a hodnotit se v závislosti na jejich dosažení), výsledky jsou obsaženy v proměnné skóre PS, minimální hodnota může být 7, maximální 35;
- **organizovanost** (ukazuje na schopnost udržovat pořádek a řád ve vlastních věcech), výsledky jsou shrnuty v proměnné skóre O, může nabývat hodnot mezi 6 až 30;
- **potřeba poznávat**, výsledky jsou zaznamenány v proměnné skóre G, která se může pohybovat v mezích -64 až 64.

Poznámka k Ravenovu testu:

Základem testu jsou matice diagramů 3 x 3, do které se doplňuje chybějící diagram ve třetí řadě na základě logických souvislostí. Podstatou tohoto testu je měření obecné intelektuální schopnosti pracovat s abstraktními pojmy.

Ukázka Ravenovy matice:



Celý výzkumný soubor 166 studentů je rozčleněn na čtyři skupiny:

- nadaní studenti s dyslexií ($n_1 = 16$, označení ND),
- nadaní studenti bez dyslexie ($n_2 = 40$, označení NnD),
- průměrní studenti s dyslexií ($n_3 = 22$, označení PD),
- průměrní studenti bez dyslexie ($n_4 = 88$, označení PnD).

Metodami MANOVY zjistíme, zda na hladině významnosti 0,05 existují významné rozdíly mezi uvedenými čtyřmi skupinami studentů a identifikujeme proměnné, které tyto rozdíly způsobují.

Ukázka části datového souboru:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|-------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| | Pohlaví | Raven | ID | skoreH | skorePS | skoreO | skoreG |
| 1 | žena | 60 | nadany dyslektik | 28 | 15 | 18 | -13 |
| 2 | muž | 59 | nadany dyslektik | 28 | 26 | 17 | -1 |
| 3 | žena | 59 | nadany dyslektik | 25 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | muž | 58 | nadany dyslektik | 24 | 21 | 15 | 10 |
| 5 | muž | 57 | nadany dyslektik | 34 | 15 | 19 | 12 |
| 6 | žena | 57 | nadany dyslektik | 30 | 28 | 20 | 14 |
| 7 | žena | 58 | nadany dyslektik | 23 | 17 | 17 | 18 |
| 8 | žena | 57 | nadany dyslektik | 30 | 22 | 14 | 18 |
| 9 | žena | 57 | nadany dyslektik | 32 | 27 | 21 | 19 |
| 10 | žena | 57 | nadany dyslektik | 33 | 31 | 14 | 20 |
| 11 | žena | 60 | nadany dyslektik | 22 | 17 | 14 | 22 |

Posouzení úrovně a variability sledovaných proměnných v daných čtyřech skupinách:

Statistiky – Základní statistiky a tabulky – Popisné statistiky – OK – Proměnné skóreH, skórePS, skóreO, skóreG – OK – Anal. skupin – zaškrtneme Zapnuto a Sloučit tabulkové výsledky v jedné tabulce a zrušíme Výsledky za všech. skupiny – zadáme Skupin. proměnná ID – OK – Detailní výsledky – zrušíme Minimum a maximum – Výpočet


| Proměnná | Souhrnné výsledky Popisné statistiky (psychologie.sta) | | | |
|----------|---|------------|----------|----------|
| | ID | N platných | Průměr | Sm.odch. |
| skóreH | nadany dyslektik | 16 | 28,62500 | 3,61248 |
| skórePS | nadany dyslektik | 16 | 22,43750 | 5,15065 |
| skóreO | nadany dyslektik | 16 | 17,25000 | 3,17280 |
| skóreG | nadany dyslektik | 16 | 18,06250 | 14,17260 |
| skóreH | nadany nedyslektik | 40 | 27,25000 | 4,85561 |
| skórePS | nadany nedyslektik | 40 | 20,00000 | 4,53477 |
| skóreO | nadany nedyslektik | 40 | 17,65000 | 3,00043 |
| skóreG | nadany nedyslektik | 40 | 3,07500 | 20,38525 |
| skóreH | prumerny dyslektik | 22 | 27,63636 | 2,78680 |
| skórePS | prumerny dyslektik | 22 | 20,86364 | 5,00757 |
| skóreO | prumerny dyslektik | 22 | 15,86364 | 4,31272 |
| skóreG | prumerny dyslektik | 22 | 7,31818 | 18,00102 |
| skóreH | prumerny nedyslektik | 88 | 28,28409 | 4,16595 |
| skórePS | prumerny nedyslektik | 88 | 20,88636 | 4,42935 |
| skóreO | prumerny nedyslektik | 88 | 18,53409 | 2,84443 |
| skóreG | prumerny nedyslektik | 88 | 0,15909 | 19,10581 |

Průměry proměnných skóre H a skóre PS se u různých skupin příliš neliší. Průměr skóre O je poněkud nižší ve skupině průměrných dyslektiků. Největší rozdíly mezi průměry jsou pozorovatelné u skóre G, kde se velmi výrazně odlišují nadaní dyslektici a průměrní studenti bez dyslexie.

Z hlediska variability se nejvyrovnanější jeví průměrní dyslektici ve vědomí vlastní účinnosti (skóre H), naopak největší proměnlivost pozorujeme u nadaných nedyslektiků v potřebě poznání (skóre G).

Výpočty doplníme krabicovými grafy:

Grafy – 2D grafy – Krabicové grafy – Typ grafu: Vícenásobný – Proměnné – Závislé prom.:
skoreH, skorePS, skoreO, skoreG, Grupovací prom.: ID – OK – Detaily – Střední bod –
Hodn.: Průměr, Krabicový – Hodn.: SmOdch, Koeficient 1 – Svorka – Hodn.: Min-Max –
Odlehlé hodnoty & extrémny – Vyp.



Ověření předpokladů MANOVY

Normalita: Nejprve pomocí S-W testu ověříme předpoklad o normalitě rozložení proměnných skóre H, skóre PS, skóre O, skóre G ve všech čtyřech skupinách:

Statistiky – Základní statistiky a tabulky – Tabulky četností – OK – Proměnné skóreH, skórePS, skóreO, skóreG – OK - Anal. skupin – zaškrtneme Zapnuto a Sloučit tabulkové výsledky v jedné tabulce a zrušíme Výsledky za všech. skupiny – zadáme Skupin. proměnná ID – OK – OK – záložka Normalita – zaškrtneme S-W test a zrušíme K-S test a Lilieforsův test – Testy normality

| Proměnná | Souhrnné výsledky Testy normality (psychologie.sta) | | | |
|----------|--|----|-----------------|-----------------|
| | ID | N | W | p |
| skóreH | nadany dyslektik | 16 | 0,943706 | 0,396906 |
| skórePS | nadany dyslektik | 16 | 0,920708 | 0,173164 |
| skóreO | nadany dyslektik | 16 | 0,974538 | 0,905670 |
| skóreG | nadany dyslektik | 16 | 0,984604 | 0,989658 |
| skóreH | nadany nedyslektik | 40 | 0,981282 | 0,736977 |
| skórePS | nadany nedyslektik | 40 | 0,947461 | 0,062032 |
| skóreO | nadany nedyslektik | 40 | 0,950792 | 0,080743 |
| skóreG | nadany nedyslektik | 40 | 0,927833 | 0,013694 |
| skóreH | prumerny dyslektik | 22 | 0,981058 | 0,931731 |
| skórePS | prumerny dyslektik | 22 | 0,979518 | 0,908287 |
| skóreO | prumerny dyslektik | 22 | 0,979293 | 0,904593 |
| skóreG | prumerny dyslektik | 22 | 0,960403 | 0,497479 |
| skóreH | prumerny nedyslektik | 88 | 0,983965 | 0,350405 |
| skórePS | prumerny nedyslektik | 88 | 0,971554 | 0,049792 |
| skóreO | prumerny nedyslektik | 88 | 0,968818 | 0,032215 |
| skóreG | prumerny nedyslektik | 88 | 0,989775 | 0,728066 |

S-W test zamítá na hladině významnosti 0,05 hypotézu o normalitě skóre G u nadaných nedyslektiků a dále zamítá hypotézu o normalitě skóre PS a skóre O u průměrných nedyslektiků. Normalita je však porušena jen mírně. Nedopustíme se závažné chyby, budeme-li předpokládat, že každá ze čtyř částí datové matice je realizací výběru ze čtyřrozměrného normálního rozložení.

Shoda variančních matic

Hypotézu o shodě variančních matic otestujeme Boxovým testem:

Statistiky – ANOVA – Jednofaktorová ANOVA – OK – Proměnné – Seznam závislých proměnných skoreH, skorePS, skoreO, skoreG - Kategor. nezávislá proměnná (faktor) ID – OK – OK – Více výsledků – záložka Předpoklady – Boxův M test


| | Boxův M test (psychologie.sta) Efekt: ID (Vypočteno pro všechny proměnné) | | | |
|----------|---|----------|----|----------|
| | Boxovo M | Chí-kv. | sv | p |
| Boxovo M | 39,90594 | 37,13662 | 30 | 0,173196 |

Test shody čtyř variančních matic poskytl p-hodnotu 0,1732, tedy nadále budeme varianční matice považovat za shodné.

Linearita vztahů

Linearitu vztahů mezi sledovanými proměnnými v daných čtyřech skupinách orientačně posoudíme pomocí tečkových diagramů. Uvedeme zde výsledky jen pro skupinu průměrných dyslektiků, neboť vzhled tečkových diagramů v ostatních skupinách je podobný:

Grafy – Maticové grafy - Proměnné skoreH, skorePS, skoreO, skoreG – OK – Filtr případů – Zapnout filtr ID=3 – OK – OK



Výrazné nelinearity se zde neprojevují. Důležité předpoklady MANOVY jsou splněny.

Testování hypotézy o shodě vektorů středních hodnot

Nyní provedeme Wilksův, Pillaiův, Hotellingův a Royův test hypotézy o shodě vektorů středních hodnot.

Návrat do ANOVA – záložka Detaily – zaškrtneme vš. Vícerozměrné testy – Test všech efektů

| Vícerozměrné testy významnosti (psychologie.sta) | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sigma-omezená parametrizace | | | | | | |
| Dekompozice efektivní hypotézy | | | | | | |
| Efekt | Test | hodnota | F | Efekt sv | Chyba sv | p |
| Abs. člen | Wilksův | 0,01865 | 2091,936 | 4 | 159,0000 | 0,000000 |
| | Pillaiův | 0,98135 | 2091,936 | 4 | 159,0000 | 0,000000 |
| | Hotelling | 52,62732 | 2091,936 | 4 | 159,0000 | 0,000000 |
| | Royův | 52,62732 | 2091,936 | 4 | 159,0000 | 0,000000 |
| ID | Wilksův | 0,82122 | 2,711 | 12 | 420,9660 | 0,001535 |
| | Pillaiův | 0,18498 | 2,645 | 12 | 483,0000 | 0,001932 |
| | Hotelling | 0,21022 | 2,762 | 12 | 473,0000 | 0,001213 |
| | Royův | 0,16843 | 6,779 | 4 | 161,0000 | 0,000046 |

Všechny čtyři testy zamítají na hladině významnosti 0,05 hypotézu, že střední hodnoty proměnných skóre H, skóre PS, skóre O, skóre G jsou ve všech čtyřech skupinách shodné. S rizikem omylu nejvýše 5 % jsme tedy prokázali, že aspoň mezi dvěma skupinami studentů existuje rozdíl z hlediska sledovaných psychologických skóre.

Simultánní testy o složkách vektorů středních hodnot

Dále se pomocí simultánních testů pokusíme odhalit, které proměnné způsobují rozdíly mezi skupinami studentů. Simultánní testy STATISTICA neposkytuje. Můžeme však s její pomocí vypočítat matici **E** reziduální variability a matici **T** celkové variability. Z těchto matic použijeme diagonální prvky pro výpočet všech čtyř testových statistik založených na Wilksově kritériu.

Výpočet matice **E** reziduální variability:

Návrat do ANOVA – záložka Matice – v části ozn. Meziskupinové efekty vybereme SČ chyb.

| Matice SSCP (Z' Z) reziduí (psychologie.sta) | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sigma-omezená parametrizace | | | | | |
| Dekompozice efektivní hypotézy | | | | | |
| Efekt | Proměnná | skoreH | skorePS | skoreO | skoreG |
| Chyba | skoreH | 2788,239 | 1271,375 | 265,557 | 4037,19 |
| | skorePS | 1271,375 | 3433,392 | 702,182 | 6882,11 |
| | skoreO | 265,557 | 702,182 | 1596,589 | 1464,28 |
| | skoreG | 4037,193 | 6882,108 | 1464,277 | 57782,26 |

Výpočet matice **T** celkové variability (je to matice v pravém dolním rohu):
 Návrat do ANOVA – záložka Matice – v části ozn. Meziskupinové schéma vybereme Z'Z
 odchylek.

| Matice SSCP (Z' Z) odchylek (psychologie.sta) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Matice SSCP (Z' Z) odchylek | | | | | | | | | | | |
| vektorů matice v matici schématu X | | | | | | | | | | | |
| Efekt | Úroveň | Sloupec | Efekt (P/N) | Sloup.1 Abs.člen | Sloup.2 ID | Sloup.3 ID | Sloup.4 ID | Sloup.5 skoreH | Sloup.6 skorePS | Sloup.7 skoreO | Sloup.8 skoreG |
| Abs. člen | | 1 | Pevný | | | | | | | | |
| ID | nadany dyslektik | 2 | Pevný | | 72,7711 | 67,1807 | 59,373 | -16,301 | 19,988 | -70,277 | 529,60 |
| ID | nadany nedyslektik | 3 | Pevný | | 67,1807 | 114,1205 | 68,916 | -55,867 | -38,675 | -68,518 | 278,73 |
| ID | prumerny dyslektik | 4 | Pevný | | 59,3735 | 68,9157 | 83,759 | -34,193 | -4,928 | -104,337 | 380,39 |
| skoreH | | 5 | | | -16,3012 | -55,8675 | -34,193 | 2826,946 | 1313,458 | 298,530 | 4081,61 |
| skorePS | | 6 | | | 19,9880 | -38,6747 | -4,928 | 1313,458 | 3502,578 | 695,301 | 7257,08 |
| skoreO | | 7 | | | -70,2771 | -68,5181 | -104,337 | 298,530 | 695,301 | 1731,928 | 959,94 |
| skoreG | | 8 | | | 529,6024 | 278,7349 | 380,386 | 4081,608 | 7257,084 | 959,940 | 62485,28 |

Vidíme, že $e_{11} = 2788,239$, $e_{22} = 3433,392$, $e_{33} = 1596,589$, $e_{44} = 57782,26$, $t_{11} = 2826,946$,
 $t_{22} = 3502,578$, $t_{33} = 1731,928$, $t_{44} = 62485,28$.

Testové statistiky K_1 , K_2 , K_3 , K_4 vypočteme podle vzorce

$$K_j = -\left(n - \frac{p+r}{2} - 1\right) \ln \frac{e_{jj}}{t_{jj}}, j = 1, 2, 3, 4.$$

Kritický obor je $W = \langle \chi^2_{1-\alpha}(p(r-1)), \infty \rangle$.

V našem případě $n = 166$, $p = 4$, $r = 4$, tedy $n - \frac{p+r}{2} - 1 = 166 - \frac{4+4}{2} - 1 = 161$

K dalším výpočtům použijeme STATISTIKU jako inteligentní kalkulačku. Otevřeme nový datový soubor o jednom případě a s pěti proměnnými K_1 , K_2 , K_3 , K_4 a kvantil.

Do Dlouhého jména proměnné K_1 napíšeme: $=-161*\log(2788,239/2826,946)$

Do Dlouhého jména proměnné K_2 napíšeme: $=-161*\log(3433,392/3502,578)$

Do Dlouhého jména proměnné K_3 napíšeme: $=-161*\log(1596,589/1731,928)$

Do Dlouhého jména proměnné K_4 napíšeme: $=-161*\log(57782,26/62485,28)$

Proměnná kvantil obsahuje kvantil $\chi^2_{0,95}(12)$, tedy do jejího Dlouhého jména napíšeme:

$=VChi2(0,95;12)$

Dostaneme tuto tabulku:

| | 1 K1 | 2 K2 | 3 K3 | 4 K4 | 5 kvantil |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2,21966888 | 3,21204257 | 13,0998874 | 12,5981213 | 21,0260698 |

Vidíme, že ani jedna ze čtyř statistik se nerealizuje v kritickém oboru.

Vzhledem k tomu, že hypotéza o shodě vektorů středních hodnot byla na hladině významnosti 0,05 zamítnuta, ale simultánní testy jsou nevýznamné, musí být rozdíly mezi skupinami zapříčiněny nějakou lineární kombinací sledovaných čtyř proměnných.

Vícerozměrná obdoba mnohonásobného porovnávání

Nyní zjistíme, mezi kterými dvojicemi skupin existuje onen významný rozdíl, který byl odhalen při testování hypotézy o shodě vektorů středních hodnot.

Vícerozměrnou obdoba mnohonásobného porovnávání STATISTICA neposkytuje. Problém vyřešíme tak, že provedeme všech šest porovnání (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4) pomocí Hotellingova T^2 testu a získané p-hodnoty porovnáme s hladinou významnosti korigovanou

podle Bonferroniho, tj. s číslem $\alpha / \binom{r}{2} = \alpha / \binom{4}{2} = \frac{0,05}{6} = 0,008\bar{3}$.

Statistiky – Základní statistiky a tabulky – t-test, nezávislé, dle skupin – OK – Proměnné –
Závisle proměnné skoreH, skorePS, skoreO, skoreG – Grupovací proměnná ID – OK – Kód pro
skup. 1: 1, Kód pro skup. 2: 2 – na záložce Možnosti zaškrtneme Vícerozměrný test
(Hotellingovo T^2) - Výpočet
(Podobně získáme výsledky pro další dvojice skupin.)

Výsledek pro 1. a 2. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: nadany dyslektik; Skup. 2: nadany nedyslektik
Hotellingovo 8,38772 $F(4,51)=1,9804$ $p<,11150$

Vypočtenou p-hodnotu (tj. 0,11150) porovnáme s $0,008\bar{3}$. Vidíme, že nadaní dyslektici a nadaní nedyslektici se neliší.

Výsledek pro 1. a 3. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: nadany dyslektik; Skup. 2: prumerny dyslektik
Hotellingovo 5,78503 $F(4,33)=1,3257$ $p<,28093$

Protože p-hodnota 0,28093 je větší než $0,008\bar{3}$, můžeme konstatovat, že nadaní dyslektici a průměrní dyslektici se neliší.

Výsledek pro 1. a 4. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: nadany dyslektik; Skup. 2: prumerny nedyslektik
Hotellingovo 21,4183 $F(4,99)=5,1971$ $p<,00077$

V tomto případě vidíme, že nadaní dyslektici a průměrní nedyslektici se liší: $0,00077 \leq 0,008\bar{3}$

Výsledek pro 2. a 3. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: nadany nedyslektik; Skup. 2: prumerny dyslektik Hotellingovo 5,35556 $F(4,57)=1,2719$ $p<,29168$

Při srovnání nadaných nedyslektiků a průměrných dyslektiků nebyly odlišnosti zjištěny, protože příslušná p-hodnota (0,28168) je větší než 0,0083.

Výsledek pro 2. a 4. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: nadany nedyslektik; Skup. 2: prumerny nedyslektik Hotellingovo 7,10202 $F(4,123)=1,7332$ $p<,14690$

Nadaní a průměrní nedyslektici se neliší na hladině významnosti 0,05.

Výsledek pro 3. a 4. skupinu:

t-testy; grupováno: ID (psychologie.sta) Skup. 1: prumerny dyslektik; Skup. 2: prumerny nedyslektik Hotellingovo 18,2551 $F(4,105)=4,4370$ $p<,00236$

Zde jsme prokázali, že s rizikem omylu nejvýše 5 % se liší průměrní dyslektici a nedyslektici.

Simultánní testy v mnohonásobném porovnávání

Posouzení rozdílů mezi jednotlivými proměnnými v rámci skupin STATISTICA neposkytuje. Pro každou proměnnou tedy provedeme dvouvýběrový t-test, abychom ji porovnali ve dvojicích skupin 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4 a zjistíme, zda vypočtené p-hodnoty jsou menší nebo rovny

korigované hladině významnosti $\alpha / \frac{\text{pr}(r-1)}{2} = 0,05/24 = 0,0021$.

Vypočtené p-hodnoty máme v tabulce:


| | skóre H | skóre PS | skóre O | skóre G |
|-----------|---------|----------|---------|---------|
| ND x NnD | 0,3109 | 0,0861 | 0,6592 | 0,0096 |
| ND x PD | 0,3469 | 0,3508 | 0,2839 | 0,0554 |
| ND x PnD | 0,7597 | 0,2118 | 0,1058 | 0,0006 |
| NnD x PD | 0,7330 | 0,4920 | 0,0604 | 0,4176 |
| NnD x PnD | 0,2191 | 0,2996 | 0,1116 | 0,4347 |
| PD x PnD | 0,4914 | 0,9833 | 0,0006 | 0,1149 |

Na základě této tabulky můžeme konstatovat, že:

- nadaní dyslektici a průměrní nedyslektici se liší ve skóre G (nadaní dyslektici vykazují vyšší potřebu poznání než průměrní studenti bez dyslexie)
- průměrní dyslektici a průměrní nedyslektici se liší ve skóre O (průměrní dyslektici mají nižší schopnost udržovat pořádek a řád ve vlastních věcech než průměrní studenti bez dyslexie).

Grafické znázornění rozdílů mezi sledovanými proměnnými v rámci čtyř skupin studentů:

Grafy – 2D grafy – Grafy průměrů s odchylkami – Typ grafu Vícenásobný – Proměnné – Závislé prom.: skóreH, skórePS, skóreO, skóreC – Grupovací prom.: ID – OK



Závěr:

Test hypotézy o shodě vektorů středních hodnot prokázal, že s rizikem omylu nejvýše 5 % existují odlišnosti mezi čtyřmi skupinami studentů z hlediska vědomí vlastní účinnosti, osobních standardů, organizovanosti a potřeby poznávání.

Simultánní testy o složkách vektorů středních hodnot ukázaly, že rozdíly mezi skupinami jsou zapříčiněny nějakou lineární kombinací sledovaných čtyř proměnných.

Pomocí vícerozměrné analogie mnohonásobného porovnávání jsme zjistili, že se odlišují nadaní dyslektici a průměrní studenti bez dyslexie a také průměrní studenti bez dyslexie a s dyslexií.

Simultánní testy v mnohonásobném porovnávání odhalily, že nadaní dyslektici vykazují vyšší potřebu poznání než průměrní studenti bez dyslexie a průměrní dyslektici mají nižší schopnost udržovat pořádek a řád ve vlastních věcech než průměrní studenti bez dyslexie.