


Termodynamika a fázové vlastnosti jednosložkových soustavy



Výpočet Td funkcí vody

Výp. stand. hodnot $H^\ominus, S^\ominus, G^\ominus$ (1 mol H_2O v soustavě)
 Liguíd (l):



$$S_{H_2O}^\ominus = S_{H_2}^\ominus + \left(S_{O_2}^\ominus + \frac{1}{2} S_{O_2}^\ominus \right) = -163,292 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

TAB: $\Delta S_{H_2O}^\ominus = -163,292 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
 $S_{H_2}^\ominus = 130,587$ —
 $S_{O_2}^\ominus = 205,29$ —

$$G_{H_2O}^\ominus = H_{H_2O}^\ominus - T \cdot S_{H_2O}^\ominus = -306,690 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Výpočet pro jinou $T = 373 \text{ K}$ $C_p^m = 75,383 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$$H(T) = H^\ominus + \int_{T^\ominus}^T C_p^m dT = H^\ominus + C_p^m \cdot (T - T^\ominus) = -280,184 \text{ J mol}^{-1}$$

$$S(T) = S^\ominus + \int_{T^\ominus}^T \frac{C_p^m}{T} dT = S^\ominus + C_p^m \cdot \ln \frac{T}{T^\ominus} = 86,82 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$G(T) = H(T) - T \cdot S(T) = -312,594 \text{ J mol}^{-1}$$

Výpočet pro tlak $p = 50 \text{ Atm}$

$$(V_m = 18 \text{ cm}^3)$$

$$G_2(p) = G(p_0) + V_m \cdot (p - p_0) =$$

$$= -312,594 + 18 \cdot 10^{-6} \cdot (50 - 1) \cdot 101,325 = -312,505 \text{ J mol}^{-1}$$

Fázový přechod

TAB: 1 Atm: $\Delta H_{\text{vap}} [\text{kJ mol}^{-1}]$

T [K]	$\Delta H_{\text{vap}} [\text{kJ mol}^{-1}]$
298	44.01
373	40.67

$$H_{\text{H}_2\text{O}}^g(373\text{K}) = H_{\text{H}_2\text{O}}^l(373) + \Delta H_{\text{vap}}(373, 1\text{Atm}) = -280184 + 40.69 \cdot 10^3 = -239914 \text{ J mol}^{-1}$$

$$S^g(373) = S^l(373) + \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T_v} = 86.85 + \frac{40670}{373} = 195.88 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$G^g(373) = H^g(373) - T_v \cdot S^g(373) = -312594 \text{ J mol}^{-1} = G^l(373)$$

Plynový stav: $T=473\text{K}$, $p=1\text{Atm}$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. $p_v(373-500\text{K})$

$$H^g(T) = H^g(373) + \int_{T_v}^T c_p dT = \quad \text{TAB: } c_p^m(\text{g}) = 30.12 + 11.30 \cdot T \quad [\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}]$$

$$= H^g(373) + \int_{T_v}^T (a + b \cdot T) dT = H^g(373) + a \cdot (T - T_v) + \frac{b}{2} (T^2 - T_v^2) = 241657 \text{ J mol}^{-1}$$

$$S^g(T) = S^g(373) + \int_{T_v}^T \frac{c_p}{T} dT = S^g(373) + \int_{T_v}^T \frac{(a + b \cdot T)}{T} dT = S^g(373) + a \cdot \ln \frac{T}{T_v} + b \cdot (T - T_v) = 1332.997 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$G^g(T) = H^g - T \cdot S^g = -389050 \text{ J mol}^{-1}$$

$T=473\text{K}$, $p=50\text{Atm}$, id. gas

$$G(p) = G(p_0) + RT \ln \frac{p_0}{p} = -389050 + 8.314 \cdot 473 \cdot \ln \frac{50}{1} = -373661 \text{ J mol}^{-1}$$

1 Atm

List5

50 Atm


G(liquid)-G(gas)

T [K]	101325	1094310	2087295	3080280	4073265	5066250
298,15	23240,29	17359,36	15776,46	14829,64	14154,83	13631,91
306,8925	17294,57	11240,52	9610,641	8635,512	7940,374	7401,576
315,635	12202,74	5975,58	4298,718	3295,277	2579,811	2025,142
324,3775	7965,122	1564,843	-158,998	-1190,75	-1926,55	-2497,09
333,12	4582,002	-1991,39	-3762,21	-4822,28	-5578,4	-6164,81
341,8625	2053,664	-4692,85	-6510,65	-7599,02	-8375,47	-8977,76
350,605	380,3713	-6539,26	-8404,03	-9520,72	-10317,5	-10935,7
359,3475	-437,623	-7530,37	-9442,12	-10587,1	-11404,2	-12038,3
368,09	-400,078	-7665,94	-9624,67	-10798	-11635,4	-12285,3
376,8325	493,2325	-6945,74	-8951,46	-10153,1	-11010,8	-11676,6
385,575	2242,528	-5369,56	-7422,26	-8652,19	-9530,29	-10211,9
394,3175	4848,015	-2937,19	-5036,87	-6295,11	-7193,53	-7891,04
403,06	8309,893	351,5698	-1795,08	-3081,64	-4000,39	-4713,77
411,8025	12628,35	4496,913	2303,282	988,415	49,33443	-679,918
420,545	17803,57	9499,019	7258,409	5915,231	4955,822	4210,698
429,2875	23835,73	15358,06	13070,47	11698,98	10719,25	9958,251
438,03	30725	22074,21	19739,64	18339,84	17339,78	16562,91
446,7725	38471,53	29647,63	27266,08	25837,97	24817,57	24024,83
455,515	47075,48	38078,46	35649,93	34193,51	33152,78	32344,18
464,2575	56537	47366,86	44891,36	43406,62	42345,57	41521,09
473	66856,23	57512,97	54990,49	53477,44	52396,06	51555,71



373K = 100°C


meno
indevac
přetvořiti
C_p

výpočet
hranice fázových
oblastí l-g
pro soustavu



(l→g)
hranice veče
přibližně zde






Plocha Gibbsovy en.
 kapalní fáze grafitu
 v závislosti na teplotě
 a tlaku

Fázové diagramy a termodynamické funkce různých kapalin:
<http://fluidproperties.blogspot.cz/>

Water Steam
Temperature-Entropy-Diagram




Temperature vs. specific entropy phase diagram for water/steam. In the area under the red dome, liquid water and steam coexist in equilibrium. The critical point is at the top of the dome. Liquid water is to the left of the dome. Steam is to the right of the dome. The blue lines/curves are **isobars** showing constant pressure. The green lines/curves are **isochores** showing constant specific volume. The red curves show constant quality.

Read more: <http://www.answers.com/topic/phase-diagram#ixzz2fheybptD>

gas graf 2

průsečnice křivek G_D^m a G_D^n

C_p^h mimo oblast platnosti





$G(u, T)$ pro uhlík
ve ~~stlačeném~~ pl
v plynném stavu

Závěry k příkladu H₂O (platí obecně)


- ① z experimentálních termod. dat lze spočítat termod. data H, S, G pro všechny fáze s, l, g
- ② pro dané T, p je stabilní fáze s nejnižší hodnotou G za těchto podmínek T a p
- ③ průsečnickové křivky ploch G^s, G^l, G^g udávají v souřadnicích p a T hranice fázových oblastí ve fáz. diagramu
- ④ v oblasti nad kritickým bodem plochy G^l a G^g splývají v jednu
- ⑤ hodnoty G jsou velké ale málo se liší \rightarrow *
hutnost přesnosti výchozích dat ($C_p, \Delta H_{f_1 \rightarrow f_2}, S^s, \dots$)
- ⑥ Je třeba sledovat interval platnosti exp. fázových dat $\Delta H_{f_1 \rightarrow f_2}, C_p$ (pozor na ΔH_{vap}).

Text konzistence TD dat





- ⊗ pozor pokud kombinujeme f-a pro různé fáze
- ∇ Test konzistence

Jednosložkové fázové diagramy




● H₂O

za rovnováhy
platí $\mu_{\alpha}^i = \mu_{\beta}^i$




CO₂

Phase Diagram for CO₂





T-p-Vm projekce




**Molární
objem
kapalné a
plynné fáze
(tuhá není
vynesena)**

FD železa



Predikce fází

Klasifikace fázových přechodů



TD Kritérium 1.
řádu:


Jeli FT provázena skokovou změnou objemu a entropie jde o FT 1. řádu

$$\left(\frac{\partial \mu(\beta)}{\partial p} \right)_T - \left(\frac{\partial \mu(\alpha)}{\partial p} \right)_T = V_m(\beta) - V_m(\alpha) = \Delta_{\text{trs}} V$$

$$\left(\frac{\partial \mu(\beta)}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial \mu(\alpha)}{\partial T} \right)_p = -S_m(\beta) + S_m(\alpha) = -\Delta_{\text{trs}} S = -\frac{\Delta_{\text{trs}} H}{T_{\text{trs}}}$$

Příklady řechodů 1. druhu

Přemístění složek, atomů, iontů, atd.



SiO₂

Galium
 $T_m = 29,7645^\circ$
C, (302,9145 K)

Pravidla pro změny entropie fázových přechodů

Troutonovo pravidlo:

$$\Delta S_{\text{vapn}}^{\circ} = \frac{\Delta H_{\text{vapn}}^{\circ}}{T_{\text{bp}}} \approx 87 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$




Richardsovo pravidlo:


9.2 J/mol....prvky s kovovou vazbou

21-29 J/mol.... anorganické sloučeniny

37-59 J/molnízkomolekulární organické látky




FD Uhlíku




Vznik diamantů

Na Zemi



Na jiných planetách




http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/11/a-diamond-bigge.html

<http://www.amnh.org/exhibitions/permanent-exhibitions/earth-and-planetary-sciences-halls/morgan-memorial-hall-of-gems/hall-of-gems-promos/for-educators/where-do-diamonds-come-from>


Příklady přeměn 2 druhu

Změny symetrie



Uspořádací přeměny




(a)




(b)



Supravodivost He



The λ -curve for helium,



Supravodivá oblast helia

Clausius-Clapeyronova rovnice

Obecné odvození Clausius-Clapeyronovy r-ice

Taylorův rozvoj

Na ploše $G^g(T, p)$:

$$G(T, p)^g = \mu^g = G^g(T_0, p_0) + \left(\frac{\partial G^g}{\partial p} \right)_T dp' + \left(\frac{\partial G^g}{\partial T} \right)_p dT' + \dots$$


Na ploše $G^l(T, p)$:

$$G(T, p)^l = \mu^l = G^l(T_0, p_0) + \left(\frac{\partial G^l}{\partial p} \right)_T dp'' + \left(\frac{\partial G^l}{\partial T} \right)_p dT'' + \dots \quad (14)$$

Jestliže $[T_0, p_0]$ leží na průnikové křivce G^l a G^g a nový bod $[T, p]$ leží také na ní, platí:

$$G^g(T, p) = G^l(T, p); \quad G^g(T_0, p_0) = G^l(T_0, p_0); \quad \underbrace{dp' = dp''}_{= dp}, \quad \underbrace{dT' = dT''}_{= dT}$$

Další (14)-(16) dle...



Pak (13)-(14) dá:

$= dp$ $= dT$

$$\left(\frac{\partial G^g}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial G^g}{\partial T}\right)_p dT = \left(\frac{\partial G^l}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial G^l}{\partial p}\right)_T dp$$

po úpravách


obecná C.C. t-c

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{\left(\frac{\partial G^g}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial G^l}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial G^g}{\partial p}\right)_T - \left(\frac{\partial G^l}{\partial p}\right)_T} = \frac{s^g - s^l}{v^g - v^l} = \frac{\Delta S_m^{g \rightarrow l}}{\Delta V_m^{g \rightarrow l}} = \frac{\Delta H_m^{g \rightarrow l}}{T \Delta V_m^{g \rightarrow l}}}$$





plati' obecně pro jakýkoliv fázový přechod

ApL. na id. plyn (zavazání V_m kond. fáze + stavová rovnice):

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{RT^2} \Rightarrow \ln \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \cdot \frac{\Delta H_{vap}}{R}$$






Vliv p a T na fázové transformace






a) $V_m(s) < V_m(l)$ (většina látek) b) $V_m(s) > V_m(l)$ (anomalie vody !!!!)

Obyčejná voda



The Crystal Lattice Structure of Ice




Gibbsova energie




Kritický bod g-l vody




FD Vody




P-T-Vm projekce




$\log_{10}(p / \text{MPa})$



Nerovnovážné přeměny



Metastabilní FD síry



http://chemwiki.ucdavis.edu/Wikitexts/Simon_Fraser_Chem1%3A_Lower/States_of_Matter/Changes_of_State

Diskuse

Anomálie vody : <http://www.lsbu.ac.uk/water/explan4.html>

The heat of fusion of water with temperature exhibits a maximum at -17° C

Water has over twice the specific heat capacity of ice or steam

The specific heat capacity (CP and CV) is unusually high

The specific heat capacity CP has a minimum at 36°

The specific heat capacity (CP) has a maximum at about -45° C

The specific heat capacity (CP) has a minimum with respect to pressure

The heat capacity (CV) has a maximum

High heat of vaporization

High heat of sublimation

High entropy of vaporization

The thermal conductivity of water is high and rises to a maximum at about

130° C


Voda




*Out of the bosom of the Air,
Out of the cloud-folds of her garment shaken,
Over the woodlands brown and bare,
Over the harvest-field forsaken,
Silent, and soft, and slow
Descends the snow.*

- Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)




Diskuse



Fázové přeměny mimo Zemi



<http://www.astroblogs.nl/2015/06/23/vormt-zout-de-sleutel-tot-het-magnetisme-van-uranus-en-neptunus/>



Sodium perchlorate ($NaClO_4$)

<http://cires1.colorado.edu/science/groups/tolbert/people/gough/index.html>