

15. Laplaceova transformace a její užití při řešení systému Kolmogorovových diferenciálních rovnic a evolučních diferenciálních rovnic

15.1. Motivace: Pro HMŘ se spojitým časem lze pravděpodobnosti přechodu vyjádřit jako řešení systému **Kolmogorovových diferenciálních rovnic** a absolutní pravděpodobnosti lze vyjádřit jako řešení systému **evolučních diferenciálních rovnic**. V obou těchto případech vystupují v uvedených rovnicích intenzity přechodu a jedná se o systémy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Takovéto systémy můžeme řešit pomocí různých integrálních transformací, z nichž nejrozšířenější je **Laplaceova transformace**. Laplaceova transformace převádí soustavu diferenciálních rovnic pro neznámé funkce na soustavu algebraických rovnic pro obrazy těchto funkcí. Tuto soustavu vyřešíme a pomocí operátorového slovníku najdeme k obrazu řešení jeho vzor.

15.2. Definice: Definice Laplaceovy transformace

Nechť $f(t)$ je funkce splňující podmínky:

- a) $f(t)$ je spojitá pro $t > 0$,
- b) $f(t) = 0$ pro $t \leq 0$,
- c) $f(t)$ je exponenciálního řádu, tj. existují konstanty $M > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tak, že $|f(t)| \leq Me^{-\alpha t}$.

Pak funkce $F(z) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-zt} dt$ se nazývá **Laplaceova transformace funkce $f(t)$** . Funkce $f(t)$ se nazývá **vzor** a $F(z)$ **obraz**.

(Obecně je z komplexní proměnná, pro naše účely však postačí $z \geq 0$.)

15.3. Označení:

Laplaceovu transformaci (dále LT) značíme $L(f(t)) = F(z)$ a zpětnou (inverzní) transformaci značíme $L^{-1}(F(z)) = f(t)$.

15.4. Věta: Vztah mezi vzorem a obrazem

Mezi původní funkcí $f(t)$ a její LT $F(z)$ existuje vzájemně jednoznačný vztah.

15.5. Příklad: Najděte LT funkce $f(t) = e^{at}$.

Řešení:

$$F(z) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-zt} dt = \int_0^{\infty} e^{-t(z-a)} dt = -\frac{1}{z-a} \left[e^{-t(z-a)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{z-a}$$

15.6. Věta: Linearita LT

LT i zpětná LT je lineární je lineární, tj. pro libovolné konstanty $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, aspoň jedna konstanta je nenulová,

$$\text{platí: } L\left(\sum_{i=1}^n c_i f_i(t)\right) = \sum_{i=1}^n c_i L(f_i(t)) \text{ a } L^{-1}\left(\sum_{i=1}^n c_i F_i(z)\right) = \sum_{i=1}^n c_i L^{-1}(F_i(z))$$

15.7. Věta: LT derivace funkce

Pro LT derivace platí: $L(f'(t)) = zF(z) - f(0)$.

15.8. Věta: LT n-té derivace funkce

Pro LT n-té derivace platí: $L(f^{(n)}(t)) = z^n F(z) - z^{n-1}f(0) - z^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$.

15.9. Poznámka: Uvedeme stručný operátorový slovník.

Vzor $f(t)$	Obraz $F(z)$
1	$1/z$
t	$1/z^2$
e^{at}	$1/(z-a)$
$t e^{at}$	$1/(z-a)^2$
$A e^{-at}$	$A/(z+a)$
$t^k e^{-at}$	$k!/(z+a)^{k+1}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

15.10. Příklad: Užitím LT vyřešte diferenciální rovnici $y'(t) + y(t) = e^{-2t}$ s počáteční podmínkou $y(0) = 0$.

Řešení: $zY(z) - y(0) + Y(z) = \frac{1}{z+2} \Rightarrow Y(z) = \frac{1}{(z+1)(z+2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+2} = \frac{1}{z+1} + \frac{-1}{z+2}$

$$1 = A(z+2) + B(z+1)$$

$$2A + B = 1 \Rightarrow 2A - A = 1 \Rightarrow A = 1$$

$$A + B = 0 \Rightarrow B = -A \Rightarrow B = -1$$

$$y(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{z+1} + \frac{-1}{z+2}\right) = L^{-1}\left(\frac{1}{z+1}\right) + L^{-1}\left(\frac{-1}{z+2}\right) = e^{-t} - e^{-2t}$$

Zkouška: $y'(t) = -e^{-t} + 2e^{-2t}$

$$-e^{-t} + 2e^{-2t} + e^{-t} - e^{-2t} = e^{-2t} \text{ - splněno}$$

Počáteční podmínka: $y(0) = 1 - 1 = 0$ - splněno

15.11. Příklad: Užitím LT najděte řešení systému lineárních diferenciálních rovnic

$$2y_1'(t) - y_2'(t) + y_2(t) = 0$$

$$y_1(t) - 3y_2'(t) + 2y_2(t) = 1$$

s počátečními podmínkami $y_1(0) = y_2(0) = 0$.

Řešení:

$$2[zY_1(z) - y_1(0)] - [zY_2(z) - y_2(0)] + Y_2(z) = 0 \Rightarrow 2zY_1(z) + (1 - z)Y_2(z) = 0$$

$$Y_1(z) - 3[zY_2(z) - y_2(0)] + 2Y_2(z) = \frac{1}{z} \Rightarrow Y_1(z) + (2 - 3z)Y_2(z) = \frac{1}{z}$$

Řešením systému těchto dvou rovnic získáme $Y_2(z) = \frac{-2}{z - \frac{1}{2}} + \frac{2}{z - \frac{1}{3}}$, tedy $y_2(t) = -2e^{\frac{t}{2}} + 2e^{\frac{t}{3}}$.

Z 2. rovnice plyne, že $y_1(t) = 1 + 3y_2'(t) - 2y_2(t) = 1 + 3\left(-e^{\frac{t}{2}} + \frac{2}{3}e^{\frac{t}{3}}\right) + 4e^{\frac{t}{2}} - 4e^{\frac{t}{3}} = 1 + e^{\frac{t}{2}} - 2e^{\frac{t}{3}}$.

Celkem: $y_1(t) = 1 + e^{\frac{t}{2}} - 2e^{\frac{t}{3}}$, $y_2(t) = -2e^{\frac{t}{2}} + 2e^{\frac{t}{3}}$.

Zkouška: $y_1'(t) = \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}} - \frac{2}{3}e^{\frac{t}{3}}$, $y_2'(t) = -e^{\frac{t}{2}} + \frac{2}{3}e^{\frac{t}{3}}$

1. rovnice: $e^{\frac{t}{2}} - \frac{4}{3}e^{\frac{t}{3}} + e^{\frac{t}{2}} - \frac{2}{3}e^{\frac{t}{3}} - 2e^{\frac{t}{2}} + 2e^{\frac{t}{3}} = 0$ - splněno, 2. rovnice: $1 + e^{\frac{t}{2}} - 2e^{\frac{t}{3}} + 3e^{\frac{t}{2}} - 2e^{\frac{t}{3}} - 4e^{\frac{t}{2}} + 4e^{\frac{t}{3}} = 0$ - splněno

Počáteční podmínky: $y_1(0) = 1 + 1 - 2 = 0$, $y_2(0) = -2 + 2 = 0$ - splněno.

15.12. Věta: Kolmogorovovy systémy a systém evolučních diferenciálních rovnic

Nechť $\{X_t; t \in T\}$ je homogenní markovský řetězec se spojitým časem, který má systém matic přechodu $\{P(t); t \in T\}$, systém vektorů absolutních pravděpodobností $\{p(t); t \in T\}$, vektor počátečních pravděpodobností $p(0)$ a matici intenzit přechodu Q . Pak platí:

- a) $P'(t) = P(t)Q$ s počáteční podmínkou $P(0) = I$ (Kolmogorovův systém prospektivních diferenciálních rovnic)
- b) $P'(t) = QP(t)$ s počáteční podmínkou $P(0) = I$ (Kolmogorovův systém retrospektivních diferenciálních rovnic)
- c) $p'(t) = p(t)Q$ s počáteční podmínkou $p(0) =$ daný stochastický vektor (systém evolučních diferenciálních rovnic).

15.13. Věta: Věta o řešení Kolmogorovových systémů a systému evolučních diferenciálních rovnic

Nechť Q je kvazistochastická matice řádu n . Pak platí:

- a) Existuje jediné řešení systému prospektivních a retrospektivních Kolmogorovových diferenciálních rovnic s počáteční podmínkou $P(0) = I$. Toto řešení představuje systém matic přechodu HMŘ se SČ s množinou stavů $J = \{1, 2, \dots, n\}$.
- b) Existuje jediné řešení systému evolučních diferenciálních rovnic s počáteční podmínkou $p(0) =$ daný stochastický vektor. Toto řešení představuje systém vektorů absolutních pravděpodobností HMŘ se SČ s množinou stavů $J = \{1, 2, \dots, n\}$.

15.14. Příklad: Necht' $\{X_t; t \in T\}$ je homogenní markovský řetězec se spojitým časem, který má množinu stavů $J = \{1, 2\}$,

matici intenzit přechodu $Q = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ a vektor počátečních pravděpodobností $p(0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

a) Najděte vektor stacionárních pravděpodobností.

b) Najděte vyjádření pro vektor absolutních pravděpodobností a c) matici přechodu.

Řešení:

Ad a) Hledáme vektor a tak, aby $aQ = 0$, $a_1 + a_2 = 1$.

$$(a_1, a_2) \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0), a_1 + a_2 = 1 \Rightarrow a_2 = 1 - a_1$$

$$-2a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow 2a_1 - 1 + a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{3}, a_2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \text{ tedy } a = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Ad b) Řešíme systém evolučních diferenciálních rovnic $p'(t) = p(t)Q$ s počáteční podmínkou $p(0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

$$(p_1'(t), p_2'(t)) = (p_1(t), p_2(t)) \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, p_1(t) + p_2(t) = 1 \Rightarrow p_2(t) = 1 - p_1(t)$$

$$p_1'(t) = -2p_1(t) + p_2(t) \Rightarrow p_1'(t) = -2p_1(t) + 1 - p_1(t), p_1(0) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Laplaceův obraz: } zP_1(z) - p_1(0) = -2P_1(z) + \frac{1}{z} - P_1(z) \Rightarrow P_1(z)(z+3) = \frac{1}{z} + \frac{1}{2} = \frac{z+2}{2z} \Rightarrow P_1(z) = \frac{z+2}{2z(z+3)} = \frac{\frac{2}{3}}{2z} + \frac{\frac{1}{6}}{z+3}$$

$$p_1(t) = L^{-1} \left(\frac{\frac{1}{3}}{z} + \frac{\frac{1}{6}}{z+3} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} e^{-3t}, p_2(t) = 1 - p_1(t) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} e^{-3t}. \text{ Zkouška vyjde.}$$

Ad c) Řešíme systém perspektivních Kolmogorovových diferenciálních rovnic $\mathbf{P}'(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{Q}$ s počáteční podmínkou $\mathbf{P}(0) = \mathbf{I}$.

$$\begin{pmatrix} p_{11}'(t) & p_{12}'(t) \\ p_{21}'(t) & p_{22}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) \\ p_{21}(t) & p_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, p_{11}(t) + p_{12}(t) = 1 \Rightarrow p_{12}(t) = 1 - p_{11}(t), p_{21}(t) + p_{22}(t) = 1 \Rightarrow p_{22}(t) = 1 - p_{21}(t)$$

$$p_{11}'(t) = -2p_{11}(t) + p_{12}(t) \Rightarrow p_{11}'(t) = -2p_{11}(t) + 1 - p_{12}(t), p_{11}(0) = 1.$$

$$\text{Laplaceův obraz: } zP_{11}(z) - p_{11}(0) = -2P_{11}(z) + \frac{1}{z} - P_{11}(z) \Rightarrow P_{11}(z)(z+3) = \frac{1}{z} + 1 = \frac{z+1}{z} \Rightarrow P_{11}(z) = \frac{z+1}{z(z+3)} = \frac{1}{2z} + \frac{2}{z+3}$$

$$p_{11}(t) = L^{-1} \left(\frac{1}{z} + \frac{2}{z+3} \right) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3t}, p_{12}(t) = 1 - p_{11}(t) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} e^{-3t}.$$


$$p_{21}'(t) = -2p_{21}(t) + p_{22}(t) \Rightarrow p_{21}'(t) = -2p_{21}(t) + 1 - p_{21}(t), p_{21}(0) = 0.$$

$$\text{Laplaceův obraz: } zP_{21}(z) - p_{21}(0) = -2P_{21}(z) + \frac{1}{z} - P_{21}(z) \Rightarrow P_{21}(z)(z+3) = \frac{1}{z} \Rightarrow P_{21}(z) = \frac{1}{z(z+3)} = \frac{1}{2z} + \frac{-1}{z+3}$$

$$p_{21}(t) = L^{-1} \left(\frac{1}{z} + \frac{-1}{z+3} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} e^{-3t}, p_{22}(t) = 1 - p_{21}(t) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} e^{-3t}.$$

$$\mathbf{P}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} + e^{-3t} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Průběhy funkcí popisujících absolutní pravděpodobnosti



Průběhy funkcí popisujících pravděpodobnosti přechodu

