

orním Raduňském jezeře za období 1961-1970

hloubka	I	VII
[m]	[°C]	[°C]
1	0.8	17.9
2	0.9	17.9
3	0.9	17.8
4	0.9	17.8
5	1.0	17.5
6	1.0	17.2
7	1.1	16.9
8	1.2	16.4
9	1.3	16.0
10	1.4	15.7
11	1.5	14.9
12	1.6	14.9
13	1.7	13.3
14	1.8	11.4
15	1.9	10.9
16	2.1	9.8
17	2.2	9.6
18	2.4	9.4
20	2.6	9.2
22	2.9	9.1
24	3.2	8.9
26	3.4	8.8
28	3.5	8.7
30	3.6	8.6
32	3.7	8.5
34	3.8	8.4
36	3.9	8.4
38	4.0	8.4
40	4.0	8.3
-42	4.0	8.3

hloubka [m]	Morské oko	Izra
	(Vihorlat) 5/20/1932 [°C]	(Slánské vrchy) 8/25/1932 [°C]
0	14.6	17.3
1	14.2	17.2
2	13.2	17.1
3	12.1	16.5
4	10.7	15.1
5	8.8	13.2
6	6.8	9.8
7	5.6	7.8
8	5.2	7.5
10	4.8	
16	4.7	
20	4.4	
22	4.4	

1. Na základě údajů o průměrné měsíční lednové a červencové teplotě vody v Horním Raduňském jezeři
2. Podle údajů v Tab. 2 graficky znázorněte vertikální zvrstvení teploty vody uvedených jezer (data musí

e (Polsko) z období 1961-1970 (Tab. 1) sestrojte grafy změn teploty vody s hloubkou jezera v jednotlivých letech (vynést do grafu), vyznačte skočnou vrstvu a vysvětlete rozdíly mezi oběma jezery.

ch měsících a vzájemně je porovnejte.