



# ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I.

setkání páté



**prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.**

**UKB, pav.A1, IBA LF MU, dv.č.613  
holcik@iba.muni.cz**

© Institut biostatistiky a analýz

# MATEMATICKÁ BIOLOGIE

---

## POPULAČNÍ BIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE

# MATEMATICKÁ BIOLOGIE

## Populační biologie se zabývá

- vzájemnými vztahy mezi jedinci
- limitní hustotou jedinců
- reprodukčním potenciálem
- délkou životního cyklu a jeho dílčích fází
- meziročními změnami uvnitř populací atd.

## K čemu je to dobré?

Ochrana přírody, výroba potravin (živočišných, rostlinných) i technických plodin, produkce dřevní hmoty atd.

# MATEMATICKÁ BIOLOGIE

**Epidemiologie** jako odvětví medicíny studuje faktory ovlivňující zdraví a nemocnost obyvatelstva. Její výsledky slouží jako poklad k zdůvodnění lékařských zásahů v zájmu veřejného zdraví a zdravotní prevence.


Je považována za základ výzkumné metodologie ve zdravotnictví a pomáhá medicíně založené na důkazech, protože rozpoznává rizikové faktory přenosu nemocí a určuje a hodnotí (optimální) postupy jejich léčby.

Zahrnuje zkoumání vzniku nemoci, výběr vhodné studie, sběr a analýzu dat s ohledem na vývoj matematických modelů, sestavení hypotézy, .... Souvisí i z dalšími odvětvími - biologie je potřeba k pochopení působení nemocí, společenské vědy jako sociologie a filozofie pomáhají vyhodnotit bezprostřední i méně aktuální rizikové faktory.

Dělí se na *epidemiologii obecnou*, zabývající se metodologií práce a obecnými epidemiologickými zákonitostmi a *speciální epidemiologii* konkrétních nemocí.

# MATEMATICKÁ BIOLOGIE

**Epidemiologie** jako odvětví medicíny studuje faktory ovlivňující zdraví a nemocnost obyvatelstva. Její výsledky slouží jako poklad k zdůvodnění lékařských zásahů v zájmu veřejného zdraví a zdravotní prevence.



# MATEMATICKÁ BIOLOGIE

**Demografie** (δῆμος - lid γράφω - píši, popisuji, měřím) je obor, který se zabývá procesy reprodukce lidských populací.

Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání.

Procesy demografické reprodukce jsou *úmrtnost* (též mortalita), *nemocnost*, *porodnost* (též natalita), *potratovost*, *sňatečnost* a *rozvodovost*.



# MATEMATICKO – BIOLOGICKÝ TESTÍK

Jak je definována Fibonacciova posloupnost?

a)  $x_{n+1} = x_n + 1; x_0 = 0; \{x_n\} = \{0, 1, 2, \dots\}$

b)  $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}; x_0 = 0, x_1 = 1;$   
 $\{x_n\} = \{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$

c)  $x_{n+1} = 2x_n; x_0 = 1; \{x_n\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$

d)  $x_{n+1} = x_n(x_n - 1) + 1; x_0 = 2;$   
 $\{x_n\} = \{2, 3, 7, 43, 1807, \dots\}$

# MATEMATICKO – BIOLOGICKÝ TESTÍK

Jak je definována Fibonacciova posloupnost?

a)  $x_{n+1} = x_n + 1; x_0 = 0; \{x_n\} = \{0, 1, 2, \dots\}$

**b)  $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}; x_0 = 0, x_1 = 1;$   
 $\{x_n\} = \{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$**

c)  $x_{n+1} = 2x_n; x_0 = 1; \{x_n\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$

d)  $x_{n+1} = x_n(x_n - 1) + 1; x_0 = 2;$   
 $\{x_n\} = \{2, 3, 7, 43, 1807, \dots\}$



# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## Leonardo z Pisy, Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo, Leonardo Bonacci, Fibonacci

(1170? – 1250?)

italský matematik  
propagace arabských číslic v Evropě  
Fibonacciho posloupnost  
1202 – Liber abaci (Kniha o výpočtech)

Příklad:

Muž má v určitém uzavřeném místě pár králíků.  
Vypočítejte kolik tam bude za rok z tohoto páru  
králíků, pokud předpokládáme, že se za měsíc narodí  
další pár a ten se v dalším měsíci bude dál  
rozmnožovat stejným způsobem.



$$P_{n+1} = P_n + P_{n-1}; P_0 = 0; P_1 = 1;$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$P_n$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## Leonardo z Pisy, Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo, Leonardo Bonacci, Fibonacci

(1170? – 1250?)


italský matematik  
propagace arabských číslic v Evropě  
Fibonacciova posloupnost  
1202 – Liber abaci (Kniha o výpočtech)

Příklad:

Muž má v určitém uzavřeném místě pár králíků.  
Vypočítejte kolik tam bude za rok z tohoto páru  
králíků, pokud předpokládáme, že se za měsíc narodí  
další pár a ten se v dalším měsíci bude dál  
rozmnožovat stejným způsobem.

$$P_{n+1} = P_n + P_{n-1}; P_0 = 0; P_1 = 1;$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$P_n$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233





# ODBOČKA – ZLATÝ ŘEZ





$$\frac{b}{a} = \frac{a}{a+b}$$

$$\frac{a}{b} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848 \dots$$



$$\varphi = \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$$



# ODBOČKA – ZLATÝ ŘEZ



$$\frac{b}{a} = \frac{a}{a+b}$$

$$\frac{a}{b} = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848 \dots$$

## FIBONACCIOVA POSLOUPNOST

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P <sub>n</sub>	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

### poměr sousedních hodnot posloupnosti:



$$1/1 = 1,000 \quad 2/1 = 2,000 \quad 3/2 = 1,5 \quad 5/3 = 1,667 \quad 8/5 = 1,600$$
$$13/8 = 1,625 \quad 21/13 = 1,615 \quad 34/21 = 1,619 \quad 55/34 = 1,617 \quad \dots$$

# ODBOČKA – ZLATÝ ÚHEL



$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta}{360^\circ}$$

## ❖ fytotaxie



počet korunních lístků	květina
3	iris, lilie
5	pryskyřník, orlíček, stračka, hvozdík, šípek
8	krásnoočko, stračka
13	cinerárie, aksamitník, přímětník
21	astra, čekanka
34	jitrocel, sedmikráska, kopretina
55	sedmikráska, slunečnice
89	sedmikráska, slunečnice
144	slunečnice


# POPULAČNÍ BIOLOGIE



**Sir William Petty**  
(1623–1687)

anglický ekonom, statistik a lékař,  
profesor hudby, námořník a vynálezce

údaje o křtech a pohřbech v  
londýnské farnosti  
od roku 1592



**John Graunt**  
(1620–1674)

londýnský obchodník s textilem a  
galanterií

**Natural and Political  
Observations Made Upon  
the Bills of Mortality** (1662)

celkem pět vydání až  
do roku 1676

London 35	From the 15 of August to the 22.	1665
of A. D. Woodhouse 11	of George Bumbelton 11	of Martin Ludgove 11
of A. D. Woodhouse 12	of George Bumbelton 12	of Martin Ludgove 12
of A. D. Woodhouse 13	of George Bumbelton 13	of Martin Ludgove 13
of A. D. Woodhouse 14	of George Bumbelton 14	of Martin Ludgove 14
of A. D. Woodhouse 15	of George Bumbelton 15	of Martin Ludgove 15
of A. D. Woodhouse 16	of George Bumbelton 16	of Martin Ludgove 16
of A. D. Woodhouse 17	of George Bumbelton 17	of Martin Ludgove 17
of A. D. Woodhouse 18	of George Bumbelton 18	of Martin Ludgove 18
of A. D. Woodhouse 19	of George Bumbelton 19	of Martin Ludgove 19
of A. D. Woodhouse 20	of George Bumbelton 20	of Martin Ludgove 20
of A. D. Woodhouse 21	of George Bumbelton 21	of Martin Ludgove 21
of A. D. Woodhouse 22	of George Bumbelton 22	of Martin Ludgove 22
of A. D. Woodhouse 23	of George Bumbelton 23	of Martin Ludgove 23
of A. D. Woodhouse 24	of George Bumbelton 24	of Martin Ludgove 24
of A. D. Woodhouse 25	of George Bumbelton 25	of Martin Ludgove 25
of A. D. Woodhouse 26	of George Bumbelton 26	of Martin Ludgove 26
of A. D. Woodhouse 27	of George Bumbelton 27	of Martin Ludgove 27
of A. D. Woodhouse 28	of George Bumbelton 28	of Martin Ludgove 28
of A. D. Woodhouse 29	of George Bumbelton 29	of Martin Ludgove 29
of A. D. Woodhouse 30	of George Bumbelton 30	of Martin Ludgove 30
of A. D. Woodhouse 31	of George Bumbelton 31	of Martin Ludgove 31
of A. D. Woodhouse 32	of George Bumbelton 32	of Martin Ludgove 32
of A. D. Woodhouse 33	of George Bumbelton 33	of Martin Ludgove 33
of A. D. Woodhouse 34	of George Bumbelton 34	of Martin Ludgove 34
of A. D. Woodhouse 35	of George Bumbelton 35	of Martin Ludgove 35
of A. D. Woodhouse 36	of George Bumbelton 36	of Martin Ludgove 36
of A. D. Woodhouse 37	of George Bumbelton 37	of Martin Ludgove 37
of A. D. Woodhouse 38	of George Bumbelton 38	of Martin Ludgove 38
of A. D. Woodhouse 39	of George Bumbelton 39	of Martin Ludgove 39
of A. D. Woodhouse 40	of George Bumbelton 40	of Martin Ludgove 40
of A. D. Woodhouse 41	of George Bumbelton 41	of Martin Ludgove 41
of A. D. Woodhouse 42	of George Bumbelton 42	of Martin Ludgove 42
of A. D. Woodhouse 43	of George Bumbelton 43	of Martin Ludgove 43
of A. D. Woodhouse 44	of George Bumbelton 44	of Martin Ludgove 44
of A. D. Woodhouse 45	of George Bumbelton 45	of Martin Ludgove 45
of A. D. Woodhouse 46	of George Bumbelton 46	of Martin Ludgove 46
of A. D. Woodhouse 47	of George Bumbelton 47	of Martin Ludgove 47
of A. D. Woodhouse 48	of George Bumbelton 48	of Martin Ludgove 48
of A. D. Woodhouse 49	of George Bumbelton 49	of Martin Ludgove 49
of A. D. Woodhouse 50	of George Bumbelton 50	of Martin Ludgove 50
of A. D. Woodhouse 51	of George Bumbelton 51	of Martin Ludgove 51
of A. D. Woodhouse 52	of George Bumbelton 52	of Martin Ludgove 52
of A. D. Woodhouse 53	of George Bumbelton 53	of Martin Ludgove 53
of A. D. Woodhouse 54	of George Bumbelton 54	of Martin Ludgove 54
of A. D. Woodhouse 55	of George Bumbelton 55	of Martin Ludgove 55
of A. D. Woodhouse 56	of George Bumbelton 56	of Martin Ludgove 56
of A. D. Woodhouse 57	of George Bumbelton 57	of Martin Ludgove 57
of A. D. Woodhouse 58	of George Bumbelton 58	of Martin Ludgove 58
of A. D. Woodhouse 59	of George Bumbelton 59	of Martin Ludgove 59
of A. D. Woodhouse 60	of George Bumbelton 60	of Martin Ludgove 60
of A. D. Woodhouse 61	of George Bumbelton 61	of Martin Ludgove 61
of A. D. Woodhouse 62	of George Bumbelton 62	of Martin Ludgove 62
of A. D. Woodhouse 63	of George Bumbelton 63	of Martin Ludgove 63
of A. D. Woodhouse 64	of George Bumbelton 64	of Martin Ludgove 64
of A. D. Woodhouse 65	of George Bumbelton 65	of Martin Ludgove 65
of A. D. Woodhouse 66	of George Bumbelton 66	of Martin Ludgove 66
of A. D. Woodhouse 67	of George Bumbelton 67	of Martin Ludgove 67
of A. D. Woodhouse 68	of George Bumbelton 68	of Martin Ludgove 68
of A. D. Woodhouse 69	of George Bumbelton 69	of Martin Ludgove 69
of A. D. Woodhouse 70	of George Bumbelton 70	of Martin Ludgove 70
of A. D. Woodhouse 71	of George Bumbelton 71	of Martin Ludgove 71
of A. D. Woodhouse 72	of George Bumbelton 72	of Martin Ludgove 72
of A. D. Woodhouse 73	of George Bumbelton 73	of Martin Ludgove 73
of A. D. Woodhouse 74	of George Bumbelton 74	of Martin Ludgove 74
of A. D. Woodhouse 75	of George Bumbelton 75	of Martin Ludgove 75
of A. D. Woodhouse 76	of George Bumbelton 76	of Martin Ludgove 76
of A. D. Woodhouse 77	of George Bumbelton 77	of Martin Ludgove 77
of A. D. Woodhouse 78	of George Bumbelton 78	of Martin Ludgove 78
of A. D. Woodhouse 79	of George Bumbelton 79	of Martin Ludgove 79
of A. D. Woodhouse 80	of George Bumbelton 80	of Martin Ludgove 80
of A. D. Woodhouse 81	of George Bumbelton 81	of Martin Ludgove 81
of A. D. Woodhouse 82	of George Bumbelton 82	of Martin Ludgove 82
of A. D. Woodhouse 83	of George Bumbelton 83	of Martin Ludgove 83
of A. D. Woodhouse 84	of George Bumbelton 84	of Martin Ludgove 84
of A. D. Woodhouse 85	of George Bumbelton 85	of Martin Ludgove 85
of A. D. Woodhouse 86	of George Bumbelton 86	of Martin Ludgove 86
of A. D. Woodhouse 87	of George Bumbelton 87	of Martin Ludgove 87
of A. D. Woodhouse 88	of George Bumbelton 88	of Martin Ludgove 88
of A. D. Woodhouse 89	of George Bumbelton 89	of Martin Ludgove 89
of A. D. Woodhouse 90	of George Bumbelton 90	of Martin Ludgove 90
of A. D. Woodhouse 91	of George Bumbelton 91	of Martin Ludgove 91
of A. D. Woodhouse 92	of George Bumbelton 92	of Martin Ludgove 92
of A. D. Woodhouse 93	of George Bumbelton 93	of Martin Ludgove 93
of A. D. Woodhouse 94	of George Bumbelton 94	of Martin Ludgove 94
of A. D. Woodhouse 95	of George Bumbelton 95	of Martin Ludgove 95
of A. D. Woodhouse 96	of George Bumbelton 96	of Martin Ludgove 96
of A. D. Woodhouse 97	of George Bumbelton 97	of Martin Ludgove 97
of A. D. Woodhouse 98	of George Bumbelton 98	of Martin Ludgove 98
of A. D. Woodhouse 99	of George Bumbelton 99	of Martin Ludgove 99
of A. D. Woodhouse 100	of George Bumbelton 100	of Martin Ludgove 100

# POPULAČNÍ BIOLOGIE



## Caspar Neumann

(1648 – 1715)

německý profesor a duchovní

shromáždil data o narození a úmrtí (včetně věku) ve Wroclavi v letech 1687-1691

„Reflexionen über Leben und Tod bey denen in Breslau Geborenen und Gestorbenen“

„**An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, Drawn from Courious Tables of the Births and Funerals at the City of Breslaw, with an Attempt to Ascertain the Price of Annuities upon Lives**“ (1693)



## Edmond Halley

(1656 – 1742)

anglický astronom, fyzik, geofyzik, matematik, meteorolog a demograf



na konci 17. století zkonstruoval první úmrtnostní tabulky na základě záznamů o úmrtích a porodech a odhadl předpokládané počty lidí v relativně uzavřené, stacionární populaci podle jednotlivých věkových skupin.

# POPULAČNÍ BIOLOGIE



## Leonhard Euler

(1707-1783)

švýcarský matematik (teorie čísel, algebra, nekonečné řady, elementární funkce, komplexní čísla, teorie grafů, diferenciální a integrální počet včetně rovnic, optimalizace, geometrie,...), fyzik (astronomie, pružnost, tekutiny, pevná tělesa,...), ...



# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## Leonhard Euler

### *Introductio in analysin infinitorum*

(1748)

v kapitole o exponenciálách a logaritmech měl šest příkladů – jeden s hudební aplikací, jeden finanční – splácení úročené půjčky, čtyři z populační dynamiky


$$P_{n+1} = (1+x) \cdot P_n,$$

kde  $n$  je celé číslo a růstový parametr  $x$  nabývá reálných kladných hodnot

se zohledněním počáteční podmínky

$$P_n = (1+x)^n \cdot P_0$$


(geometrický, resp. exponenciální růst)



# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## Leonhard Euler

### *Introductio in analysin infinitorum* (1748)



1. Pokud populace v určitém regionu poroste s rychlostí 1/30 a v určitém čase tam žije 100 000 obyvatel, jaká bude velikost populace za 100 let? ( $\sim 2\,654\,874$  osob)
2. Pokud se velikost populace po biblické Potopě redukovala na 6 osob a pokud předpokládáme, že za 200 let žilo na Zemi milión lidí, jaký byl roční přírůstek? ( $1/16 \sim 6,25\%$ )
3. Pokud by se každých sto let populace zdvojnásobila, jaký bude roční přírůstek? ( $1/144$ )
4. Pokud populace ročně poroste s rychlostí 1/100, za jak dlouho bude desetkrát tak velká?

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## JEDNODRUHOVÉ POPULACE

Modelování dynamiky jednodruhových populací je založeno na deterministickém způsobu chování populace, přičemž stav populace je charakterizován její velikostí.

Otázky, které mohou jednopopulační modely pomoci řešit jsou např.:

- ☑ jak dlouho potrvá, než populace dosáhne určité velikosti?
- ☑ jak velká bude populace po určitém časovém intervalu, příp. po daném počtu generací?
- ☑ jak dlouho může populace přežít v nevhodných životních podmínkách?

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## JEDNODRUHOVÁ POPULACE

Nechť  $x(t)$  označuje hodnotu populační hustoty v čase  $t$ . Potom stav populace v čase  $t+\Delta t$  je závislý na hodnotě  $x(t)$  v čase  $t$  modifikovaný procesy, které se v dané populaci odehrávají.

$$x(t+\Delta t) = x(t) + \Delta x_b - \Delta x_d + \Delta x_m,$$

kde  $\Delta x_b$  znamená přírůstek za dobu  $\Delta t$  způsobený porodností,  $\Delta x_d$  úbytek způsobený úmrtností a  $\Delta x_m$  představuje změnu vyvolanou migrací. Protože  $\Delta x_m$  představuje jak nárůst, tak úbytek jedinců v populaci, zahrnuje se tento člen v jednodušších variantách modelu ke výrazům vyjadřujícím porodnost a úmrtnost. V takovém případě platí

$$x(t+\Delta t) = x(t) + \Delta x_b - \Delta x_d.$$

Je-li  $\Delta x_b$  počet jedinců, kteří se narodili za dobu  $\Delta t$ , pak platí

$$\Delta x_b = B(x,t) \cdot \Delta t$$

kde  $B(x,t)$  je *porodnost*, tj. počet jedinců, kteří se narodí za časovou jednotku. Podobně

$$\Delta x_d = D(x,t) \cdot \Delta t,$$

kde  $D(x,t)$  je *úmrtnost*, tj. počet jedinců, kteří za časovou jednotku zemřou.

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## JEDNODRUHOVÁ POPULACE

Vztáhneme-li oba výše definované parametry ke stavu populace, získáváme relativní parametry,

tj. *relativní porodnost*  $b(x,t) = B(x,t) / x(t)$

a *relativní úmrtnost*  $d(x,t) = D(x,t) / x(t)$ .

Pak

$$x(t+\Delta t) = x(t) + (b(x,t) - d(x,t)) \cdot x(t) \cdot \Delta t,$$

případně

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \gamma(x,t) \cdot x(t)$$

kde  $\gamma(x,t) = b(x,t) - d(x,t)$  je obecná funkce vyjadřující základní dynamické charakteristiky daného populačního modelu.

V limitním případě, kdy  $\Delta t \rightarrow 0$ , můžeme psát

$$x'(t) = \gamma(x,t) \cdot x(t),$$

což je obecné deterministické vyjádření dynamiky stavu populace  $x(t)$  za předpokladu, že tento stav můžeme popsat spojitou funkcí.

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## JEDNODRUHOVÁ POPULACE

Stav populace  $x(t)$  můžeme popsat spojitou funkcí (z biologického hlediska), když:

- ☑ populace  $x(t)$  je natolik velká, že není třeba počítat s jednotlivci (*kvantovací podmínka*);
- ☑ generace v populaci  $x(t)$  se překrývají, resp. všechny jedinci v populaci jsou identičtí (neexistuje věkové rozlišení), tj. populace je homogenní z hlediska jedinců v produkčním věku (*vzorkovací podmínka*) - zatímco populace bakterií, příp. vyšších živočichů (obratlovců) tuto podmínku zpravidla splňují, u populací hmyzu nebo např. jednoletých rostlin nastávají problémy.

# POPULAČNÍ BIOLOGIE



## Thomas Robert Malthus

(1766 – 1834)


anglický duchovní a ekonom

Malthusova rovnice

$$x'(t) = r \cdot x(t)$$


řešení:

$$x(t) = x_0 \cdot e^{rt}$$



# POPULAČNÍ BIOLOGIE


World population (1700–2000) and population projections (2000–2100)




Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division 2004

© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

svět



Maďarsko



Košice



# POPULAČNÍ BIOLOGIE




**Adolphe Quetelet**  
(1796 – 1874)

belgický meteorolog, astronom,  
matematik, statistik, demograf,  
sociolog, kriminolog

**„Sur l'homme et le développement  
de ses facultés“ (1835)**


překážky růstu populace reprezentují  
„odpor“, který je úměrný druhé  
mocnině rychlosti růstu populace



**Body Mass Index** (1830 – 1850)

$$\text{BMI} = \frac{m[\text{kg}]}{v^2 [\text{m}]}$$

# POPULAČNÍ BIOLOGIE



## Adolphe Quetelet

(1796 – 1874)

belgický meteorolog, astronom,  
matematik, statistik, demograf,  
sociolog, kriminolog

„**Sur l'homme et le développement  
de ses facultés**“ (1835)

překážky růstu populace reprezentují  
„odpor“, který je úměrný druhé  
mocnině rychlosti růstu populace



## Pierre-Francois Verhulst

(1804 – 1849)

belgický matematik

„**Notice sur la loi que la population poursuit dans  
son accroissement**“. *Correspondance  
mathématique et physique* 10,(1838):113–121.


$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

řešení:

$$N(t) = \frac{K}{1 + CKe^{-rt}}$$

kde  $C = 1/N_0 - 1/K$

# POPULAČNÍ BIOLOGIE



## Adolphe Quetelet

(1796 – 1874)

belgický meteorolog, astronom,  
matematik, statistik, demograf,  
sociolog, kriminolog


„**Sur l'homme et le développement  
de ses facultés**“ (1835)

překážky růstu populace reprezentují  
„odpor“, který je úměrný druhé  
mocnině rychlosti růstu populace



## Pierre-Francois Verhulst

(1804 – 1849)



počet  
obyvatel  
Belgie  
2013:

$11,2 \cdot 10^6$

# POPULAČNÍ BIOLOGIE




**Pierre-Francois Verhulst**  
(1804 – 1849)

rovnice byla znovu publikována v roce 1920 Raymondem Pearlem and Lowellem Reedem



Pearlova – Verhulstova rovnice 😊  
logistická rovnice



počet  
obyvatel  
Belgie  
2013:

$11,2 \cdot 10^6$

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## INTERAKCE DVOU POPULACÍ

mutualismus	+	+	obě populace mají ze společného soužití prospěch (symbióza)
dravec-kořist	+	-	jedna populace prospívá, druhá chřadne (parazit x hostitel, býložravec x rostlina, zaměstnavatel x zaměstnanec, aj.)
konkurence	-	-	obě populace vzájemným kontaktem trpí
komensalismus	+	0	jeden druh se živí zbytky potravy druhého, neškodné příživnictví
amensalismus	-	0	
neutralismus	0	0	oba zúčastněné druhy se nepodílí na vzájemné látkové výměně

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

---

**MODEL DRAVEC – KOŘIST**  
**MODEL LOTKY – VOLTERRY**

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

**MODEL DRAVEC – KOŘIST**

**MODEL LOTKY – VOLTERRY**



**Alfred James Lotka**

(1880 – 1949)

americký matematik, statistik,  
fyzikální chemik  
snažil se uplatnit fyzikální  
přístupy a modely v živých  
vědách



**Vito Volterra**

(1860 – 1940)

italský matematik a fyzik  
"Signor Scienza Italiana"

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## MODEL LOTKY – VOLTERRY

Předpokládejme, že  $\Delta x_n$  je počet kořistí, které se narodily v časovém intervalu  $\langle t, \Delta t \rangle$ . Dále předpokládejme, že tato hodnota je úměrná počtu kořistí  $x(t)$  v čase  $t$ , délce časového intervalu  $\Delta t$  a relativní porodnosti  $k_1$  kořistí. To znamená, že přírůstek do populace kořisti bude respektovat Malthusův model populační dynamiky

$$\Delta x_n = k_1 \cdot x(t) \cdot \Delta t.$$

Dále, necht' počet kořistí  $\Delta x_m$  ulovených  $y(t)$  dravci během časového intervalu  $\langle t, \Delta t \rangle$  je úměrný počtu vzájemných setkání jedinců obou druhů a délce časového intervalu  $\Delta t$

$$\Delta x_m = k_2 \cdot x(t) \cdot y(t) \cdot \Delta t,$$

kde konstanta  $k_2$  vyjadřuje pravděpodobnost, že setkání dravce s kořistí skončí zahubením kořisti. Tato konstanta může také vyjádřit spotřebu či potřebu dravců.

Celkovou změnu stavu populace kořistí za dobu  $\Delta t$  lze tedy určit rozdílem

$$\Delta x_n - \Delta x_m = k_1 \cdot x(t) \cdot \Delta t - k_2 \cdot x(t) \cdot y(t) \cdot \Delta t = [k_1 \cdot x(t) - k_2 \cdot x(t) \cdot y(t)] \cdot \Delta t.$$



# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## MODEL LOTKY – VOLTERRY

Nyní předpokládejme, že počet narozených dravců  $\Delta y_n$  během doby  $\Delta t$  je úměrný počtu vzájemných setkání dravců a kořistí a délce časového intervalu  $\Delta t$

$$\Delta y_n = k_2 \cdot k_3 \cdot x(t) \cdot y(t) \cdot \Delta t,$$

kde  $k_3$  je konstanta vyjadřující účinnost přeměny biomasy kořisti na biomasu dravce.

Konečně, necht' úbytek v populaci dravců  $\Delta y_m$  je opět dán Malthusovým modelem populační dynamiky, tj. je úměrný stavu populace dravců  $y(t)$  v čase  $t$  a délce časového intervalu  $\Delta t$

$$\Delta y_m = k_4 \cdot y(t) \cdot \Delta t,$$

kde konstanta úměrnosti  $k_4$  reprezentuje relativní úmrtnost dravců.

Za těchto předpokladů, je celková změna v populaci dravců dána vztahem

$$\Delta y_n - \Delta y_m = [k_2 \cdot k_3 \cdot x(t) \cdot y(t) - k_4 \cdot y(t)] \cdot \Delta t.,$$


a v limitním případě pro  $\Delta t \rightarrow 0$  můžeme psát soustavu

$$x'(t) = k_1 \cdot x(t) - k_2 \cdot x(t) \cdot y(t)$$


$$y'(t) = k_2 \cdot k_3 \cdot x(t) \cdot y(t) - k_4 \cdot y(t)$$

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## MODEL LOTKY – VOLTERRY



*Typické časové průběhy  
normalizovaných veličin modelu  
Lotky - Volterra*




*Stavové trajektorie  
normalizovaného modelu  
Lotky - Volterra*

# POPULAČNÍ BIOLOGIE


## MODEL LOTKY – VOLTERRY

### PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA

**vliv omezení porodnosti kořisti na celkový stav populace dravec x kořist**



*výsledky simulace s původními hodnotami parametrů*






*výsledky simulace s poloviční hodnotou parametru  $k_1$  oproti hodnotě původní*

# POPULAČNÍ BIOLOGIE

## MODEL LOTKY – VOLTERRY

### PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA

výklad dynamiky populace rysů  
a zajíců v Hudson Bay v letech  
1845 - 1930




# EPIDEMIOLOGIE

## MATEMATICKÉ MODELY ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB KERMACKŮV – MCKENDRICKŮV MODEL (1927)



**Anderson Gray McKendrick**  
(1876 – 1943)

skotský lékař, fyziolog a  
epidemiolog  
jeden z prvních, kteří zaváděli  
matematické metody do  
epidemiologie




**William Ogilvy Kermack**  
(1898 – 1970)

skotský matematik a statistik

# EPIDEMIOLOGIE

## MATEMATICKÉ MODELY ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB KERMACKŮV – McKENDRICKŮV MODEL (1927)




- ❖ nárůst infikovaných jedinců je úměrný počtu ohrožených a infikovaných jedinců, tj.  $\sim r.S(t).I(t)$ , kde  $r > 0$  je konstantou úměrnosti. Ohrožených osob stejnou rychlostí ubývá.
- ❖ rychlost s jakou ubývá infikovaných jedinců (vyléčením, úmrtím) je úměrná počtu infikovaných osob, tj.  $\sim a.I(t)$ .
- ❖ inkubační doba je zanedbatelná;
- ❖ populace je natolik velká, že vyvolané změny lze považovat za spojité.

$$\begin{aligned} S'(t) &= -r.S(t).I(t), & S(0) &= S_0 > 0 ; \\ I'(t) &= r.S(t).I(t) - a.I(t), & I(0) &= I_0 > 0 ; \\ R'(t) &= a.I(t), & R(0) &= R_0 = 0, \end{aligned}$$

# EPIDEMIOLOGIE

## MATEMATICKÉ MODEL Y ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB KERMACKŮV – McKENDRICKŮV MODEL (1927)







základní otázkou jakékoliv epidemiologické situace je, zda se bude pro dané parametry modelu (společnosti) a počáteční výchozí podmínky nákaza šířit a jak;

- ❖ jak vážná bude epidemie, tj. jaké maximální hodnoty nabude stav skupiny infikovaných;
- ❖ jak se bude vyvíjet stav kategorie R, zejména, je-li choroba smrtelná, apod.



$$\begin{aligned} S'(t) &= -r.S(t).I(t), & S(0) &= S_0 > 0 ; \\ I'(t) &= r.S(t).I(t) - a.I(t), & I(0) &= I_0 > 0 ; \\ R'(t) &= a.I(t), & R(0) &= R_0 = 0, \end{aligned}$$

# EPIDEMIOLOGIE

## MATEMATICKÉ MODELY ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB DALŠÍ VARIANTY



modely venerických chorob








# EPIDEMIOLOGIE

## MATEMATICKÉ MODELY ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB DALŠÍ VARIANTY

### MODEL AIDS



$x(t)$ ,  $y(t)$ ,  $a(t)$  a  $z(t)$  udávají počet zdravých, infikovaných, nemocných AIDS a séropozitivních, ale neinfekčních osob



dvojnásobný počet sexuálních partnerů

# ZA DVA TÝDNY NA SHLEDANOU