

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

¹⁹
9 **F**

A = Nukleonové (hmotnostní) číslo

A = počet protonů + počet neutronů

A = Z + N

Z = Protonové číslo, náboj jádra

Prvek = soubor atomů se stejným Z

Nuklid = soubor atomů se stejným A a Z

Izotopy = soubor nuklidů daného prvku

Izobary = nuklidy se stejným A a různým Z (¹⁴C-¹⁴N; ³H-³He)

Izotony = nuklidy se stejným počtem neutronů, N = A – Z

Izomery = stejné nuklidy, liší se obsahem energie



Frederick Soddy

(1877-1956)

NP za chemii 1921

(objev izotopů)

Izotopy

Izotopy jsou souborem nuklidů pro daný prvek
existuje asi 2600 nuklidů (stabilních i radioaktivních)
340 nuklidů se vyskytuje v přírodě
270 stabilních a 70 radioaktivních, ostatní uměle připravené

Monoizotopické prvky:

^9Be , ^{19}F , ^{23}Na , ^{27}Al , ^{31}P , ^{59}Co , ^{127}I , ^{197}Au

Polyizotopické prvky:

^1H , ^2H (D), ^3H (T)

^{10}B , ^{11}B

Sn má největší počet **stabilních** izotopů – 10

112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, ^{124}Sn

Stabilita jader

Stabilita vzhledem k radioaktivnímu rozpadu je určena počtem **protonů a neutronů**

Zóna stability

Lehké nuklidy stabilní pro $Z \sim N$ (stejný počet p a n)

Jen ^1H a ^3He mají více p než n.


^2H , ^4He , ^6Li , ^{10}B , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O , ^{20}Ne , ^{24}Mg , ^{28}Si , ^{32}S , ^{36}Ar a ^{40}Ca mají stejný počet p a n

Všechny ostatní nuklidy mají **více n než p** $N > Z$

Mattauchovo pravidlo: ze dvojice izobarů, které se liší o 1 v protonovém čísle, je jeden radioaktivní.

^{40}Ar ^{40}Ca $\Delta Z = 2$ ^{40}Ar ^{40}K ^{40}Ca $\Delta Z = 1$ ^{40}K je radioaktivní

Stabilita jader



Stabilita jader

U některých prvků existují v přírodě radioaktivní izotopy s dlouhým poločasem přeměny ^{40}K , 0,012%, $1,3 \cdot 10^{10}$ roků

Prvky s $Z \leq 83$ (po Bi) mají alespoň jeden stabilní izotop

Výjimky: $Z = 43$ (Tc), 61 (Pm) se nevyskytují v přírodě

Umělé radioaktivní izotopy připravené jadernými reakcemi

Nuklidy s $Z \geq 84$ (od Po dále) jsou nestabilní vzhledem k radioaktivnímu rozpadu = **radioaktivní prvky**

Magická čísla

Počet Protonů, Z	Počet Neutronů, N	Počet stabilních nuklidů
Sudá	Sudá	168
Sudá	Lichá	57
Lichá	Sudá	50
Lichá	Lichá	4

Nuklidy se sudým počtem p a n jsou nejčastější

Astonovo pravidlo: prvky se sudým Z mají více izotopů, prvky s lichým Z nemají více než dva izotopy, z toho jeden nestabilní, prvky s lichým počtem nukleonů (A) mají jen jeden stálý izotop (${}^9\text{Be}$, ${}^{19}\text{F}$, ${}^{23}\text{Na}$, ${}^{27}\text{Al}$, ${}^{31}\text{P}$, ${}^{59}\text{Co}$, ${}^{127}\text{I}$, ${}^{197}\text{Au}$).

Jen ${}^2\text{H}$, ${}^6\text{Li}$, ${}^{10}\text{B}$, ${}^{14}\text{N}$, ${}^{40}\text{K}$, ${}^{50}\text{V}$, ${}^{138}\text{La}$, ${}^{176}\text{Lu}$

mají lichý počet jak p tak n

Magická čísla

Magická čísla 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126

Prvky s $Z =$ magické číslo mají velký počet stabilních izotopů, pokud je izotop radioaktivní, pak má dlouhý poločas rozpadu

Sn $Z = 50$, 10 stabilních izotopů

Nuklidy ${}^4\text{He}$, ${}^{16}\text{O}$, ${}^{40}\text{Ca}$, ${}^{48}\text{Ca}$ a ${}^{208}\text{Pb}$ mají magický počet p i n

Hmotnost elektronu a nukleonů

Symbol	<i>m</i> / kg	<i>m</i> / amu
e	9,11 10⁻³¹	0,0005486
p	1,673 10⁻²⁷	1,007276
n	1,675 10⁻²⁷	1,008665

$$1 \text{ amu} = 1,6606 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Hmotnostní úbytek

Hmotnost jádra je vždy menší než součet hmotností nukleonů


$$M_j < Z m_p + (A-Z) m_n$$

Hmotnostní úbytek $\Delta m < 0$
[Δm v jednotkách amu]

Vazebná energie jádra $E_v = - \Delta m c^2$

$$E_v = - 931,5 \Delta m \text{ [MeV]}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60210 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$



NP za fyziku 1921

Vazebná energie jádra, E_v

Nuklid	E_v , MeV
${}^2\text{H}$	2.226
${}^4\text{He}$	28.296
${}^{14}\text{N}$	104.659
${}^{16}\text{O}$	127.619
${}^{40}\text{Ca}$	342.052
${}^{58}\text{Fe}$	509.945
${}^{206}\text{Pb}$	1622.340
${}^{238}\text{U}$	1822.693


Střední vazebná energie jádra, $E_v(st)$

Nuklid	$E_v(st)$, MeV	E_v , MeV
^2H	1.113	2.226
^4He	7.074	28.296
^{14}N	7.476	104.659
^{16}O	7.976	127.619
^{19}F	7.779	147.801
^{40}Ca	8.551	342.052
^{55}Mn	8.765	482.070
^{58}Fe	8.792	509.945
^{62}Ni	8.795	545.259
^{206}Pb	7.875	1622.340
^{238}U	7.658	1822.693


$E_v(st)$ = Energie na
odtržení 1 nukleonu

$$E_v(st) = \frac{E_v}{A}$$


Střední vazebná energie jádra



Střední vazebná energie jádra



Výskyt prvků ve vesmíru



Vazebná energie jádra a chemické vazby

Střední vazebná energie jádra ^{58}Fe 8.792 MeV

Energie vazby C–H 411 kJ mol⁻¹ = 4.25 eV

Jaderná vazebná energie je milionkrát větší než chemická vazebná energie.

Vazebná energie jádra a chemické

Chemické reakce se odehrávají ve vnější elektronové slupce, atomové jádro zůstává neovlivněno.

Energetické změny při chemických reakcích jednotky eV

$$1 \text{ eV (molekula)}^{-1} = 96,485 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Hmotnostní úbytek neměřitelný, platí zákon zachování hmotnosti.

Jaderné reakce mění složení jader, elektronový obal nehraje žádnou roli. Energetické změny řádu MeV. Významné hmotnostní úbytky, platí zákon zachování energie a ekvivalence hmoty a energie.


$$E = m \times c^2$$

Objev radioaktivity



Uran, Thorium

Antoine Henri Becquerel
(1852-1908)



Objev radioaktivity 1896
NP za fyziku 1903



Radium, Polonium
Marie Curie (1867-1934)
Pierre Curie (1859-1906)

NP za fyziku 1903
M. C. NP za chemii 1911

Musée Curie



Radium



Radioaktivita

Má-li jádro příliš málo nebo mnoho neutronů →



Radioaktivita = schopnost některých jader přeměňovat se na jiné jádro, emitují se menší částice a uvolňuje se energie (exo)



Radioaktivita = samovolný děj, produkty mají nižší obsah energie a jsou stabilnější

Stable Isotopes							
99%				1%			
${}^9_6\text{C}$	${}^{10}_6\text{C}$	${}^{11}_6\text{C}$	${}^{12}_6\text{C}$	${}^{13}_6\text{C}$	${}^{14}_6\text{C}$	${}^{15}_6\text{C}$	${}^{16}_6\text{C}$
.13	19	20.6			5730	2.25	.74
sec.	sec.	min.			years	sec.	sec.
Positron decay				beta decay			

Geigerův čítač



Hans Geiger
(1882-1945)



Měření radioaktivity

Radioaktivita

1 Bq (becquerel) = 1 rozpad za 1 s

(⁴⁰K v lidském těle 4 kBq) 1 Ci (curie) = 3,7 · 10¹⁰ Bq = 37 GBq

Radiační dávka

1 Gy (gray) = absorpce 1 J v 1 kg

1 Gy = 100 rad

Ekvivalentní dávka

1 Sv (sievert) = 1 Gy × Q faktor

1 Sv = 100 rem

3 Sv = LD 50/30

2 mSv/rok = dávka od kosmického záření a přirozeného
radiačního pozadí v ČR

Fotony a elektrony všech energií	Q = 1
Protony	Q = 2
Neutrony	Q je funkcí energie
Alfa částice a jiná jádra	Q = 20

Jaderné reakce

Rutherford – odklon radioaktivního záření v elektrickém a magnetickém poli

Alfa = pozitivně nabitě částice


Beta = negativně nabitě částice

Gama = neutrální částice

Tvorba nového nuklidu

Posuvové zákony – změny v Z a N


Posun v periodické tabulce



Emise alfa částice



U těžkých jader

Alfa částice opouští jádro rychlostí 10% c





Velmi malá penetrace, několik cm ve vzduchu, zastaví je list papíru

Velmi škodlivé pro buňky
Inhalace



Alfa emise

Posun v periodické tabulce o dva prvky doleva



Radium-226

Alfa emise

Kalifornium-252

Curium-240


Uran-232

Zlato-185

Thorium-230

Americium-241 detektory kouře

Polonium-210




Posun v periodické tabulce o dva prvky doleva

Beta částice ${}_{-1}^0e$

Jádra s nadbytkem neutronů, nedostatek protonů


Beta částice jsou elektrony (ale ne z elektronového obalu!!!)

Vznikají rozpadem neutronu





e opouští jádro rychlostí 90% c

Penetrace větší než alfa, několik m ve vzduchu,
zastaví je 1 cm Al folie



Beta emise

Posun v periodické tabulce o jeden prvek doprava



Krypton-87

Beta emise

Zinek-71

Křemík-32


Kobalt-60

Hořčík-27

Sodík-24

Železo-59

Fosfor-32



Posun v periodické tabulce o jeden prvek
doprava


Gama částice

Jádra s nadbytkem energie emitují gama částice

Elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou,
Vysoká energie, MeV

Rychlost světla



Hluboká penetrace, 500 m ve vzduchu



Tracer



Gyorgy Hevesy 1913

NP 1943



Positronová emise 0_1e


Jádra s nadbytkem protonů, nedostatek neutronů



Positron (antičástice) se rekombinuje během 10^{-10} s

Velmi malá penetrace

Anihilace ${}^0_1e + {}^0_{-1}e \rightarrow \gamma$



Posun v periodické tabulce o jeden prvek doleva

Positronová emise

Rubidium-81

Germanium-66


Praseodym-140

Neon-18

Kyslík-15



Dusík-13

Měď-59



Posun v periodické tabulce o jeden prvek doleva


PET





Elektronový záchyt

Elektron z elektronového obalu atomu může být zachycen jádrem

Zachycený e přemění p na n,
e z vnější slupky klesne na volnou hladinu,
emise rentgenového záření



Jádra s $Z > 83$ nemohou dosáhnout stability beta emisí,
pozitronovou emisí nebo elektronovým záchytem




Rubidium-83

Elektronový záchyt

Vanad-48

Gallium-67




Beryllium-7


Vápník-41

Kobalt-57

Selen-72



Posun v periodické tabulce o jeden prvek doleva



Rozpadové řady

Thoriová ^{232}Th - ^{208}Pb

$$A = 4n$$

Neptuniová (umělá) ^{241}Pu - ^{209}Bi




$$A = 4n + 1$$

Uranová ^{238}U - ^{206}Pb

$$A = 4n + 2$$

Aktinuranová ^{235}U - ^{207}Pb

$$A = 4n + 3$$



Samovolné štěpení

Těžké jádro se rozpadá na dva nebo tři fragmenty a jeden nebo více neutronů




^{252}Cf - průmyslová výroba (ORNL: 0,25 g/rok) a využití

- Alfa-emise 97 %
- Samovolné štěpení 3 % (~3,7 neutronu)


Poločas rozpadu 2,65 let

Zdroj neutronů pro start reaktorů, aktivační analýzu, difrakci, detektory zlata, výbušnin, vody a ropy, terapii rakoviny, BNCT³⁷

Syntéza a štěpení jader



Syntéza a štěpení jader - vazebná energie jádra







Syntéza jader ve vesmíru

Big Bang




Slunce (teplota = 2×10^6 K v nitru, energie z PP nebo CN cyklu)


PP cyklus



PP cyklus





CN cyklus




Uhlíkový cyklus

CN cyklus



Syntéza jader ve vesmíru

Slunce → rudý obr → bílý trpaslík



Syntéza jader ve vesmíru

Těžké hvězdy

$^{12}\text{C} \rightarrow \text{Ne, Mg}$

$^{16}\text{O} \rightarrow \text{Si, S}$

$\text{Si} \rightarrow ^{58}\text{Fe}$

Fe jádra nejstabilnější


Jak dál?

Vysoké toky neutronů



$\text{Fe} + \text{n} \rightarrow \text{Au} \rightarrow \text{Pb} \rightarrow \text{Bi}$

Výbuch supernovy

$\text{Pb} \rightarrow \text{Bi} \rightarrow \text{U}$



Termojaderné reakce




A další...

ITER Cadarache, Francie


National Ignition Facility, USA

1952 H-bomba Eniwetok




Transmutace



1919, Rutherford, první umělá příprava prvku



ekvivalentní zápis jaderné rovnice ${}^{14}\text{N}(\alpha, \text{p}){}^{17}\text{O}$




Transmutace






Wilsonova mlžná komora

Charles Wilson (1869-1959) NP za fyziku 1923



Plyn (vzduch, He, Ar,...)
a páry vody nebo alkoholu v
komoře se zářičem, píst pro
změnu objemu



Expanze, ochlazení, vznik
přesycené páry, částice při
průletu ionizují okolní atomy,
kondenzace na ionizovaných₄₈
atomech – kondenzační stopa


1929

Cyklotron

urychlovač pozitivních iontů (H^+ , D^+ , ...)
přechod potenciálovým rozdílem,
střídavé poz/neg nabíjení D elektrod,
kruhový pohyb v magnetickém poli,
energie do 100 MeV




Ernest O. Lawrence
(1901-1958)
NP za fyziku 1939



← duté elektrody tvaru D

Large Hadron Collider



Protony 13 TeV
 Pb ionty 1 PeV (10^{15} eV)

27 km LHC tunel

Super Proton Synchrotron

Lineární urychlovače
 (protony a ionty)

PS
 Proton Synchrotron


Štěpení jader

1932

John D. Cockcroft (1897-1967) a Ernest T. S. Walton (1903-1995)

Kaskádový urychlovač, protony 800 keV


První štěpení stabilního jádra urychlenou částicí



1951 společně NP za fyziku

1932


Objev neutronu




neutron = částice s nulovým nábojem, spin $\frac{1}{2}$
 $m = 1,67470 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

James Chadwick
(1891-1974)



NP za fyziku 1935



BNCT = Boron Neutron Capture Therapy




Dolet v tkáni asi 12 μm – průměr buňky




Akumulace v tumoru
(20 $\mu\text{g/g}$ tumoru)

Transmutace

Cyklotron




Bombardování neutrony




1933

Umělá radioaktivita


Frederic and Irene Joliot-Curie
(1900-1958) (1897-1956)






Otto Hahn
(1879-1968)
NP za fyziku 1944

Štěpení jader




${}^{235}\text{U}$, 0.71%
Pomalé neutrony




Štěpení ^{235}U

Rozložení výtěžku štěpných produktů pro ^{235}U .




Řetězová reakce neřízená



Jaderný reaktor

1942 Chicago Pile - 1

První řízená štěpná reakce ^{235}U




Enrico Fermi
(1901-1954)
NP za fyziku 1938



49

Řízená štěpná reakce ^{235}U




Moderátor = zpomalení neutronů – grafit
Cd dobře pohlcuje neutrony – zachycení n

Transurany

Do 1940 nejtěžší přírodní prvek $Z = 92$ (U)
Prvky $Z \geq 93$ (Np) transurany pouze umělé


1940 První umělý transuran = $^{239}_{93}\text{Np}$

bombardování neutrony




Adresa Glenna Seaborga
Sg, Lr, Lv, Bk, Cf, Am

90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Americium	Curium	Berkelium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendelevium	Nobelium	Lanthanum



Glenn T. Seaborg
(1912-1999)



Sdílená NP
za chemii 1951



Edwin M. McMillan
(1907-1991) 61

Syntéza transuranů

Bombardování kladnými ionty

^4He , ^{12}C , ^{15}N , ^{18}O , ...

připraveny transurany po $Z = 118$



- Spojený ústav jaderných výzkumů, Dubna, Rusko
- GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung), Německo
- Lawrence Berkeley and Livermore National Laboratories, CA, USA
- RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Japonsko

Syntéza transuranů

Bombardování kladnými ionty

^4He , ^{12}C , ^{15}N , ^{18}O , ... ^{70}Zn




připraveny transurany po $Z = 118$

Nihonium Nh, 113

Moscovium Mc, 115

Tennessine Ts, 117

Oganesson Og, 118



Kinetika radioaktivního rozpadu

$$-dN/dt = k N$$

$$dN/N = -k dt$$


Integrace

$$t = 0 \quad N = N_0$$

$$\ln(N/N_0) = -k t$$

$$N/N_0 = \exp(-k t)$$

$$N = N_0 \exp(-k t)$$



Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.

t

Poločas rozpadu, $t_{1/2}$

$$t = t_{1/2} \quad N = N_0/2$$



$$\ln(N/N_0) = -k t$$

$$\ln(1/2) = -k t_{1/2}$$


$$t_{1/2} = \ln(2) / k$$

$$k = \ln(2) / t_{1/2}$$



$$\ln(N/N_0) = -t \ln(2) / t_{1/2}$$



Poločas rozpadu - Radiometrické datování




Radiometrické
datování stáří
hornin v geologii a
paleontologii




Datování pomocí ^{14}C

^{14}C vzniká kontinuálně vysoko v atmosféře (15 km) dopadem kosmického záření



Rozpadá se beta rozpadem s poločasem $t_{1/2} = 5730$ let



V atmosféře (oxidace na CO_2) a živých rostlinách (fotosyntéza) se ustaví rovnovážná koncentrace $^{14}\text{C} - N_0$ (známe)

Po smrti organismu koncentrace ^{14}C klesá: $N = N_0 e^{-kt}$

Poměr $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ ve vzorku se určí hmotnostní spektrometrií

Stáří vzorku t lze určit z rovnice:

$$\ln(N/N_0) = -k t$$


$$k = \ln(2) / t_{1/2}$$

$$\ln(N/N_0) = -t \ln(2) / t_{1/2}$$




Willard Libby
(1908 - 1980)

NP za chemii 1960



Elementární částice



Zoologická zahrada částic

Quarky


- Spin
- Zlomkový náboj

Murray Gell-Mann
(1929 -)

NP za fyziku 1969

Elementární částice – Standardní Model

Astrofyzika a
částicová
fyzika



Přenašeče interakcí

← Elmagn.


← Silné inter.

← Slabé inter.

γ a g nemají hmotnost
 Z a W mají hmotnost

Higgs dodává
hmotnost Z a W
bosonům

Antičástice



Chemická hmota**Leptony**

lepton	značka	el. náboj	m [amu]
elektron	e^-	-1	$5.5 \cdot 10^{-4}$
elektronické neutrino	ν_e	0	
mion	μ	-1	0.1144
mionické neutrino	ν_μ	0	
tauon	τ	-1	1.915
tauonické neutrino	ν_τ	0	

Leptony

Existují volné, nevážou se

Náboj číslo 0 nebo -1 , kvantování el. náboje
Levoruké a s opačnou helicitou
(neexistují pravoruká neutrina)

Antileptony mají opačný náboj

Leptonové číslo L

$L = 1$ pro leptony

$L = -1$ pro antileptony

$L = 0$ pro ostatní

Quarky

Quark	značka	el. náboj
down	d	$-1/3$
up	u	$+2/3$
strange	s	$-1/3$
charm	c	$+2/3$
bottom	b	$-1/3$
top	t	$+2/3$

Chemická hmota

Quarky

Quarky nejsou známy volné, nemají hmotnost

Existují jen ve vázaných stavech – Hadrony (Baryony a Mezony)

Nábojové číslo $+2/3$ a $-1/3$

Levoruké a s opačnou helicitou

Antiquarky opačný náboj

Baryon = 3 quarky (např. proton se skládá z uud)

Antibaryon = 3 antiquarky

Mezon = 1 quark + 1 antiquark

Baryonové číslo

$B = 1$ pro baryony

$B = -1$ pro antibaryony

$B = 0$ pro ostatní

Quarky

Vazebné síly mezi quarky:

- Zprostředkovány gluony
- Slabé na malou vzdálenost, při oddalování rostou

(Proto není možné quarky zachytit volně)

Hadrony

Hadron	značka	el. náboj	složení
pozitivní pion	Π^+	+1	ud
pozitivní kaon	K^+	+1	us
proton	p	+1	uud
neutron	n	0	udd
lambda	Λ	0	uds

Bosony

Zprostředkovatelé interakcí

Boson	značka	el. náboj	interakce
foton	γ	0	elektromagnetická
gluon	g	0	silná
W-boson	W^+ W^-	+1 -1	slabá
Z-boson	Z	0	slabá

Zákon zachování B a L čísla

Součet B a L před reakcí a po reakci musí být stejný

např.



$$\text{L} \quad 1 \quad -1 \quad 0$$



$$\text{B} \quad 1 \quad 1$$