

6. KREV

- transport látek

- živiny
- plyny

- regulace homeostázy

- pH
- osmotický tlak
- rozvod tepla

- obranná funkce

- imunita (buněčná – humorální)
- obranné toxiny (ropušníci - *Phrynosoma*)

- vzácně mechanická funkce

- tlak v očním sinu usnadňuje plazům čištění povrchu oka





Krevní objem: 3-16 % (obratlovci)

- objem v cirkulačním systému

- hematokrit (objem buněk)
- objem plasmy

Složení krve

- Ionty – potenciál na membránách, pH
- neelektrolyty – močovina, glukóza,.. (metabolismus)
- proteiny - koloidní osmotický tlak
 - pufrační schopnosti – pH
 - transport látek
- metabolity, toxiny,..
- buňky



Hematologické parametry některých obratlovců

Ery – objem erytrocytu/velikost; EryK – počet erytrocytů v 1 litru krve; Hct – hematokryt; Hb – koncentrace hemoglobinu; PHEry – množství hemoglobinu na buňku; PHEryK – koncentrace hemoglobinu v buňce; OK – kapacita krve pro O₂

	Ery <i>fL</i>	EryK <i>10¹² /L</i>	Hct <i>%</i>	Hb <i>g/L</i>	PHEry <i>pg</i>	PHEryK <i>g/L</i>	OK <i>ml O₂/L</i>
mlok <i>(Amphiuma)</i>	10800	0,027	29	76	2830	262	102
skokan	845	0,296	25	70	232	285	94
želva	394	0,52	21	69	133	335	92
velbloud	319	11,0	35	158	14	494	211
slon africký	141	3,03	43	153	51	356	205
krocan	136	2,72	37	123	45	336	165
běluha	134	3,34	46	193	57	427	259
člověk	90	4,99	44	146	29	335	196
myš	60	8,3	50	159	19	320	213
pytlouš	45	11,8	54	193	17	367	259
rejsek	31	11,5	36	162	15	477	217
koza	18	16,1	29	104	7	356	139
kančil	6	55,9	31	117	2	380	154



Dýchací barviva (DB)



- u obratlovců zejména svalový ***myoglobin*** (1x globin) a krevní ***hemoglobin*** (4x globin)







Figure 3 Myoglobin versus haemoglobin



Fylogeneze dýchacích barviv u živočichů




Hb – hemoglobin; **Mb** – myoglobin; **E** – erytrokruorin (hemoglobin bezobratlých); **Ch** – chlorokruorin (zelený);
Hr – hemerytrin (bez hemu, bezbarvý → fialový); **Hc** – hemocyanin (Cu^{2+} , bez hemu, bezbarvý → modrý)


Struktura některých hemových skupin globinů

KYSLÍK - ●


A



B



C




(kov kotvící aminokyselina – histidin)


Základní skupiny globinů u savců

	hemoglobin	myoglobin	cytoglobin	neuroglobin
expression sites	red blood cells	skeletal muscle heart smooth muscle	fibroblast cell lineage liver stellate cells CNS/PNS	neurons (CNS,PNS) retina endocrine tissue fish gills
Fe-atom coordination	penta	penta	hexa	hexa
oxygen affinity (P₅₀(O₂) in torr)	26	1	1	1
gene location (human)	α-cluster 16p13 β-cluster 11p15	22q13	14q24	17q25
locus link	(α) 83587 (β) 64162	4151	114757	58157
phylogeny	HBA HBB	MB	CYGB	NGB

Evoluce globinů (chromosomy člověk)



Podobnost jednotlivých globinů u obratlovců




Hemoglobiny


- Nejspíš nejdokonalejší barviva pro transport kyslíku
- Více jednotek globinu (homo- hetero-globinomery)
 - => zásadní vliv na vlastnosti (např. fetální a adultní hemoglobin)
- Prostetická skupina – hem, porfirinový skelet s iontem Fe uprostřed
- U bezobratlých počty globinů a hemů různé, u obratlovců vždy 4, přičemž každý globin váže jeden hem, u obratlovců vždy v erytrocytech
- Každý iont Fe^{2+} váže jednu molekulu O_2 (reverzibilně)
 - => oxygenace, oxyhemoglobin (HbO , oxyHb)
- Oxidací Fe^{2+} na Fe^{3+} - methemoglobin (MetHb), neuvolňuje O_2 , patologické, po otravách oxidačními činidly
- Vazba CO – karbonylhemoglobin (COHb), CO má ~300x vyšší afinitu k Hb než O_2
- Vazba CO_2 – karbaminohemoglobin (HbCO_2), fyziologické v rámci transportu CO_2

Úloha globinů

- A) Vazba a přenos O₂
- B) Redukce ROS a RNS
(reactive species – tzv. radikálů)
- C) Metabolismus NOxů
- D) Regulace GTPás
- E) Oxidačně redukční reakce s cytochromy




Metabolismus NOx Katalyzované hemoglobinem



- Reakce 1 – odkysličování
- Reakce 2 – okysličování
- Reakce 3 – NO dioxygenace
- Reakce 4 – nitrosylace
- Reakce 5 – NO redukce
- Reakce 6 – O₂nitrosylace
(hem denitrosylace)
- Reakce 7 – NO₂⁻ redukce
- Reakce 8 – MetHb redukce

Nitrace fenolů zprostředkována neuroglobinem




Úloha myoglobinu v ochraně myokardu

hibernation

ischemia/reperfusion

myoglobin



NO

NC


A diagram of the human heart from a slightly elevated angle, showing the right side. It highlights the right atrium in pink, the right ventricle in red, and the large veins (superior and inferior vena cava) entering the heart. The aorta and pulmonary arteries are also visible.

energy status ↓

myocardial O₂-consumption ↓


cardiac contractility ↓

Complex I inhibition



protein damage ↓
ROS ↓
I/R injury ↓

Význam normální sigmoidní křivky pro transport O₂ krví; P₅₀ = 3,8 kPa, n = 2,6.
 Srovnání s hyperbolami pro n = 1 při „stejné“ arteriální saturaci O₂ (P₅₀ = 0,4 kPa)
 a pro stejné P₅₀.




n – kooperativní koeficient interakce molekul hemu při vazbě O₂, závislost na počtu hemových Molekul; n = 1 pro 1 molekulu Hb (monomer); n = 2,6 pro 4 molekuly Hb (tetramer); 200mer – n ~ 8 (*Arenicola*); některé hemoglobiny n > 8


Saturační kapacita krve pro různé skupiny obratlovců a vody v ml O₂
na 100 ml média při plné saturaci a při pO₂ = 21,8 kPa pro vodu

voda (20°C)	0,65
kruhoústí	1 – 1,2
paryby	4,4 – 4,5
ryby	4,9 – 19,7
obojživelníci	6,3 – 10,4
plazi	6,6 – 12,5
ptáci	10 - 22
savci	14 - 32

Saturační křivka hemoglobinu
kyslíkem a (negativní = normální)
Bohrův efekt u člověka



Změny v 50% saturaci hemoglobinu kyslíkem (P50) v závislosti na pH (Bohrův efekt - ϕ) u dospělého skokana volského (*R. catesbeiana*) a jeho pulce



Faktor Bohrova efektu ($\phi = \Delta \log P50 / \Delta \text{pH}$) pro hemoglobininy obratlovců.

ryby	-0,54 až -0,31
obojživelníci	-0,29 až 0
plazi	-0,52 až -0,13
ptáci	-0,5 až -0,4
savci	-0,96 až -0,32

Bez Bohrova efektu

- embryonální hemoglobininy
- hemoglobin sliznatek (*Polistotrema*)
- myoglobiny



Vazbu O₂ k hemoglobinu dále ovlivňují


- **parciální tlak CO₂** => Rootův efekt

- u ryb napomáhá uvolňování plynů do plynového měchýře


- **koncentrace iontů** – vyšší koncentrace = vyšší P₅₀ / nižší vazebnost (savci)

- **koncentrace organických fosfátů** (intracelulárně) - vyšší koncentrace = vyšší P₅₀ / nižší vazebnost (savci)


- **teplota** – vyšší teplota = vyšší P₅₀ / nižší vazebnost



Účinek Bohrova a Rootova efektu/posunu na transport O₂ krví




DPG(BPG) – 2,3 bifosfoglycerát




Vliv intenzity metabolismu na disociační křivku hemoglobinu pro O₂.

Menší živočichové mají intenzivnější metabolismus = větší spotřeba O₂ na 1g tkáně, rejsek (shrew) přibližně 40x větší než slon (elephant) => větší nároky na přenos O₂ z krve do tkání.





Různé typy hemoglobinů => různé affinity k O₂, význam v ontogenezi

Normal Hemoglobin Variants and Subunits





Senzitivita jednotlivých typů hemoglobinu člověka k změně pH (A) a koncentraci 2,3-BPG (B)




Saturační křivky krve O_2 u matky a plodu

- různé hemoglobiny

- podobný vztah i mezi dalšími O_2 přenášejícími barvivy, dle parciálního tlaku O_2 (př. myoglobin x hemoglobin)




Účinnost transportu kyslíku krví v závislosti na hematokritu / koncentraci hemoglobinu



▲ OT *in vivo* x Opt. hematokrit



Posun umožňuje větší zásoby kyslíku v krvi

Hct – hematokrit
 OT – transportní kapacita O_2
 $\text{OT} = V_{\text{bl}} * k_1 * \text{Hct}$
 V_{bl} – průtok krve (ml za minutu)
 k_1 – relativní kapacita vazby O_2 krví v závislosti na Hct (ml O_2 / ml krve * Hct)
 η_{krve} – viskozita krve = $\eta_{\text{plasmy}} e^{k_3 \text{Hct}}$
 k_2 – konstanta charakterizující tlak a odpor cév
 k_3 - konstanta



Vztah mezi transportní kapacitou O₂ (OT) a

- A) koncentrací hemoglobinu
- B) Molekulární hmotností hemoglobinu (**M = Mr !!!**)



viskozita x koncentrace (molární koncentrace)

Zásoby O₂ - významné zejména pro potápějící se savce a ptáky

Hemoglobin jako zásobárna O₂

- 1,3 ml O₂ na 1g hemoglobinu
- < 15 g% hemoglobinu v krvi
- objem krve < 10 % tělní hmoty



Myoglobin jako zásobárna O₂

- koncentrace ve svalu < 5 %
- svaly 20-40 % tělní hmoty

Plicní zásoby O₂ – malý význam v důsledku redukce objemu vzduchu před potopením


	Objem ml O ₂ na kg tkáňové masy					
	plíce	arteriální krev	žilní krev	svaly	rozpuštěno	celkem
člověk	12,2	2,8	10,1	0,9	1,9	27,9
kachna divoká	12,3	4,7	10,2	1,8	2	31,0
lvoun	16,5	5,0	7,2	8,1	2	39,4
polák chocholačka	19,8	6,3	13,6	1,8	2	43,5
mrož	17,4	7,7	11,5	10,0	2	48,6
lachtan medvědí	21,8	6,7	9,9	11,7	2	52,1
tuleň obecný	13,6	12,2	18,8	18,6	2	65,2
vydra mořská	51,2	6,1	9,4	8,8	2	77,5
tuleň pruhovaný	12,6	14,3	22,6	27,2	2	78,7

Výměna O₂ v plovacím měchýři u kostnatých ryb

- objem je závislý na hloubce ponoření (10 m = 1 atm = 101 kPa)
- mechanismy pro uvolňování plynů do měchýře a zachování jeho konstantního objemu, mnohé druhy pak ještě žlázy pro zpětnou resorpci plynů
- problematické ve velkých hloubkách, parciální tlaky plynů v krvi obecně malé, parc. tlaky v měchýři značně narůstají s hloubkou
- nejsou mechanismy aktivního transportu, jen pasivně
- uplatnění Rootova (pCO₂) efektu

Plynové žlázy se sítí cév napojených na plynový měchýř

- navození Root efektu anaerobním metabolismem (produkce H⁺, laktátu, CO₂)
- vytěsnění O₂ z hemoglobinu
- zvýšení rozpuštěného pO₂
- část O₂ přejde do plynového měchýře



Transport CO₂ a jeho důsledky

za normálního stavu převažují hydrogen-uhličitanové ionty



zvyšující se pH zvyšuje množství uhličitanových iontů



CO₂ se také váže na -NH₂ skupiny proteinů (významné u odkysličené krve)



Obecně jsou malé rozdíly*) mezi obsahem CO₂ v arteriózní a venózní krvi – 1.8 objem.%

- okysličená krev: 48,2 objem.%, pCO₂ = 5,4 kPa (arterie)

- odkysličená krev: 50 objem.%, pCO₂ = 6,3 kPa (vény)

Odkysličená krev má vyší obsah CO₂ pro stejný pCO₂ -> Haldanův efekt

*) – parametry lidské krve, ale nejsou moc odlišné od ostatních obratlovců

Transport CO₂

- Konečný produkt metabolismu, dobře rozpustný ve vodě, ale pro transport většina chemicky vázaná

1) V podobě hydrogenuhličitanových iontů (až 65%)




- Spontánně v plasmě, 250x rychleji v erytrocytech, enzym karbonátdehydratáza (karboanhydráza)
- H⁺ reagují s Hb a vytěsňují O₂
- HCO₃⁻ přechází do plasmy (nahraženo ionty Cl⁻)
-> Hamburgerův shift / chloridový posun)


2) V erytrocytech

karbaminovazbou na globin Hb

=> karbaminohemoglobin (HbCO₂)




Úloha erytrocytů v transportu CO₂





Membrána erytrocytů je málo prostupná pro kationty. Vznikající HCO₃⁻ je méněn za Cl⁻ (chloridový / Hamburgerův efekt), s Cl⁻ vstupuje i H₂O => větší erytrocyty = vyšší hematokryt

Transport CO₂




Transport CO₂





Haldanův efekt




Acido-bazická rovnováha

- voda má pH = 7 při 25°C
- pH tělních tekutin člověka ~ 7,6
- intracelulární pH ~ 7



$$\text{pH} = \text{pK} + \log [\text{A}^-] / [\text{HA}] \quad (\text{pK} = \text{pH pro } [\text{A}^-] = [\text{HA}])$$

β - pufrační kapacita; $\beta = \Delta \text{mmol} / \Delta \text{pH}$



Pufrační základ

tělních tekutin tvoří celková koncentrace HCO_3^- , fosfátů a proteinových anionů. Ostatní ionty (tzv. silné ionty) jsou plně disociovány a nepodílí se na pH.

Pufrační kapacita plasmy a krve u různých druhů

		β
Bahník (<i>Protopterus</i>)		15,2
Žralok (<i>Squalus</i>)	plasma	6,5
	krev	9
Ďas (<i>Opsanus</i>)		6,7
Makrela (<i>Scomber</i>)		14,8
Žábronoš (<i>Necturus</i>)		8,0
Skokan (<i>Rana</i>)		16,4
Aligátor		22,6
Bobr		27
Člověk	plasma	6,5
	krev	30,8


RAC / RAL

Respirační acidóza / alkalóza

MAC / MAL


Metabolická acidóza / alkalóza

Vztah mezi HCO_3^- (y; mM) a pH (Davenport diagram) - člověk







pCO₂ a koncentrace HCO₃⁻ u některých obratlovců, - srovnání pro vodní a vzdušné dýchaní




Závislost disociační konstanty na teplotě pro vodu a různé pufry (A)


Závislost intracelulárního (svaly) a extracelulárního (krev) pH na teplotě (B)



pH krve, pCO₂ a HCO₃⁻ versus teplota těla/okolí



Vtah mezi pCO₂ a pH krve u některých savců a ptáků v klidu „●“ a při oddychování (po výkonu) „○“
Přerušovaná linie nekompenzovaný poměr pro danou koncentraci HCO₃⁻



Změna pH v závislosti na teplotě (organismy x pufry)

$\Delta \text{pH}/\Delta \text{°C}$

Kapr	-0,019
Aligátor	-0,018
Voda	-0,017
Žába	-0,017
Pstruh	-0,017
Mořská želva	-0,016
Ropucha	-0,016
$\text{HCO}_3^-/\text{imidazol pufr}$ (25mM + 20mM)	-0,015
Žába	-0,013
netopýr	-0,009
myš	-0,009
Pouštní leguán	-0,008
HCO_3^- pufr (25mM)	-0,005
$\text{HCO}_3^-/\text{PO}_4^{3-}$ pufr (25mM + 20mM)	-0,004
Lenochod	-0,003
Ještěrka	-0,002
Hibernující ježek	-0,002
Hibernující křeček	-0,002
Hibernující netopýr	0
Hibernující pozemní veverka	0



IMUNITA



- základní homeostatický mechanizmus
- udržování integrity organizmu:
 - obranyschopnost
 - autotolerance
 - imunitní dohled
- už u fylogeneticky nejstarších druhů

IMUNITNÍ MECHANIZMY:


Nespecifické


- evolučně starší
- bez imunologické paměti
- reakce na antigen (Ag) řádově v min.
- **bariéry** – mechanické, chemické (lysozym), mikrobiální
- složky: **buněčná** (fagocyty, NK) + **humorální** (komplement, interferony, lektiny, další sérové proteiny)

Specifické

- evolučně mladší
- imunologická paměť
- reakce na Ag: dny – týdny
- složky: **buněčná** (T-lymfocyty) + **humorální** (protilátky – Ab)
- Úrovně → geny → molekuly → buňky → orgány (primární + sekundární)

Fakta z roku 1980 (1992)	rejekce	imun. spec. rejekce	imun. paměť	fago- cytóza	enkap- sulace	nespec. humor. faktory	ameboid. fagocyty	diferen- ciace leuko- cytů	protilát ky
Protozoa	A	N	N	A	N	N	N	N	N
Porifera	A	A	A	N	A	N	N	N	N
Cnidaria	A	A	A	N	A	N	N	N	N
Annelida	A	A	?	A	A	A	A	asi A	N
Mollusca	A	?	?	A	A	A	A	N	N
Arthropoda	A	?	A	A	A	A	A	N	N
Echinodermata	A	A	A	A	A	A	A	A	N
Tunicata	A	asi A	A	A	A	A	A	A	N
Vertebrata	A	A	A	A	N	A	A	A	A





A. Bezčelistnatci (*Agnatha*)

Sliznatky (*Myxinoidea*) nemají organizovaný thymus a jsou vybaveny jen jednoduchými hematopoetickými a lymfopoetickými tkáněmi; krevní „lymfoïdní hemoblasty“ zajišťují funkce jak krvinek, tak zánětlivých buněk. Sliznatky jsou schopny „senzibilizovanými lymfocyty“ vypudit cizí štěpy a projevit známky imunologické paměti. V séru se nachází několik bílkovin s vlastnostmi imunoglobulinů.




Mihule (*Petromyzones*) - v krvi hemaglutininy a antibakteriální látky odpovídající Ig vyšších obratlovců, fylogenetický přechod mezi protilátkami bezobratlých a obratlovců.



B. Čelistnatci (*Gnathostomata*)

Mají již zřetelný thymus, slezinnou bílou pulpu a dokonalejší tkáňové i krevní lymfocyty, a objevují se u nich **poprvé i plazmatické buňky**. Aloštěpová reakce je velmi účinná, v krvi přibylo imunoglobulinů, prudčeji probíhají reakce zprostředkované protilátkami IgM.





Paryby (*Chondrichthyes*)

- typické Ig (2 lehké + 2 těžké řetězce),
1 typ Ab – IgM.
- u žraloků brzlík a slezina

Ryby (*Pisces*)

- tkáňové Ag – MHC
- aktivita IgM závisí na teplotě (jako u všech poikilotermů)
- proteiny komplementu uniformní
- plně diferencovaný brzlík a slezina



Obojživelníci (*Amphibia*)

V souvislosti s přechodem z vody na souš

- Kvalitativně vyší stupeň imunity
- Jsou vytvořeny uzliny a již existuje systém T i B lymfocytů
- Ve střevní tkáni lze nalézt velké množství plazmocytů.



Mloci (*Urodea*)

- nejsou MHC
- hematopoéza v kostní dřeni neprokázána,
probíhá v ledvinách a játrech



Žáby (*Anura*)

- Silný MHC
- 2 druhy Ab (IgM a IgG)
- prokázána alergická reakce
- hematopoéza v kostní dřeni
- sekundární lymfat. org. (slezina, ledviny, lymfatické uzliny)
- GALT (gut associated lymphoid tissue).

Plazi (*Reptilia*)

- Podobnost s IS obojživelníků
- Jsou zde přítomny protilátky IgM a objevují se předchůdci IgG, navíc i „slizničního“ IgA.
- Hematopoéza – kostní dřeň, slezina, thymus (s přibývajícím věkem involvuje), v hlutanu tonsily
- Není spolehlivě prokázán MHC
- GALT v podobě kloakálního komplexu (anatomicky podobný Fabriciově burze ptáků, ale není jejím ekvivalentem)





- Krokodýli (*Crocodylia*) mají velmi účinné baktericidní proteiny v krvi (odolnost i proti *Staphylococcus aureus*...)

Ptáci (Aves)

- Zdokonalení lymfoidního systému. Vedle plně vyvinutého thymu (všechny 3 typy T lymfocytů – Th, Tc i Ts) a kostní dřeně se vytvořila Fabriciova burza (bursa Fabricii) - hlavní orgán humorální imunity.
- Dále slezina, lymfat. uzliny (nejsou u kurovitých), Peyerovy plaky, Harderova a pineální žláza.
- Lymfat. tkáň má také difúzní podobu, její ohniska téměř ve všech orgánech – např. myokard, endokrinní org., játra, ledviny, pankreas i příčně pruhovaná svalovina
- BALT (bronchus associated lymphoid tissue)



Lokalizace lymfatických orgánů ptáků a savců




Systém lymfatických cév (*vasa lymphatica*) není u ptáků tak vyvinut jako u savců. Sbírají lymfu z pletení tvořených lymfatickými kapilárami a odvádějí ji do doprovodných krevních žil. Lymfatické srdce a lymfatické uzliny se vyskytují pouze u kachen a hus.

Savci

- Savci včetně člověka mají dokonale vybudovaný thymus a systém buněčné imunity. Ig 5 resp. 9 typů (IG1-4, IgM, IgA1-2, IgD, IgE).
- Společný původ řady významných povrchových znaků a receptorů dokazují přesvědčivě analogie a podobnosti v jejich struktuře u nízkých živočišných forem a savců (člověka). Platí to pro druhové, diferenciační i histokompatibilní znaky i pro receptory fagocytů, dendritických buněk a NK buněk i T a B lymfocytů.
- Geny pro receptory T-lymfocytů a geny pro receptory B-lymfocytů (imunoglobuliny) se začaly odštěpovat od původních pragenů asi před miliardou let a osamostatňovat se před zhruba 600 miliony let. Vývojové zmnožování a rozrůžňování probíhalo pomalu, ale trvale. K divergenci histokompatibilních znaků I. a II. třídy došlo asi před 200 miliony let.
- Základem vzniku nejspíše selekční tlak vnějšího + vnitřního prostředí, hlavní hnací síla: vztah parazit-hostitel.

Savci (zajímavosti)



- IgM – 1. Ig ve fylogenezi i ontogenezi
- velbloudi nemají lehké řetězce Ig
- gepard – nízký polymorfizmus MHC (bottle neck effect) => genet. homogenizace => citlivost k infekcím, vysoká úspěšnost transplantací (~inbrední kmeny laboratorních zvířat)
- primáti – transplacentární přenos IgG, ostatní skupiny – IgG přes sliznice do mateř. mléka

MHC proteins

