


p⁸ prvky – vzácné plyny

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn




charakteristika:

- **p prvky – celkem 8 elektronů** mají v orbitalech **s** a **p** – proto jejich atomy netvoří vazby s jinými atomy ani vzájemně

⇒ **molekuly vzácných plynů jsou jednoatomové**

- byly považovány za nereaktivní = inertní, bylo však připraveno několik sloučenin xenonu, kryptonu a radonu
- bez barvy a zápachu, velmi lehké plyny



Vzácné plyny - vlastnosti



	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
atomové číslo	2	10	18	36	54	86
relativní atomová hmotnost	4,00260	20,179	39,948	83,80	131,29	222
teplota tání C	-	-248,61	-189,37	-157,2	-111,8	-71
teplota varu C	-268,93	-246,06	-185,86	-153,35	-108,13	-62
I. ionizační potenciál (eV)	24,58	21,56	15,76	14,00	12,13	10,75
výparné teplo (kJ/mol)	0,08	1,74	6,52	9,05	12,65	18,1
rozp. ve vodě (cm ³ /kg)	8,61	10,5	33,6	59,4	108,1	230

Helium

- název z řeckého **helios – Slunce** – objeveno ve spektru Slunce
- výskyt:
 - druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru
 - malé množství v zemské atmosféře (0,5 ml na 100 l vzduchu)
- průmyslová výroba:
 - vedlejší produkt při frakční destilaci zkapalněného vzduchu

fyzikální vlastnosti:

- **monoatomické molekuly**
- bezbarvý, nehořlavý plyn bez chuti, bez zápachu, těžko zkapalnitelný
- **tzv. helium I je supratekuté**, tzn. bez tření protéká libovolnými předměty,
- **supravodivé**, tzn. dokáže vést elektrický proud bez ztrát (má neměřitelný elektrický odpor)
- schopnost difundovat řadou materiálů (pryž, PVC, sklo)



chemické vlastnosti:

- mimořádně netečný plyn
- netvoří žádné sloučeniny

využití:

- chladio (např. NMR spektrometrie)
- plnění osvětlovacích trubic a výbojek
- příprava speciální vzduchové směsi pro hloubkové potápěče – pro snížení tlaku kyslíku v krvi (nedochází ke vzniku tzv. kesonové nemoci)
- plnění meteorologických balónů
- ochranná atmosféra - při práci s hořlavinami



Neon

- název z řeckého **néon – nový**
- výskyt:
 - v zemské atmosféře (1,8 ml ve 100 l vzduchu)
- průmyslová výroba:
 - destilací zkapalněného vzduchu

fyzikální vlastnosti:


- monoatomické molekuly
- bezbarvý, bez chuti, bez zápachu

chemické vlastnosti:

- netvoří žádné sloučeniny
- chemicky mimořádně netečný plyn

využití:

- plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek



Argon

- název z řeckého **argón – líný**

výskyt:

- v zemské atmosféře (1 l ve 100 l vzduchu)

fyzikální vlastnosti:

- monoatomické molekuly
- bezbarvý, bez chuti, bez zápachu

chemické vlastnosti:

- chemicky netečný plyn

využití:

- plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek
- inertní atmosféra při vysokoteplotní metalurgických procesech



Krypton

výskyt:

- malém množství v zemské atmosféře (0,114 ml ve 100 l vzduchu)

průmyslová výroba:

- jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

fyzikální vlastnosti:


- pouze jednoatomové molekuly, těžko zkapalnitelný

chemické vlastnosti:

- chemicky netečný plyn
- tvoří pouze jednoatomové molekuly

využití:

- převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubíc a výbojek



Xenon

výskyt:

- malém množství v zemské atmosféře (0,008 ml na 100 l vzduchu)

průmyslová výroba:

- vedlejší produkt při frakční destilaci zkapalněného vzduchu

• yzikální vlastnosti:

- bezbarvý plyn
- těžko zkapalnitelný

chemické vlastnosti:

- chemicky relativně netečný, ale vytváří řadu sloučenin

využití:

- plnění žárovek, osvětlovacích trubíc a výbojek

Sloučeniny – je jich mnoho, např.:

- **oxid xenonový - v pevném stavu velmi explozivní (srovnatelný s TNT)**



Radon

výskyt:

- v malém množství v zemské atmosféře
- v přírodě spíše společně s radiem, z něhož také vzniká radioaktivní přeměnou

fyzikální vlastnosti:


- bezbarvý plyn
- Radioaktivní (alfa zářič)
- těžko zkapalnitelný

chemické vlastnosti:

- mimořádně chemicky netečný, avšak tvoří fluoridy

využití:

- dříve při léčbě rakoviny k ozařování,
- léčba onemocnění pohybového aparátu - soli radia
- zdroj gama záření
- radonové koupele (protizánětlivý a analgetický účinek)



radonový index

Sloučeniny vzácných plynů

He, Ne a Ar netvoří žádné známé stabilní sloučeniny.

Sloučeniny **Kr a Xe** jsou známy.

Rn je schopen tvořit stabilní fluoridy, případně i další sloučeniny, ale vzhledem k tomu, že nemá žádné stabilní izotopy, nelze očekávat valný význam těchto sloučenin.

Klathráty obecně

Název tohoto typu látek je odvozen z latinského *clathratus* (uzavřený do klece).

Pojem hostitele a hosta

- Tvoří je **Ar, Kr, a Xe (host)** ale také jiné, molekulární plyny (SO_2 , O_2 , N_2 , CO), případně i jiné molekuly.
- Jedná se o zvláštní uspořádání molekul v krystalu „**hostitele**“, kde subsystém vazeb vytváří dutiny, do kterých mohou být uzavřeny atomy, nebo molekuly obecně různých látek, které jsou v nich pak vázány pouze slabými van der Waalsovskými silami.
- Tyto látky **mají nestechiometrické složení**, které se blíží nějaké limitní hodnotě a nepovažujeme je za sloučeniny vzácných plynů ve smyslu tvorby chemické vazby.

Vzácné plyny - klathráty

- **Klathráty vzácných plynů** jsou relativně stálé, ale plyn se z nich uvolňuje při teplotě tání.
- Vznikají krystalizací např. z vody nasycené plynem za tlaku 1- 4 MPa.
- Jejich praktické použití je spojeno s potřebou zabránit úniku radioaktivních izotopů vzácných plynů, které vznikají v jaderných reaktorech.
- Za vysokého tlaku se mohou tvořit klathráty, které obsahují až 20 % argonu.

Látkou, která vytváří klathráty s Ar, Kr, a Xe je například **hydrochinon**.

Jejich složení se blíží limitní hodnotě poměru


plyn : hydrochinon 1:3.

Další příklady: **8Kr. 46 H₂O**


Vzácné plyny – sloučeniny

- Stabilní izolovatelné chemické sloučeniny, charakterizovatelné jako chemická individua, tvoří pouze **Kr a Xe**.
- Sloučeniny radonu lze těžko izolovat pro jeho vysokou aktivitu, která je příčinou jejich rychlé radiolýzy.

N. Bartlettem a D.H. Lochmanem v roce 1962, kdy byla připravena reakcí Xe s PtF_6 první jeho skutečná sloučenina na základě zjištění, že v připravené sloučenině s kyslíkem $\text{O}_2^+[\text{PtF}_6]^-$ je ionizační energie kyslíku je téměř stejná jako ionizační energie Xe– nebyl proto důvod předpokládat, že reakce s Xe s PtF_6 nebude probíhat.



Po tomto objevu však byly relativně rychle za sebou připraveny fluoridy **XeF_2 a XeF_4** , resp. **XeF_6** . Tyto reakce pak představují skutečný počátek chemie vzácných plynů.



Obr.č. 10.1. Fluoridy xenonu

Vzácné plyny – sloučeniny xenonu

Oxidační stav	Vzorec	Teplota tání (C)	Stereochemie	
II	XeF ₂	129	D _{∞h}	lineární
IV	XeF ₄	117,1	D _{4h}	čtvercová
VI	XeF ₆	49,5		deformovaný oktaedr
	XeOF ₄	-46	C _{4v}	čtvercová pyramida
	XeO ₂ F ₂	30,8	C _{2v}	
	CsXeOF ₅			deformovaný oktaedr
	KXeO ₃ F			čtvercová pyramida
	XeO ₃	exploduje	C _{3v}	pyramidální
VIII	XeO ₄	-35,9	T _d	tetraedr
	XeO ₃ F ₂	-54,1	D _{3h}	trigonálně bipyramidální
	Ba ₂ XeO ₆	>300 rozklad	O _h	oktaedr

Vzácné plyny – fluoridy xenonu a kryptonu

- Připravují se přímou syntézou, přičemž na vzájemném poměru $\text{Xe} : \text{F}_2$, tlaku a teplotě závisí složení získaného produktu.
- Reakce se provádějí v uzavřených niklových nádobách.
- Produkty jsou bílé krystalické látky.

XeF_2 komerčně dostupný, tyto látky zatím nemají praktického významu

- z hlediska základního výzkumu však představují tyto sloučeniny velmi zajímavé objekty, zejména pokud jde o studium vazebných poměrů v nich.


Pokud jde o sloučeniny dalších vzácných plynů, byly popsány některé sloučeniny kryptonu, z nichž nejlépe prostudovanou látkou je KrF_2 . Stabilní je ovšem jen do teploty kolem $-153\text{ }^\circ\text{C}$.

Vzácné plyny – fluoridy xenonu




Lineární molekula

- dobře se rozpouští ve vodě a jeho roztoky jsou při teplotě kolem 0 °C a v neutrálním prostředí celkem stálé.
- V přítomnosti zásad probíhá rychlá hydrolyza:



- vodný roztok XeF₂ je slabé fluorační a silné oxidační činidlo:



ale také:





a oxiduje rovněž i soli chromité až na chromany.

Vzácné plyny – fluoridy xenonu



čtvercová molekula, symetrie D_{4h}

- snadno sublimuje
- reakce jsou obdobné jako u XeF_2 , ale je silnějším fluoračním činidlem:



- hydrolýze však podléhá velmi snadno:



ale průběh hydrolýzy má složitý mechanismus.

Vzácné plyny – fluoridy xenonu

XeF₆


- je těkavější než fluorid xenoničitý.
- vodou se rozkládá velmi prudce a ve směsi produktů je opět obsažen explozivní oxid xenonový.
- fluorid xenonový je **silným fluoračním činidlem**, které napadá i sklo:




Tvar molekuly XeF₆ je dodnes předmětem zájmu chemiků. Jisté je, že se v plynné fázi nejedná o jednoduchý oktaedr a v pevné fázi jsou známy nejméně čtyři různé formy XeF₆.

Vzácné plyny – fluorid-oxidy xenonu

Vznikají jak již bylo dříve zmíněno jako meziprodukty při velmi opatrné hydrolýze, např.:



nebo reakcí fluoridů, případně jiných fluorid oxidů s oxidy:



Jsou to těkavé, bezbarvé kapaliny, nebo nízkotající látky, které podléhají ve vodných roztocích hydrolýze.


Existují sice sloučeniny s vazbami Xe-N a Xe-C, které však nejsou příliš stabilní.

Vzácné plyny – kyslíkaté sloučeniny xenonu

XeO₃

- je velmi nebezpečný, silně explozivní
- vzniká hydrolyzou fluoridů xenonu
- ve vodě je velmi silným oxidačním činidlem.
- jeho reakce jsou však pomalé (je kineticky inertní).
- tyto roztoky bývají označovány jako kyselina xenonová a jsou stálé, pokud neobsahují oxidovatelné látky, nebo zásady.

V zásaditém prostředí vznikají přechodně xenonany:



ale ty se zvolna disproportionují za vzniku **xenoničelanů** a **volného xenonu**:



Xenoničelany

- výhradně se získávají srážením roztokem XeO_3 s roztokem NaOH za přítomnosti ozonu.



- koncentrovanou kyselinou sírovou se rozkládá za chladu, kdy lze připravit XeO_4 , plyn, který je podobně jako XeO_3 , silně explozivní.