

# **Repetitorium vyšších rostlin 10**

Vít Grulich

# Rubiaceae

- součást asteridové větve dvouděložných
- převážně dřeviny, v mírném pásmu téměř výhradně byliny

# Rubiaceae

- listy vstřícné nebo v přeslenech
- jednoduché
- palisty vždy přítomny
  - někdy tzv. vmezeřené

# Rubiaceae

- květenství založeno na vidlanech
  - tvoří laty nebo vrcholíky
- květy často malé
- oboupohlavné
- (3-)4-5četné
- aktinomorfní
- kalich často zakrnělý
  - bizarní výjimky
- koruny srostlé
  - často kolovité

# Rubiaceae

- tyčinky v počtu květních částí
  - nitky bázemi přirostlé ke koruně
- gyneceum zpravidla z 2 plodolistů
  - blizna hlavatá nebo laločnatá
  - semeník nejčastěji spodní
    - počet pouzder odpovídá počtu plodolistů
  - placenta různorodá
- plod suchý
  - dvounažka, tobolka
- dužnatý
  - bobule, peckovice



# Rubiaceae

- na různých stanovištích
  - lesy
  - louky
  - hory
  - plevele
- téměř kosmopolitní
  - převaha v tropech
  - 610 rodů, 13000 druhů
- alkaloidy
  - kofein
  - chinin

*Galium rivale*



*Galium glaucum*



*Galium odoratum*





*Cruciata laevis*



*Galium verum*



Asperula aristata

*Coffea arabica*





Coffea arabica



Coffea canephora





Calycophyllum candidissimum



Posoqueria latifolia



Antirhea borbonica



Bertiera borbonica



*Chassalia gaertneroides*



Keetia zanzibarica



*Crucianella latifolia*



*Gaillonia puberula*

*Ixora chinensis*




*Ixora coccinea*






*Gaertnera vaginalata*

*Pentas lanceolata*





Pavetta longiflora




*Arcytophyllum lavarum*



*Nertera granatensis*



Oldenlandia pulvinata



**Morinda citrifolia**



*Morinda latibractea*



*Bikkia palauensis*



Carphelea obovata



*Mussaenda flava*



Guettarda speciosa



**Glionettia sericea**



*Timonius sechellensis*



Paragenipa lancifolia



*Scyphiphora hydrophyllacea*

# Apocynaceae

- součást asteridové větve dvouděložných
- dřeviny
  - stromy, keře, liány
- byliny
- sukulentní
- velmi často mléčnice
  - latex
- cévní svazky bikolaterální

# Apocynaceae

- listy vstřícné nebo v přeslenech
- jednoduché
- u stonkových sukulentů mohou chybět
- palisty často přítomny
  - drobné

# Apocynaceae

- květenství zpravidla vrcholičnaté
- květy většinou nápadné, velké
- obouohlavné
- 5četné
- aktinomorfní
- kalich někdy (téměř) volný
- koruny srostlé
  - často kolovité

# Apocynaceae


- tyčinky v počtu květních částí
  - bázemi přirostlé ke koruně
  - prašníky někdy vzájemně srostlé
  - někdy vzniká gynostemium
- gyneceum z 2 plodolistů
  - semeník svrchní nebo polospodní
  - plodolisty ne vždy dokonale srostlé (stylodia!)
- plod suchý
  - měchýřek, tobolka
- dužnatý
  - bobule, peckovice
- semena někdy výrazně chlupatá

# Apocynaceae

- ve střední Evropě výrazně teplomilné
- velká diverzita v tropech
  - převaha v tropech
    - mnohdy i v aridních územích
      - sukulentí
    - 415 rodů, 4550 druhů
  - alkaloidy



*Apocynum androsaemifolium*





Allamanda cathartica



Thevetia peruviana



Adenium obesum



Adenium obesum





Plumeria rubra



Plumeria rubra



Plumeria stenopetala

Mandevilla splendens



Carissa carandas







Cerbera manghas



Ervatamia divaricata



Cryptolepis socotrana



Tabernaemontana mauritiana



Tabernaemontana pachysiphon



*Asclepias curassavica*




*Asclepias speciosa*





*Vincetoxicum hirundinaria*



Calotropis procera



**Gomphocarpus fruticosus**



Gomphocarpus sinicus



*Periploca laevigata*  
subsp. *chevalieri*




Kanahia laniflora



Sarcostemma daltonii






Stapelia gigantea



Stapelia variegata



*Caralluma quadrangula*



*Caralluma socotrana*



*Hoya imbricata*



# Gentianaceae

- součást asteridové větve dvouděložných
- byliny
  - výjimečně dřeviny
- cévní svazky bikolaterální

# Gentianaceae

- listy vstřícné
- jednoduché, celokrajné
- palisty chybějí

# Gentianaceae

- květenství zpravidla vrcholičnaté
  - založeno na vidlanech
  - někdy jediný květ
- květy často nápadné, velké
- oboupohlavné
- 4-5četné
- aktinomorfní
- kalich srostlý
- koruny srostlé

# Gentianaceae

- tyčinky v počtu květních částí
  - bázemi přirostlé ke koruně
- gyneceum z 2 plodolistů
  - semeník svrchní
  - placenta parietální
- plod tobolka



# Gentianaceae

- výrazná vazba na hory
  - převaha v mírném pásmu
    - v tropech jen v horách
  - 100 rodů, 1750 druhů
- glykosidické hořčiny
- často ozdobné trvalky
  - skalničky

*Gentiana pannonica*



*Gentiana punctata*





Gentiana acaulis

Gentiana dinarica



Gentiana clusii

Gentiana brachyphylla



Gentiana verna



Gentiana pumila

Gentiana bavarica


Gentiana asclepiadea



Gentiana pneumonanthe



Gentiana sceptrum



Gentiana affinis




Gentiana calycosa

*Gentiana cruciata*



*Gentiana glauca*



Gentiana douglasiana



Gentiana sedifolia



Gentiana prostrata



Gentiana pyrenaica



Gentianella praecox  
subsp. bohemica

Gentianella anisodonta



Gentianella obtusifolia



Gentianella  
rhaetica



Gentianella  
amarella

*Gentianella rapunculoides*



*Gentianella hirculus*



*Gentianella muelleriana*





*Halenia rhyacophila*



*Gentianopsis ciliata*



*Swertia perennis*



*Swertia polynectaria*



*Swertia kingii*



*Swertia abyssinica*



*Swertia engleri*

*Centaurium pulchellum*



*Centaurium tenuiflorum*  
subsp. *viridense*



*Centaurium littorale*




*Centaurium erythraea*

*Exacum affine*



*Sebaea exacoides*





*Symbolanthus elisabethae*