



do předučky ∇ Ab nebo Ag

AVIDITA: metoda hodnocení nč vzáhy mezi Ag - Ab

z délky trvání onemocnění
je to doplňkové vyšetření
metoda ELISA:

varianta: Ab + Abs neplavidim +
+ bílků s enzymem (peroxidáza)
substrát je peroxid vodíku



vyhodnocení

index avidity - ^{= vsmot} vysoka avidita - nejduale o arubni tzi infekce
1A (delu nez 1/2 r)

do nových metod

1M GUANIDIN (u HIV)
6M, 8M MOČOVINA - parohody

Příklad: Zjišťování doby infekce u HIV pozitivních jedinců u parohody
ke zjišťování: a.) teoreticky (dotazník)

b.) laboratorně

- A.) serologický průkaz proti P24 Ag
- B.) zjištění přítomnosti P24 Ag
- C.) blotting - nekompletní pro Ag
- D.) HIV nukleové kyseliny - spočátku velkého → klesá
- E.) AVIDITA x AFINITA index avidity

relace Ag-Ab ^{ale} raste se do 1/2 roku urolni

spočátku slava
pal silnější

staré infekce

ni. nemoci
arubni parohoda přítomnice

zjištění nemoci x oterazým jedincem
nízka avidita vysoká