

Noční nebe



Hvězdy a souhvězdí

Hvězdy = samostatná převážně kulová tělesa, udržované pohromadě vlastní gravitací, hmotnosti $0,075 M_{\odot}$ až stovky M_{\odot} (teoreticky)
nejméně hmotná hvězda EBLM J0555-57Ab - $0.081 M_{\odot}$ (von Boetticher et al., 2017)
nejhmotnější hvězda R136a1 – $315 M_{\odot}$ (Crowther et al., 2016)

Na obloze – zhruba 2-3 tisíce pouhýma očima, jen cca $\frac{1}{2}$ hvězdné oblohy!



Jedno z nejstarších vyobrazení jeskyně Lascaux (jižní Francie)



pro snazší orientaci na nočním nebi - výrazné skupiny hvězd

každá kultura měla jiné význačné skupiny hvězd!

dříve se jim říkalo **souhvězdí**
dnes **asterismus**




poč. 20. st.: fotografie, astrometrie → nutnost definice souhvězdí

dnešní **souhvězdí** = část hvězdné oblohy, přesně vymezená hranicemi!!!

Návrh hranic pro IAU Eugene Delporte (1930), 88 souhvězdí (IAU 1922)

Hranice souhvězdí - obdoba hranic států, většinou obsahuje skupinu hvězd, podle níž má souhvězdí jméno



Souhvězdí

Zkratka	Český název	Latinský název	Latinský genitiv
And	Andromeda	Andromeda	Andromedae
Ant	Vývěva	Antlia	Antiliae
Aps	Rajka	Apus	Apodis
Aql	Orel	Aquila	Aquillae
Aqr	Vodnář	Aquarius	Aquarii
Ara	Oltář	Ara	Arae
Ari	Beran	Aries	Arietis
Aur	Vozka	Auriga	Auriage
Boo	Pastýř	Boötes	Boötis
Cae	Rydlo	Caelum	Caeli



a další...

Výslovnost latinských slov - rychlokurz

Takže jen stručně: souhláska **c** se před e, ae, oe, i, y vyslovuje jako české **c**, tedy Cygnus [cy-], Atlas Coeli [cé-]; Centaurus, Cepheus (odlišuj české názvy Kentaur, Kefeus). Jinak se vyslovuje jako **k**: Carina [ka-], Crux [kr-]. Dvojhlasiku **ph** čteme jako **f**: Cepheus [-efe-]. **D**, **t**, **n** se vyslovují vždy tvrdě: Canis [-ny-], **s** čteme vždy jako **s**: Mensa, Perseus.

Nejznámější asterismy

Velký vůz – skupina hvězd ze souhvězdí Velké medvědice



Velký letní trojúhelník – Vega (z Lyry), Altair (z Orla), Deneb (z Labutě)


Zimní šestiúhelník (sedmiúhelník) - Aldebaran (Tau), Capella (Aur), Castor a Pollux (Gem), Prokyon (CMi), Sirius (CMa), Rigel (Ori)



Hvězdné mapy a atlasy



Farneseův atlas, 2. st. n.l.




Čínská mapa (Dunhuangský atlas) 7. st. n.l.







Albrecht Dürer, 1515




al-Sufi, 10. st. n.l.



Hvězdné mapy a atlasy





Hvězdné atlasy:

Heveliiův

Bonner Durchmusterung, Cordoba Durchmusterung

Bečvářovy atlasy – Coeli, Borealis, Eclipticalis

Nova Coeli – Hlad a kol., 1995

počítačové – Megastar, Guide, Cartes du Ciel, Stellarium, ...

Aladin, USNO, UCAC, ...

Označování hvězd

vlastní jména - nejjasnější hvězdy (Sirius, Vega, Deneb...).

malá písmena řecké abecedy + název/zkratka souhvězdí - jasné hvězdy – např. α Cyg nebo α Cygni, ε UMa apod.

malé písmeno latinské abecedy (a, b, ...) + název/zkratka souhvězdí

čísllice + název/zkratka souhvězdí (51 Pegasi apod.) – hvězdy viditelné pouhýma očima

podle svého objevitele (např. Lalande 21185, Ross 154, Barnardova hvězda...)

podle katalogu, ve kterém jsou uvedeny (HD 55133, GSC 4266-0186, 2MASS, UCAC...).

proměnné hvězdy - Argelander (1844) – písmena+zkratka souhvězdí – R, ..., Z, RR, RS, ..., RZ, SS, ..., SZ, TT, ..., ZZ, AA, AB, ..., AZ, BB, ..., BZ, CC, ..., QZ, V 335, V 336, ...

<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>

[V*](#) VY Dra

[GC](#) 21098

[IRAS](#) 15391+6449

[TYC](#) 4185-1512-1

[AG](#)+64 737

[GSC](#) 04185-01512

[2MASS](#) J15395049+6439423

[\[HFE83\]](#) 1132

[AGKR](#) 14008

[HD](#) 140453

[PPM](#) 19536

[AAVSO](#) 1538+64

[AN](#) 4.1922

[HIC](#) 76709

[SAO](#) 16806

[BD](#)+65 1069

[HIP](#) 76709

[SKY#](#) 28335


ŘECKÁ ABECEDA

<i>A</i>	α	alpha	[^l ælfə]	alfa
<i>B</i>	β	beta	[^l bi:tə]	beta
<i>Γ</i>	γ	gamma	[^l gæmə]	gama
<i>Δ</i>	δ	delta	[^l deltə]	delta
<i>E</i>	ϵ	epsilon	[ep ^l sailən]	epsilon
<i>Z</i>	ζ	zeta	[^l zi:tə]	dzéta
<i>H</i>	η	eta	[^l i:tə]	éta
<i>Θ</i>	θ	theta	[^l θi:tə]	théta
<i>I</i>	ι	iota	[ai ^l outə]	iota
<i>K</i>	κ	kappa	[^l kæpə]	kapa
<i>Λ</i>	λ	lambda	[^l læmdə]	lambda
<i>M</i>	μ	mu	[mju:, mu:]	mí
<i>N</i>	ν	nu	[nju:, nu:]	ní
<i>Ξ</i>	ξ	xi	[gzai, zai]	xí
<i>O</i>	\omicron	omicron	[ou ^l maikrén]	omikron
<i>Π</i>	π	pi	[pai]	pí
<i>P</i>	ρ	rho	[rou]	ró
<i>Σ</i>	σ	sigma	[^l sigmə]	sigma
<i>T</i>	τ	tau	[tau, to:]	tau
<i>Υ</i>	υ	upsilon	[ju:p ^l sailən]	ypsilon
<i>Φ</i>	φ	phi	[fai]	fí
<i>X</i>	χ	chi	[kai]	chí
<i>Ψ</i>	ψ	psi	[psai, sai]	psí
<i>Ω</i>	ω	omega	[^l oumigə]	omega


Dvojhvězdy

dvojice hvězd – nejznámější *Mizar* a *Alcor*

četnost - vzájemně si odporující výsledky ☹



- **optické dvojhvězdy** - dvě hvězdy nacházejí téměř ve stejném směru od nás
- **fyzické dvojhvězdy** - složky jsou gravitačně vázány a obíhají kolem těžiště soustavy
 - vizuální, spektroskopické, zákrytové




Proměnné hvězdy

- hvězdy se změnou jasnosti na časových škálách zlomků sekund až desítky let
- **geometrické** – zákrytové dvojhvězdy, rotující, elipsoidální ...
- **fyzické** – pulsace, exploze (novy, supernovy...)








GCVS – necelých 50 tisíc proměnných hvězd,

VSX – přes 2,1 miliónu proměnných hvězd (přehlídkové projekty) (říjen 2020)

nejjasnější – Algol, Mira Ceti, Sheliak, δ Cep...



Tucet jasných proměnných hvězd



„Nehvězdné“ objekty ze světa hvězd

- hvězdokupy
- mlhoviny
- galaxie



Katalogy objektů

Messierův (1757-1771) Charles Messier – M1 – M110 (M40, M73 hvězdy)

New General Catalogue (NGC) - 1888 – Johann (John) Dreyer; 7840 objektů
doplňky - Index Catalogue (IC 1) 1895 + IC 2 (1908) – 5386 objektů



Hvězdkupy



otevřené hvězdokupy - obvykle desítky až stovky hvězd; průměr až 10 ly;
15 - 250 M_{\odot} ; známých více než 2 tisíce, ale odhadem v naší Galaxii až 100000; nestabilní útvary, postupně se rozpadají; např. Plejády, Praesepe, dvojitá hvězdokupa χ a h Per;

pohybové hvězdokupy – pohyb stejným směrem a stejnou rychlostí vůči hvězdnému pozadí („hvězdám pole“) – Plejády, Hyády, hvězdy p.h. ale mohou být rozesety po celé hvězdné obloze (*Ursa Maior*)




Hvězdokupy

kulové hvězdokupy - gravitačně velmi silně vázané soustavy; 10^4 až 10^6 hvězd; výrazně kulovitý tvar a silnou koncentraci ke středu; střední průměr cca 50 ly; asi 150 známých, v Galaxii odhadem 500 až 1000; např. M 13 v Herkulovi, ω Cen, 47 Tuc





ω Cen



10' střed Omega Centauri (HST)

Mlhoviny

mezihvězdná látka – prach a plyn, projevuje se *zeslabováním* (*extinkcí*) světla


historické dělení

- **temná mračna** – hustší, lze je spatřit jen na světlejším pozadí nebo někde na hv. obloze „chybí“ hvězdy (Koňská hlava, Uhelný pytel)
- **svítící mlhoviny**
 - odraz nebo rozptyl světla blízkých hvězd,
 - samy září, k záření vybuzeny blízkými horkými hvězdami





Mlhoviny

a) Materiál pro tvorbu hvězd – hvězdné porodnice




b) Vznik během vývoje hvězd – v okolí/ na místě hvězdy

planetární mlhovina – v dalekohledu tvar prstence, malého kotoučku; odhozená vnější vrstva hvězdy v závěru hvězdného vývoje; s planetami nemá nic společného!



pozůstatky po výbuchu supernovy

závěrečné stadium velmi hmotné hvězdy
– výbuch supernovy, hvězda rozmetána do okolí



Naše a cizí galaxie


galaxie – dříve název pro Mléčnou dráhu
z řeckého *gálaktos* = mléko – podle řecké báje

dnes pojmy Galaxie a Mléčná dráha rozlišujeme!

Mléčná dráha – pás na hvězdné obloze
– boční pohled na naši hvězdnou soustavu,
naši **Galaxii**



pouhýma očima – M31, LMC, SMC



Galaxie - v dalekohledech




Atmosférické vlivy na astronomická pozorování

atmosférická extinkce $m_0 = m - kX$

k ... extinkční koeficient; X ... vzdušná hmota

$$X = \sec z$$

z ... zenitová vzdálenost






Závislost instrumentální hvězdné velikosti hvězdy GSC1326-1430 v B filtru na optické (vzdušné) hmotě. Nejlepší byla 1. noc, během 2. noci se měnily podmínky, 3. noc zhoršená, ale poměrně konstantní extinkce. (Pozorováno v Ondřejově, 14.2.-24.3.1995; L. Kotková)

Scintilace – mihotání hvězd, pohybem vzdušných mas, přes něž prochází záření hvězdy


Proč svítí planety na obloze „klidnějším světlem“, mají menší scintilaci?

Seeing – „rozmazání“ obrazu hvězdy,
v ČR kolem 2“ až 5“, nejlepší pozorovací stanoviště 0.4“



Světelné znečištění

není jen záležitost astronomů;
přesvětlené nebe nás stojí peníze i zdraví!





- 8/9
City/Inner
City Sky
- 7
City/
Suburbia
Transition
- 6
Bright
Suburban
Sky
- 5
Suburban
Sky
- 4
Suburban/Rural
Transition
- 3
Rural Sky
- 2
Dark-Sky
Site
- 1
Excellent
Dark-Sky
Site

Česká republika v noci (družicové snímky z let 2000 a 2012)



Kde se budete cítit lépe?



Praktika:

Astronomické souřadnice, Dírková komora