

# Vnitrosemestrální písemka – MIN301 – podzim 2021 – 9. 11. 2021

Veškeré odpovědi musí být zdůvodněny a výpočty musí být doprovizeny komentářem. (Řešení sestávající pouze z odpovědí budou považována za opsaná a hodnocena 0 body.)

- (5 bodů) V rovině  $\mathbb{R}^2$  uvažme kružnici  $C$  a kruh  $K$ , obojí o poloměru 5 se středem v počátku. Dále mějme funkci  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  danou předpisem  $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$ .
  - Určete extrémy funkce  $f(x, y)$  na množině  $C$ .
  - Určete extrémy funkce  $f(x, y)$  na množině  $K$ .

*Zde uvažujeme kruh včetně hranice (což je kružnice), tj.  $C \subseteq K$ .*

- (5 bodů) V rovině uvažme oblast  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  omezenou křivkami  $y = x^2$ ,  $y = 2x$  a  $y = 1$  v polorovině  $y \leq 1$  a dále mějme funkci  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  danou předpisem  $f(x, y) = x - y$ . Nechť  $I$  je integrál  $I = \iint_A f(x, y) dx dy$ .

- Načrtněte oblast  $A$  (tj. načrtněte zadané křivky a určete „vrcholy“ oblasti) a napište integrál  $I$  dvěma způsoby pomocí jednoduchých integrálů

$$\int_*^* \int_*^* f(x, y) dx dy \quad \text{a} \quad \int_*^* \int_*^* f(x, y) dy dx$$

nebo součet takových integrálů. Zde je samozřejmě třeba určit chybějící meze integrálů.

- Spočtěte integrál  $I$ .

# Řešení a bodování:

## 1. [5 bodů]

Zadané množiny jsou

$$C = \{[x, y] \in \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 25\} \quad \text{a} \quad K = \{[x, y] \in \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 \leq 25\}, \quad [0.5b].$$

a) [3b] Určíme stacionární body Lagrangeovy funkce

$$L(x, y, \lambda) = (x^2 + y^2 - x - y) + \lambda(x^2 + y^2 - 25).$$

Přímým výpočtem dostaneme

$$L_x(x, y, \lambda) = 2x - 1 + 2x\lambda = 0,$$

$$L_y(x, y, \lambda) = 2y - 1 + 2y\lambda = 0,$$

$$L_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 25 = 0, \quad [1b].$$

Tato soustava má dvě řešení:  $[\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}]$  a  $[-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}]$ , [0.5b]. Množina  $C$  je kompaktní, tj. funkce  $f(x, y)$  na ní nabývá maxima a minima. Jelikož jsme našli právě dva stacionární body, jsou oba extrémy, [0.5b]. Podle

$$f\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 5 - 5\sqrt{2} \quad \text{a} \quad f\left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 5 + 5\sqrt{2}$$

je v bodě  $[\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}]$  minimum a v bodě  $[-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}]$  maximum, [1b].

b) [1.5b] K výpočtu extrémů uvnitř koule nám stačí spočítat lokální extrémy bez jakéhokoliv omezení. V tomto případě jsou stacionární body dány vztahy

$$f_x(x, y) = 2x - 1 = 0 \quad \text{a} \quad f_y(x, y) = 2y - 1 = 0,$$

tj. je to jediný bod  $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ , [0.5b]. Matice druhých derivací

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{xy}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

je pozitivně definitní, [0.5b], tedy jde o lokální minimum. Jelikož bod  $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$  leží uvnitř kruhu a  $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$  je menší než hodnota minima na kružnici (v bodě  $[\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}]$ ), má funkce  $f(x, y)$  na kruhu  $K$  minimum v bodě  $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$  a maximum v bodě  $[-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}]$ , [0.5b].

## 2. [5 bodů]

a) [3b] Z obrázku [1b] přímo vidíme, že

$$I = \int_0^{1/2} \int_{x^2}^{2x} (x - y) dy dx + \int_{1/2}^1 \int_{x^2}^1 (x - y) dy dx \quad \text{nebo} \quad I = \int_0^1 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (x - y) dx dy,$$

[1b+1b].

c) [2b] S využitím například druhé možnosti v části (a) dostaneme

$$I = \int_0^1 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (x - y) dx dy = \int_0^1 \left[ \frac{1}{2}x^2 - xy \right]_{x=y/2}^{x=\sqrt{y}} dy = \dots = -\frac{1}{40},$$

[1b za postup a 1b za správný výsledek].