

## 17. Otočení, vlastnosti a užití

Orientovaný úhel, jeho základní a obecná velikost.

Definice otočení. Vlastnosti otočení.

Konstrukce rovnoramenných trojúhelníků. Otočení kopie útvaru. Využití úhlu mezi přímkou a jejím obrazem.

---

**Definice.** Je dán bod  $S$  a orientovaný úhel, jehož jedna velikost je  $\varphi$ . Otočení neboli rotace je shodné zobrazení  $\mathcal{R}(S, \varphi)$ , které přiřazuje:

- (1) každému bodu  $X \neq S$  bod  $X' \neq S$  tak, že platí  $|X'S| = |XS|$  a orientovaný úhel  $XSX'$  má velikost  $\varphi$ ,
- (2) bodu  $S$  bod  $S' = S$ .

Bod  $S$  se nazývá střed otočení, orientovaný úhel o velikosti  $\varphi$  úhel otočení.

*Poznámka.* Rozlišujme termíny *otočení* a *otáčení*. Otočení se středem  $S$  a úhlem  $\varphi$  je výsledkem pohybu, kterým je otáčení kolem bodu  $S$  o úhel  $\varphi$ .

### Vlastnosti otočení.

Dále  $k$  značí libovolné celé číslo.

- (1) V případě  $\varphi = k \cdot 360^\circ$  je  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  identické zobrazení (tj.  $\forall X: X' = X$ ).  
V případě  $\varphi = (2k + 1) \cdot 180^\circ$  je  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  středová souměrnost  $\mathcal{S}(S)$ .
  - (2) Inverzní zobrazení k  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  je otočení  $\mathcal{R}(S, -\varphi)$ .
  - (3) V případě  $\varphi \neq k \cdot 360^\circ$  má  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  jediný samodružný bod  $S$ .
  - (4) V případě  $\varphi \neq k \cdot 180^\circ$  nemá  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  žádnou samodružnou přímku.
  - (5) Je-li  $\varphi \neq k \cdot 180^\circ$ , pak obrazem každé přímky  $p$  v  $\mathcal{R}(S, \varphi)$  je přímka  $p'$ , která má od bodu  $S$  stejnou vzdálenost jako přímka  $p$  a je s ní různoběžná. Jeden z úhlů mezi přímkami  $p$  a  $p'$  lze orientovat tak, aby měl velikost  $\varphi$ .
  - (6) Otočení je přímá shodnost, tj. zachovává orientaci každého úhlu.
- 

**Příklad 1.** Je dána kružnice  $k$ , přímka  $l$  a bod  $M$ . Sestrojte rovnostranný trojúhelník  $KLM$  tak, aby platilo  $K \in k$  a  $L \in l$ .

**Příklad 2.** Do daného rovnoběžníku  $KLMN$  vepište čtverec  $ABCD$  tak, aby platilo  $A \in KL$ ,  $B \in LM$ ,  $C \in MN$  a  $D \in NK$ .

**Příklad 3.** Je dána kružnice  $k(S, r)$  a bod  $C$  ( $C \neq S$ ,  $C \notin k$ ). Dále je dána úsečka délky  $c$  ( $c < 2r$ ) a úhel velikosti  $\gamma$ . Sestrojte  $\triangle ABC$  s úhlem  $\gamma$  při vrcholu  $C$ , stranou  $AB$  délky  $c$  a vrcholy  $A, B$  na kružnici  $k$ .

**Příklad 4.** Je dána kružnice  $k$  a mimo ni dva různé body  $P$  a  $Q$ . Vedte jimi dvě různé rovnoběžky  $p$  a  $q$  ( $P \in p$  a  $Q \in q$ ) tak, aby pás mezi nimi vyřezal na kružnici  $k$  dvě čtvrtkružnice.

KONEC DOKUMENTU