

# Ztráta jistoty: matematická logika, neúplnost

CORE004 Matematika jako součást kultury

Zdeněk Pospíšil  
[707@mail.muni.cz](mailto:707@mail.muni.cz)

Masarykova univerzita

15. prosince 2022

# Obsah

Obrat k jazyku

Jazyk matematiky

Matematika jazyka

Logiky

# Obrat k jazyku

# Obrat k jazyku

Co je to X?



# Obrat k jazyku

Co je to X?



Co označuje ,X'?



Rudolf Carnap, 1891–1970

# Obrat k jazyku

Co je to X?



Co označuje ,X'?




Rudolf Carnap, 1891–1970

V jakých souvislostech používáme ,X'?



Ludwig Wittgenstein, 1889–1951

# Rhindův papyrus



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .


Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .

Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .


Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.

Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .


Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.

Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).  
Týká se jediného případu.



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .

Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.


Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.

Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).

Týká se jediného případu.

Není uvedena ani náznak metody.



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .

Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .


To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.

Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).

Týká se jediného případu.

Není uvedena ani náznak metody.

Úloha není integrována do žádného systému.



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .

Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.


Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).

Týká se jediného případu.

Není uvedena ani náznak metody.

Úloha není integrována do žádného systému.

Nic se nevysvětluje (proč to funguje).



18st BCE

kopie staršího originálu

# Rhindův papyrus

Kruhová sýpka (o rozměrech) 10, 10.

Odečti  $\frac{1}{9}$  z 10, je to  $1\frac{1}{9}$  a zbytek je  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}\frac{1}{18}$ .

Počítej s  $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$   $8\frac{2}{3}\frac{1}{6}$  krát. Vyjde  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$ .

Počítej s  $79\frac{1}{108}\frac{1}{324}$  10 krát. Vyjde  $790\frac{1}{18}\frac{1}{27}\frac{1}{324}$ .

Přidej k tomu  $\frac{1}{2}$  z toho. Vyjde 1 185.

Počítej s 1 185 20 krát, je to  $59\frac{1}{4}$ .

To je co se do ní vejde v stovkách čtyřnásobných měřic.

Chybí jakékoliv zdůvodnění (že to funguje).


Týká se jediného případu.

Není uvedena ani náznak metody.

Úloha není integrována do žádného systému.

Nic se nevysvětluje (proč to funguje).

Nepřesahuje nic fakticky daného.



18st BCE

kopie staršího originálu

# Jazyky matematiky

aritmetika


syntetická geometrie

algebra

analytická geometrie

matematická analýza

# Jazyky matematiky



# Potenciality jazyků

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat
- *Expresívní síla* – co (nového) lze vyjádřit

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat
- *Expresívní síla* – co (nového) lze vyjádřit
- *Metodická síla* – jaké metody lze zavést (místo spletí nesouvisejících triků)

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat
- *Expresívní síla* – co (nového) lze vyjádřit
- *Metodická síla* – jaké metody lze zavést (místo spletí nesouvisejících triků)
- *Integrativní síla* – jak je možné vidět jednotu tam, kde se ukazovaly jen jednotlivé případy

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat
- *Expresívní síla* – co (nového) lze vyjádřit
- *Metodická síla* – jaké metody lze zavést (místo spletí nesouvisejících triků)
- *Integrativní síla* – jak je možné vidět jednotu tam, kde se ukazovaly jen jednotlivé případy
- *Explanatorická síla* – jak lze vysvětlit selhání předchozího jazyka

# Potenciality jazyků

- *Logická síla* – co lze dokázat
- *Expresívní síla* – co (nového) lze vyjádřit
- *Metodická síla* – jaké metody lze zavést (místo spletí nesouvisejících triků)
- *Integrativní síla* – jak je možné vidět jednotu tam, kde se ukazovaly jen jednotlivé případy
- *Explanatorická síla* – jak lze vysvětlit selhání předchozího jazyka
- *Konstitutivní síla* – jak lze konstituovat nové objekty, jak jazyk umožňuje překročit meze skutečnosti dané v rámci předchozího jazyka

# Potenciality jazyků

## Logická síla

Vyjadřování obecnosti

Jazyk syntetické geometrie: neurčitá délka úsečky

Jazyk algebry: symbol pro proměnnou

Jazyk analytické geometrie: rozvinutí veličiny do tvaru číselné osy

Jazyk matematické analýzy: zavedení proměnných veličin

# Potenciality jazyků

## Expresivní síla

Generování komplexnosti

Jazyk syntetické geometrie: Eukleidovy postuláty

Jazyk algebry: vytváření vyšších mocnin

Jazyk analytické geometrie: reinterpretace násobení

Jazyk matematické analýzy: zavedení nekonečných řad

# Potenciality jazyků

## Metodická síla

Zavádění parametrů

Jazyk syntetické geometrie: označování bodů a přímek písmeny v obrázcích

Jazyk algebry: zavedení symbolů pro parametry

Jazyk analytické geometrie: odlišení závisle a nezávisle proměnné

Jazyk matematické analýzy: zavedení funkcionálních parametrů

# Potenciality jazyků

## Integrativní síla

Nacházení jednoty, spojení termů do forem

Jazyk syntetické geometrie: (jednota Eukleidových základů)

Jazyk algebry: zavedení polynomických forem

Jazyk analytické geometrie: vyjádření křivek pomocí polynomických forem

Jazyk matematické analýzy: sjednocení polynomů, exponenciálních a goniometrických funkcí pomocí nekonečných řad

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

Jazyk syntetické geometrie: nemožnost trisekce úhlu

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

Jazyk syntetické geometrie: nemožnost trisekce úhlu

Jazyk algebry: lze vytvořit predikát „kořen irreducibilního polynomu třetího stupně“

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

Jazyk syntetické geometrie: nemožnost trisekce úhlu

Jazyk algebry: lze vytvořit predikát „kořen irreducibilního polynomu třetího stupně“  
některé rovnice nemají řešení

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

**Jazyk syntetické geometrie:** nemožnost trisekce úhlu

**Jazyk algebry:** lze vytvořit predikát „kořen irreducibilního polynomu třetího stupně“  
některé rovnice nemají řešení

**Jazyk analytické geometrie:** křivky v rovině se nemusí protínat

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

**Jazyk syntetické geometrie:** nemožnost trisekce úhlu

**Jazyk algebry:** lze vytvořit predikát „kořen irreducibilního polynomu třetího stupně“  
některé rovnice nemají řešení

**Jazyk analytické geometrie:** křivky v rovině se nemusí protínat  
nemožnost kvadratury kruhu

# Potenciality jazyků

## Explanatorická síla

Vytváření formálních predikátů; vysvětlení selhání předchozího jazyka

Jazyk syntetické geometrie: nemožnost trisekce úhlu

Jazyk algebry: lze vytvořit predikát „kořen irreducibilního polynomu třetího stupně“  
některé rovnice nemají řešení

Jazyk analytické geometrie: křivky v rovině se nemusí protínat  
nemožnost kvadratury kruhu

Jazyk matematické analýzy: platí  $e^{i\pi} + e^0 = 0$  a Lindenmannova věta<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pokud  $A_1, A_2, \dots, a_n$  jsou nenulová a  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  jsou různá algebraická čísla, pak  $A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_n e^{\alpha_n} \neq 0$ .

# Potenciality jazyků

## Konstitutivní síla

Definování nových objektů pomocí určitých deskripcí

# Potenciality jazyků

## Konstitutivní síla

Definování nových objektů pomocí určitých deskripcí

Jazyk syntetické geometrie:

Jazyk algebry: záporná čísla, odmocniny, komplexní čísla, ...

# Potenciality jazyků

## Konstitutivní síla

Definování nových objektů pomocí určitých deskripcí

Jazyk syntetické geometrie:

Jazyk algebry: záporná čísla, odmocniny, komplexní čísla, ...

Jazyk analytické geometrie: transcendentní křivky, logaritmus jako číslo vyjadřující obsah pod hyperbolou  $xy = 1$  mezi body 1 a  $x$ , ...

# Potenciality jazyků

## Konstitutivní síla

Definování nových objektů pomocí určitých deskripcí

Jazyk syntetické geometrie:

Jazyk algebry: záporná čísla, odmocniny, komplexní čísla, ...

Jazyk analytické geometrie: transcendentní křivky, logaritmus jako číslo vyjadřující obsah pod hyperbolou  $xy = 1$  mezi body 1 a  $x$ , ...

Jazyk matematické analýzy: funkce jako integrál horní meze, řešení diferenciální rovnice, ...

# Řecká antika

# Řecká antika

Aristotelés: *Organon*



384–322 B.C.E

# Řecká antika

Aristotelés: *Organon*

Categoriae

kolikost, jakost, vztahy, místo, čas,  
zasazení, podmínky, aktivita, trpnost  
propozice a soudy:

De Interpretatione

obecný kladný	S a P
částečný kladný	S e P
obecný záporný	S i P
částečný záporný	S o P

Analytica Priora

úsudky

Analytica Posteriora

důkazy a deduktivní výstavba vědy

Topica

dialektika

De Sophisticis Elenchis



384–322 B.C.E

# Řecká antika

Aristotelés: *Organon*

Categoriae	kolikost, jakost, vztahy, místo, čas, zasazení, podmínky, aktivita, trpnost	
De Interpretatione	propozice a soudy: obecný kladný částečný kladný obecný záporný částečný záporný	S a P S e P S i P S o P
Analytica Priora	úsdudky	
Analytica Posteriora	důkazy a deduktivní výstavba vědy	
Topica	dialektika	
De Sophisticis Elenchis		



384–322 B.C.E

Megarsko-stoická škola: *λογιοι αναποδεικτικοι*

# Řecká antika

Aristotelés: *Organon*

Categoriae	kolikost, jakost, vztahy, místo, čas, zasazení, podmínky, aktivita, trpnost	
De Interpretatione	propozice a soudy: obecný kladný částečný kladný obecný záporný částečný záporný	S a P S e P S i P S o P
Analytica Priora	úsdudky	
Analytica Posteriora	důkazy a deduktivní výstavba vědy	
Topica	dialektika	
De Sophisticis Elenchis		



384–322 B.C.E

Megarsko-stoická škola: *λογιοι αναποδεικτικοι*

- (I) Jestliže prvé, druhé; avšak prvé; tedy druhé
- (II) Jestliže prvé, druhé; avšak nikoli druhé; tedy nikoli prvé
- (III) Nikoli prvé a druhé; avšak prvé; tedy nikoli druhé
- (IV) Buď prvé nebo druhé; avšak prvé; tedy nikoli druhé
- (V) Buď prvé nebo druhé; avšak nikoli prvé; tedy druhé

# Ramon Llull

## Vrcholné umění obecnosti

*Ars Generalis Ultima*, cca 1305



1232–1316

# Ramon Llull

## Vrcholné umění obecnosti

*Ars Generalis Ultima*, cca 1305



1232–1316

Mechanické ověřování úsudků:



# Ramon Llull

## Vrcholné umění obecnosti

*Ars Generalis Ultima*, cca 1305



1232–1316

Mechanické ověřování úsudků:



G. W. Leibniz: Ars combinatoria

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy  
*identity*: Každý předmět je sám sobě roven



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven  
*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$

*dostatečného důvodu*: nic se neděje bez příčiny



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$

*dostatečného důvodu*: nic se neděje bez příčiny

- „Charakteristická čísla“



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$

*dostatečného důvodu*: nic se neděje bez příčiny

- „Charakteristická čísla“

- Vytvoření grafických nástrojů



1646–1716

# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$





*dostatečného důvodu*: nic se neděje bez příčiny



1646–1716

- „Charakteristická čísla“

- Vytvoření grafických nástrojů



# Gottfried Wilhelm Leibniz

## Práce na teorii sylogismů

- Axiomatizace, principy

*identity*: Každý předmět je sám sobě roven

*vyloučené třetí možnosti*:  $A$  je  $B$  nebo  $\text{non}B$

*sporu*:  $A$  není  $\text{non}A$



*dostatečného důvodu*: nic se neděje bez příčiny

- „Charakteristická čísla“

- Vytvoření grafických nástrojů



1646–1716


$\begin{array}{c} \textit{Ferio} \\ \hline \text{E} & \text{Nullum C est B} \\ \text{I} & \text{Qu. D est C} \\ \text{O} & \text{E. Qu. D non est B} \end{array}$	$\left  \begin{array}{c} \text{B} \\ \text{C} \\ \text{D} \end{array} \right.$	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>C      D</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>B</p> </div> </div>
---	--	--

nempe omne D quod est [in] C.

# George Boole

## Zákony myšlení

*The Laws of Thought*, 1854




1815–1864

# George Boole

## Zákony myšlení

*The Laws of Thought, 1854*



1815–1864

Booleova algebra:

$x \vee y = y \vee x$	$x \wedge y = y \wedge x$	komutativita
$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$	$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$	asociativita
$x \vee 0 = x$	$x \wedge 1 = x$	neutrální prvek
$x \wedge x' = 0$	$x \vee x' = 1$	komplementární prvek
$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$	distributivita
$x \vee (x \wedge y) = x$	$x \wedge (x \vee y) = x$	absorpce
<hr/>	<hr/>	<hr/>
$x \vee x = x$	$x \wedge x = x$	idempotence
$x \vee 1 = 1$	$x \wedge 0 = 0$	agresivita
$(x \vee y)' = x' \wedge y'$	$(x \wedge y)' = x' \vee y'$	De Morganovy zákony

# Gottlob Frege

## Formální logika



1848–1925

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879



1848–1925

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879



1848–1925

Logika **není** věda o správném myšlení. Ale o vyplývání a jeho převádění na řetězce elementárních odvození (inferencí).

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879



1848–1925

Logika **není** věda o správném myšlení. Ale o vyplývání a jeho převádění na řetězce elementárních odvození (inferencí).

Druhý zakladatel logiky.

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879

*Die Grundlagen der Arithmetik*, 1884



1848–1925

Logika **není** věda o správném myšlení. Ale o vyplývání a jeho převádění na řetězce elementárních odvození (inferencí).

Druhý zakladatel logiky.

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879

*Die Grundlagen der Arithmetik*, 1884

*Über Sinn und Bedeutung*, 1892



1848–1925

Logika **není** věda o správném myšlení. Ale o vyplývání a jeho převádění na řetězce elementárních odvození (inferencí).

Druhý zakladatel logiky.

# Gottlob Frege

## Formální logika

*Begriffsschrift*, 1879

*Die Grundlagen der Arithmetik*, 1884


*Über Sinn und Bedeutung*, 1892




1848–1925

Logika **není** věda o správném myšlení. Ale o vyplývání a jeho převádění na řetězce elementárních odvození (inferencí).

Druhý zakladatel logiky.



# Ludwig Wittgenstein




1889–1951

# Ludwig Wittgenstein

*Logisch-Philosophische Abhandlung*, 1921

*Tractatus Logico-Philosophicus*, 1922




1889–1951

# Ludwig Wittgenstein

*Logisch-Philosophische Abhandlung*, 1921

*Tractatus Logico-Philosophicus*, 1922




1889–1951

Svět je vše, co je zkrátka tak.

# Ludwig Wittgenstein

*Logisch-Philosophische Abhandlung*, 1921

*Tractatus Logico-Philosophicus*, 1922



1889–1951

Svět je vše, co je zkrátka tak.

Logika není nauka, nýbrž zrcadlový obraz světa.  
Matematika je metoda logiky.

# Ludwig Wittgenstein

*Logisch-Philosophische Abhandlung*, 1921

*Tractatus Logico-Philosophicus*, 1922



1889–1951


Svět je vše, co je zkrátka tak.

Logika není nauka, nýbrž zrcadlový obraz světa.  
Matematika je metoda logiky.


O čem lze mluvit, o tom lze mluvit jasně.

O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel Logistika



A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika


B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



Matematika je logika:

The fact that all Mathematics is Symbolic Logic is one of the greatest discoveries of our age; and when this fact has been established, the remainder of the principles of mathematics consists in the analysis of Symbolic Logic itself.

A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



Matematika je logika:

The fact that all Mathematics is Symbolic Logic is one of the greatest discoveries of our age; and when this fact has been established, the remainder of the principles of mathematics consists in the analysis of Symbolic Logic itself.

Paradox:

A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



Matematika je logika:

The fact that all Mathematics is Symbolic Logic is one of the greatest discoveries of our age; and when this fact has been established, the remainder of the principles of mathematics consists in the analysis of Symbolic Logic itself.

Paradox:

$$M := \{A : A \notin A\}$$

A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



Matematika je logika:

The fact that all Mathematics is Symbolic Logic is one of the greatest discoveries of our age; and when this fact has been established, the remainder of the principles of mathematics consists in the analysis of Symbolic Logic itself.

Paradox:

$$M := \{A : A \notin A\}$$

$$M \in M \Leftrightarrow M \notin M$$

A.N. Whitehead, 1889–1951



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge,  
1903



Matematika je logika:

The fact that all Mathematics is Symbolic Logic is one of the greatest discoveries of our age; and when this fact has been established, the remainder of the principles of mathematics consists in the analysis of Symbolic Logic itself.

Paradox:

$$M := \{A : A \notin A\}$$

$$M \in M \Leftrightarrow M \notin M$$

A.N. Whitehead, 1889–1951



„Tato věta není pravdivá.“

B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russell


## Logistika

B. Russell: Principles of mathematics, Cambridge, 1903

A.N. Whitehead, B. Russell: *Principia Mathematica*, I 1910, II 1912, III 1913



A.N. Whitehead, 1889–1951



$$M := \{A : A \notin A\}$$

$$M \in M \Leftrightarrow M \notin M$$



B. Russell, 1872–1970

# Alfred N. Whitehead, Bertrand A.W. Russel

## Logistika

SECTION A]	THE CARDINAL NUMBER I	351	LIST OF DEFINITIONS	
*52.601. $\vdash : \alpha \in 1. \mathcal{D} : E! \check{\alpha} : \equiv : x \in \alpha. \mathcal{D}_x. \phi x : \equiv : (\exists x). x \in \alpha. \phi x$			1.01. $p \supset q$	13.03. $x = y = z$
<i>Dem.</i>			2.33. $p \vee q \vee r$	14.01. $[(\forall x)(\phi x)]. \psi(\forall x)(\phi x)$
$\vdash : *52.15. \mathcal{D} : H_p. \mathcal{D} : E! \check{\alpha} : \mathcal{D} : x \in \alpha. \equiv. x = \check{\alpha}.$	(1)		3.01. $p \cdot q$	14.02. $E!(\forall x)(\phi x)$
[*52.4] $\vdash : x \in \alpha. \equiv. x = \check{\alpha}.$			3.02. $p \supset q \supset r$	14.03. $[(\forall x)(\phi x), (\forall x)(\psi x)]. f[(\forall x)(\phi x), (\forall x)(\psi x)]$
[*52.6] $\vdash : x \in \alpha$	(2)		4.01. $p \equiv q$	14.04. $[(\forall x)(\phi x), f[(\forall x)(\phi x), (\forall x)(\psi x)]]$
$\vdash : (1). *30.33. \mathcal{D}$			4.02. $p \equiv q \equiv r$	20.01. $f[\hat{x}(\psi \hat{x})]$
$\vdash : H_p. \mathcal{D} : E! \check{\alpha} : \equiv : x \in \alpha. \mathcal{D}_x. \phi x : \equiv : (\exists x). x \in \alpha. \phi x$	(3)		4.34. $p \cdot q \cdot r$	20.02. $x \in (\phi ! \hat{x})$
$\vdash : (2). (3). \mathcal{D} : \text{Prop}$			9.01. $\sim[(x). \phi x]$	20.03. $Cls$
*52.602. $\vdash : \tilde{x}(\phi x) \in 1. \mathcal{D} : \psi(x)(\phi x) : \equiv. \phi x \mathcal{D}_x \psi x : \equiv : (\exists x). \phi x. \psi x$			9.011. $\sim(x). \phi x$	20.04. $x, y \in \alpha$
[*52.12. *14.26]			9.02. $\sim[(\exists x). \phi x]$	20.05. $x, y, z \in \alpha$
*52.61. $\vdash : \alpha \in 1. \mathcal{D} : \check{\alpha} \in \beta. \equiv. \alpha \in \beta. \equiv. \exists !(\alpha \in \beta)$	[*52.601. $\frac{x \in \beta}{\check{\alpha}}$ ]		9.021. $\sim[(\exists x). \phi x]$	20.06. $x \sim \epsilon \alpha$
*52.62. $\vdash : \alpha, \beta \in 1. \mathcal{D} : \alpha = \beta. \equiv. \check{\alpha} = \check{\beta}$			9.03. $(x). \phi x \cdot v \cdot p$	20.07. $(a). f a$
<i>Dem.</i>			9.04. $p \cdot v \cdot (x). \phi x$	20.071. $(\exists a). f a$
$\vdash : *52.601. \mathcal{D} : H_p. \mathcal{D} : \check{\alpha} = \check{\beta} : \equiv : x \in \alpha. \mathcal{D}_x. x = \check{\alpha} :$			9.05. $(\exists x). \phi x \cdot v \cdot p$	20.072. $[(\forall a)(\phi a)]. f(\forall a)(\phi a)$
[*52.6] $\vdash : x \in \alpha. \equiv. x = \check{\alpha} :$			9.06. $p \cdot v \cdot (\exists x). \phi x$	20.08. $f[\hat{a}(\psi \hat{a})]$
[*52.46] $\vdash : \alpha = \beta : \mathcal{D} : \text{Prop}$			9.07. $(x). \phi x \cdot v \cdot (\exists y). \psi y$	20.081. $\alpha \in \psi ! \hat{\alpha}$
*52.63. $\vdash : \beta \in 1. \alpha + \beta. \mathcal{D} : \alpha \cap \beta = \Lambda$	[*52.46. Transp]		9.08. $(\exists y). \psi y \cdot v \cdot (x). \phi x$	21.01. $f[\hat{x} \psi(x, y)] b$
*52.64. $\vdash : \alpha \in 1. \mathcal{D} : \alpha \cap \beta = \Lambda \cup \check{\alpha} \Lambda$			10.01. $(\exists x). \phi x$	21.02. $a[\phi !(\hat{x}, \hat{y})] b$
<i>Dem.</i>			10.02. $\phi x \mathcal{D}_x \psi x$	21.03. $Rel$
$\vdash : *52.43. \mathcal{D} : H_p. \exists ! \alpha \cap \beta. \mathcal{D} : \alpha \cap \beta = 1 :$			10.03. $\phi x \equiv_{\alpha} \psi x$	21.07. $(R). f R$
[*56. *24.54] $\vdash : H_p. \mathcal{D} : \alpha \cap \beta = \Lambda \cdot v \cdot \alpha \cap \beta = 1 :$			11.01. $(x, y). \phi(x, y)$	21.071. $(\exists R). f R$
[*51.236] $\vdash : \alpha \cap \beta = \Lambda \cup \check{\alpha} \Lambda : \mathcal{D} : \text{Prop}$			11.02. $(x, y, z). \phi(x, y, z)$	21.072. $[(\forall R)(\phi R)]. f(\forall R)(\phi R)$
*52.7. $\vdash : \beta - \alpha \in 1. \alpha \subset \xi. \xi \subset \beta. \mathcal{D} : \xi = \alpha \cdot v \cdot \xi = \beta$			11.03. $(\exists (x, y)). \phi(x, y)$	21.08. $f(\hat{R} \hat{S} \psi(R, S))$
<i>Dem.</i>			11.04. $(\exists (x, y)). \phi(x, y, z)$	21.081. $P[\phi !(\hat{R}, \hat{S})] Q$
$\vdash : *22.41. \mathcal{D} : H_p. \xi \subset \alpha. \mathcal{D} : \xi = \alpha$	(1)		11.05. $\phi(x, y). \mathcal{D}_{x,y}. \psi(x, y)$	21.082. $f(\hat{R}(\psi R))$
$\vdash : *24.55. \mathcal{D} : \sim(\xi \subset \alpha). \mathcal{D} : \check{\xi} - \alpha$	(2)		11.06. $\phi(x, y). \equiv_{x,y}. \psi(x, y)$	21.083. $R \neq \hat{1} \hat{R}$
$\vdash : *22.48. \mathcal{D} : H_p. \mathcal{D} : \xi - \alpha \subset \beta - \alpha$	(3)		13.01. $x = y$	22.01. $\alpha \subset \beta$
$\vdash : (2). (3). \mathcal{D} : H_p. \sim(\xi \subset \alpha). \mathcal{D} : \check{\xi} - \alpha \subset \beta - \alpha$	(4)		13.02. $x \neq y$	22.02. $\alpha \cap \beta$
$\vdash : *52.1. \mathcal{D} : H_p. \sim(\xi \subset \alpha). \mathcal{D} : \beta - \alpha = t^x$	(5)			
$\vdash : (4). (5). *51.4. \mathcal{D} : H_p. \sim(\xi \subset \alpha). \mathcal{D} : \check{\xi} - \alpha = \beta - \alpha.$				
[*24.411] $\vdash : \mathcal{D} : \xi = \beta$	(6)			
$\vdash : (1). (6). \mathcal{D} : \text{Prop}$				

# Kurt Gödel



- 1906** 28. dubna narozen v Brně (Pekařská 5)
- 1912–1916** Evangelická základní škola v Brně (s německou řečí)
- 1916–1924** Reálné gymnázium v Brně (s německou řečí)
- 1924** Vstupuje na univerzitu ve Vídni
- 1927** Seznamuje se s Adelou Nimburskou, roz. Porketovou
- 1929** Vzdává se československého občanství, nabývá občanství rakouského  
24. října obhajuje disertaci *Über die Vollständigkeit des Logikkalkulus*.
- 1929–1939** Zásadní výsledky na poli matematické logiky
- 1931** *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme I.* Monatshefte für Mathematik und Physik, **38**, 137–198.
- 1933** 11. března habilitován na Vídeňské univerzitě
- 1938** 20. září svatba s Adelou Nimburskou ve Vídni
- 1940** V lednu až březnu cesta manželů Gödelových do USA (přes Sibiř, Yokohamu a San Francisco do Princetonu)
- 1947** What is Cantor's continuum problem? American Mathematical Monthly, **54**, 515–525.
- 1948** Získává americké občanství
- 1949** An example of a new type of cosmological solutions of Einstein's field equations of gravitation. Review of Modern Physics, **21**, 447–450.
- 1958** Über eine bisher noch nicht benützte Erweiterung des finiten Standpunktes. Dialectica, **12**, 280–287. (Poslední publikovaná práce)
- 1978** 14. ledna umírá v Princetonu
- 1992** 9. dubna založena Společnost Kurta Gödela v Brně
- 1996** 25.–29. srpna mezinárodní konference Logical Foundations of Mathematics, computer Science and Physics – Kurt Gödel Legacy v Brně

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

Lze precizovat, které posloupnosti základních znaků jsou smysluplné.

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

Lze precizovat, které posloupnosti základních znaků jsou smysluplné.

Důkazy jsou konečné posloupnosti formulí s pevně stanovenými vlastnostmi.

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

Lze precizovat, které posloupnosti základních znaků jsou smysluplné.

Důkazy jsou konečné posloupnosti formulí s pevně stanovenými vlastnostmi.

K formuli lze přidat symbol  $\vdash$ , který označuje její dokazatelnost.

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

Lze precizovat, které posloupnosti základních znaků jsou smysluplné.

Důkazy jsou konečné posloupnosti formulí s pevně stanovenými vlastnostmi.

K formuli lze přidat symbol  $\vdash$ , který označuje její dokazatelnost.

Všechny znaky se zobrazí na přirozená čísla. Formule je reprezentovatelná konečnou posloupností přirozených čísel, důkaz konečnou posloupností konečných posloupností čísel.

# Kurt Gödel

## Neúplnost formálně-logických systémů

O formálně nerozhodnutelných větách v *Principia mathematica* a příbuzných systémech, 1931

Formule („věty“) formálního systému jsou konečné posloupnosti základních znaků („písmen“) – pro proměnné, logické konstanty, závorky.

Lze precizovat, které posloupnosti základních znaků jsou smysluplné.

Důkazy jsou konečné posloupnosti formulí s pevně stanovenými vlastnostmi.

K formuli lze přidat symbol  $\vdash$ , který označuje její dokazatelnost.

Všechny znaky se zobrazí na přirozená čísla. Formule je reprezentovatelná konečnou posloupností přirozených čísel, důkaz konečnou posloupností konečných posloupností čísel.

Zkonstruuje se formule  $A$ , pro kterou  $\vdash A \Leftrightarrow \not\vdash A$ .

# Logický kalkul

- Abeceda – používané symboly
- Pravidla pro tvorbu formulí
- Axiomy
- Odvozovací pravidla

Sémantika: význam formulí

# Výrokový kalkul

## Abeceda výrokového počtu

1.  $a, b, c, \dots, a_1, a_2, a_3, \dots$  atomické výroky {výrokové proměnné}
2.  $\neg, \rightarrow$  (výrokové) operátory
3.  $(, )$  levá a pravá závorka

## Definice výroků

- (i) Každý atomický výrok je výrok.
- (ii) Je-li  $A$  výrok, je i  $\neg A$  výrok.
- (iii) Jsou-li  $A, B$  výroky, je i  $(A \rightarrow B)$  výrok.
- (iv) Není jiných výroků.

# Výrokový kalkul

## Klasický

### Axiomy

- (1)  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2)  $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$
- (3)  $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- (4)  $\neg \neg A \rightarrow A$

### Odvozovací pravidlo

$A \rightarrow B, A \mid B$

# Výrokový kalkul

## Klasický

### Axiomy

- (1)  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2)  $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$
- (3)  $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- (4)  $\neg \neg A \rightarrow A$

### Odvozovací pravidlo

$A \rightarrow B, A \mid B$

### Sémantika

Významy výroků: T, F (true, false)

$A$	$\neg A$
T	F
F	T

$A$	$B$	$A \rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

# Výrokový kalkul

## Intuicionistický

### Axiomy

- (1)  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2)  $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$
- (3)  $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
- (4)  $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$

### Odvozovací pravidlo

$A \rightarrow B, A \mid B$

### Sémantika

Významy výroků: T, F (true, false)

# Výrokový kalkul

## Vícehodnotový (fuzzy)

### Axiomy

- (1)  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2)  $(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (3)  $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
- (4)  $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$

### Odvozovací pravidlo

$A \rightarrow B, A \mid B$

### Sémantika

Význam výroku  $A$ : pravdivostní hodnota  $\mathcal{P}(A)$  z intervalu  $\langle 0, 1 \rangle$ ;  
 $1 \sim T$  (true),  $0 \sim F$  (false)

$$\mathcal{P}(\neg A) = 1 - \mathcal{P}(A), \quad \mathcal{P}(A \rightarrow B) = \max \{1 - \mathcal{P}(A), \mathcal{P}(B)\}$$

# Výrokový kalkul

## Modální S4

### Axiomy

- (1)  $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (2)  $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$
- (3)  $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- (4)  $\neg\neg A \rightarrow A$
- (5)  $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$
- (6)  $\Box A \rightarrow A$
- (7)  $\Box A \rightarrow \Box\Box A$

### Odvozovací pravidla

$A \rightarrow B, A \mid B$

$A \mid \Box A$

### Sémantika

Možné světy

# Výrokový kalkul

## Parakonzistentní

### Sémantika

- Významy výroků:
- T true (pravda)
  - F false (nepravda)
  - O truth-value gap (ani pravda ani nepravda)
  - X truth-value gluts (pravda i nepravda)

$A$	$\neg A$
T	F
O	O
X	X
F	T

		$B$				
		T	O	X	F	
$A \rightarrow B$		T	T	O	X	F
		O	T	O	T	O
		X	T	T	X	X
		F	T	T	T	T

MASARYKOVÁ  
UNIVERZITA