

Anoxické bakterie rostoucí v jezerním sedimentu produkovaly stejné molární množství uhlíku oxidu uhličitého a methanu podle biochemické reakce $2\{\text{CH}_2\text{O}\} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{CH}_4$, takže voda v jezeře byla nasycena jak plynem CO_2 , tak plynem CH_4 . V jednotkách $\text{mol} \times \text{L}^{-1} \times \text{atm}^{-1}$ Henryho konstanta pro CO_2 je $3,38 \times 10^{-2}$ a konstanta CH_4 má hodnotu $1,34 \times 10^{-3}$. V hloubce, ve které se plyn vyvýjel, celkový tlak byl 1,10 atm a teplota byla 25 °C, parciální tlak par vody byl 0,0313 atm. Vypočítejte koncentrace rozpuštěného CO_2 a rozpuštěného CH_4 .

$$H_{CO_2} = 3.38 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$$

$$H = \frac{[V]}{P_k}$$

$$H_{CH_4} = 1.34 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1}$$

50% 50%

$$n_{CO_2} = n_{CH_4} \quad V_{CO_2} + V_{CH_4} = 100\%$$

$$p_{CO_2} = 0.5 \times 1.1 \text{ atm} = 0.55 \text{ atm} - 0.0313 = 0.519 \text{ atm}$$

$$p_{CH_4} = 0.5 \times 1.1 \text{ atm} = 0.55 \text{ atm} - 0.313 = 0.519 \text{ atm}$$

KOREKCE NA $P_{H_2O} \rightarrow$

$$[CO_2] = H_{CO_2} p_{CO_2} = 3.38 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1} \cdot 0.519 \text{ atm} =$$

$$[CH_4] = H_{CH_4} p_{CH_4} = 1.34 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ atm}^{-1} \cdot 0.519 \text{ atm} =$$