

Hustota zářivého toku sluneční energie na jednotku plochy kolmé ke směru šíření záření, dopadající při střední vzdálenosti Slunce od Země na vnější povrch zemské atmosféry, se nazývá sluneční konstanta. Na základě dlouhodobých družicových měření se hodnota sluneční konstanty uvádí  $1367 \text{ W/m}^2$ . Jaká je hustota zářivého toku sluneční energie na jednotku vodorovné plochy ve střední zeměpisné šířce v létě a v zimě?

Vysvětlení: Hustota zářivého toku sluneční energie na jednotku plochy je nejvyšší v kolmém směru (případ vlevo), kdy záření dopadá na nejmenší plochu. Pokud podložku, na kterou dopadá světlo, nakloníme pod nějakým úhlem, záření o stejné intenzitě bude dopadat na větší plochu, tzn. hustota zářivého toku se sníží. Jako praktickou ukázkou zkuste kapesnou svítilnou, nebo mobilem svítit na podložku tak, aby louče dopadali kolmo a pak svítilnu nebo podložku nakloňte. Osvětlený kruh na podložce se změní na elipsu s větší plochou a intenzita osvitu na podložce poklesne.

PLOCHA 1:  $A_1 = a \cdot z$


PLOCHA 2:  $A_2 = b \cdot z$

$$\frac{a}{b} = \sin \theta$$

$$b = \frac{a}{\sin \theta}$$

POMĚR PLOCH:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{a \cdot z \cdot \sin \theta}{a \cdot z} = \sin \theta$$



Hustota zářivého toku je pak nepřímo úměrná ploše, na kterou bude svítit slunce:

$$\frac{G_2}{G_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

$$G_2 = G_{\text{MAX}} \cdot \frac{A_1}{A_2} \quad \text{''}$$



$$G_1 = G_{\text{MAX}} = 1367 \text{ W m}^{-2}$$

VÝŠKA SLUNCE  $\lambda$

úhel severní/souřadnicí plocha - slunce  $\approx$  vodorovnou rovinou



$$G_{max} = 1367 \text{ W/m}^2$$

$$\sin 90^\circ = 1$$

$$\sin 0^\circ = 0$$

$$G = G_{max} \cdot \sin \lambda$$

DEN ROVNODENNOSTI: VÝŠKA SLUNCE:  $90^\circ - \text{ZEM. ŠÍŘKA DANÉHO MÍSTA}$

ZEM. ŠÍŘKA:  $50^\circ$   $\lambda = 90^\circ - 50^\circ =$

LETNÍ SLUNOVRAŤ: VÝŠKA SLUNCE:  $90^\circ - \text{ZEM. ŠÍŘKA} + 23.5^\circ$

$$\lambda = 90^\circ - 50^\circ + 23.5^\circ =$$

SLUNCE NAD ODRÁŽENÍM

ZIMNÍ SLUNOVRAŤ:  $\lambda = 90^\circ - 50^\circ - 23.5^\circ =$

SLUNCE NAD ODÍRÁČENÍM  
BORŤNÍKEM

$$G_{ZS} = 0.284 \cdot 1367 = \text{[redacted]}$$

$$\sin 16.5^\circ = \sin\left(\frac{16.5}{180} \pi\right) = 0.287$$

$$G_{LS} = 0.895 \cdot 1367 = \text{[redacted]}$$

$$\sin 63.5^\circ = \sin\left(\frac{63.5}{180} \pi\right) = 0.895$$

$$G_{\text{RIVNODENNOJT}} = 0.642 \cdot 1367 = \text{[redacted]}$$

$$\sin 40^\circ = \sin\left(\frac{40}{180} \pi\right) = 0.642$$