




Základní kroky v evoluci rostlin a živočichů



ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ aneb LOGIKA VÝVOJE

- rostliny a živočichové jsou složeni z odlišných typů buněk: tyto dvě říše divergovaly ze společného jednobuněčného eukaryotického předka
- každá říše si musela vyvinout své mechanismy buněčné diferenciace a komunikace
- počet genů je u těchto říší obdobný: homologní i jsou do jisté míry i regulační geny zodpovědné za vývojové mechanizmy
- obecné buněčné funkce rostlin a živočichů jsou shodné: struktura jádra, mitózy, meiózy a základní transkripční a translační mašinérie
- regulace prostorově-časové genové exprese jsou podobné, avšak homeotické geny kódující proteiny (se srovnatelnými vývojovými funkcemi) jsou odlišné
- některé transkripční faktory mají vysokou AMK-sekvenční homologii (homeoboxy, MADS boxy), mají však jiné funkce
- řada buněčných procesů včetně receptorů vnějších vlivů a mezibuněčných komunikací jsou zásadně odlišné


VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha

*zárodečné buňky vznikají
ze somatických v pozdním vývoji*

*segreguje od somatické
v časné embryogenezi*



VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha


*zárodečné buňky vznikají
ze somatických v pozdním vývoji*

*segreguje od somatické
v časné embryogenezi*

oplození

dvojité (zygota a endosperm)

jednoduché



VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha

*zárodečné buňky vznikají
ze somatických v pozdním vývoji*

*segreguje od somatické
v časné embryogenezi*

oplození



dvojité (zygota a endosperm)

jednoduché

haploidní fáze

několikabuněčný gametofyt

pouze gamety



VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha

*zárodečné buňky vznikají
ze somatických v pozdním vývoji*

*segreguje od somatické
v časné embryogenezi*

oplození

dvojité (zygota a endosperm)

jednoduché

haploidní fáze


několikabuněčný gametofyt

pouze gamety


imprinting

ovlivňuje vývin endospermu

záasadně řídí embryogenezi



Plants



VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha

*zárodečné buňky vznikají
ze somatických v pozdním vývoji*

*segreguje od somatické
v časné embryogenezi*

oplození

dvojité (zygota a endosperm)

jednoduché

haploidní fáze

několikabuněčný gametofyt

pouze gamety

imprinting




ovlivňuje vývin endospermu

záasadně řídí embryogenezi

diferencované buňky

totipotentní

osud progresivní a irreverzibilní





VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha	<i>zárodečné buňky vznikají ze somatických v pozdním vývoji</i>	<i>segreguje od somatické v časné embryogenezi</i>
oplození	<i>dvojité (zygota a endosperm)</i>	<i>jednoduché</i>
haploidní fáze	<i>několikabuněčný gametofyt</i>	<i>pouze gamety</i>
imprinting	<i>ovlivňuje vývin endospermu</i>	<i>záasadně řídí embryogenezi</i>
diferencované buňky	<i>totipotentní</i>	<i>osud progresivní a irreverzibilní</i>
tělní plán	<i>založen až při postembryonálním vývinu meristému, vliv prostředí</i>	<i>vytvořen již v embryu, vývojový program determinován</i>




VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

zárodečná dráha	zárodečné buňky vznikají ze somatických v pozdním vývoji	segreguje od somatické v časné embryogenezi
oplození	dvojité (zygota a endosperm)	jednoduché
haploidní fáze	několikabuněčný gametofyt	pouze gamety
imprinting	ovlivňuje vývin endospermu	záasadně řídí embryogenezi
diferencované buňky	totipotentní	osud progresivní a irreverzibilní
tělní plán	založen až při postembryonálním vývinu meristému, vliv prostředí	vytvořen již v embryu, vývojový program determinován
tvorba tvarů	podobné vývojové principy včetně specifikace osy, založení vývojových kompartmentů, homeotické geny zajišťují poziční identitu	



VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ



zárodečná dráha	<i>zárodečné buňky vznikají ze somatických v pozdním vývoji</i>	<i>segreguje od somatické v časné embryogenezi</i>
oplození	<i>dvojité (zygota a endosperm)</i>	<i>jednoduché</i>
haploidní fáze	<i>několikabuněčný gametofyt</i>	<i>pouze gamety</i>
imprinting	<i>ovlivňuje vývin endospermu</i>	<i>záasadně řídí embryogenezi</i>
diferencované buňky	<i>totipotentní</i>	<i>osud progresivní a irreverzibilní</i>
tělní plán	<i>založen až při postembryonálním vývinu meristému, vliv prostředí</i>	<i>vytvořen již v embryu, vývojový program determinován</i>
tvorba tvarů	<i>podobné vývojové principy včetně specifikace osy, založení vývojových kompartmentů, homeotické geny zajišťují poziciční identitu</i>	
morfogeneze	<i>buněčný pohyb či lokomoce nejsou, relativní pohyb buněk (gastrulace) závisí na rovině a rychlosti dělení</i>	<i>buněčná migrace (zárodečné buňky)</i>




VÝVOJOVÉ PROCESY U ROSTLIN

- (1) rigidní buněčná stěna (celulóza) brání migraci buněk i lokomočnímu pohybu
- (2) vývoj ovlivněn environmentálními faktory, vznikají fyziologické i genomové adaptace
- (3) formy těla vznikají na základě rozdílů v rychlostech buněčného dělení a buněčném dělením v odlišných rovinách
- (4) veškerý postembryonální růst (včetně tvorby orgánů) pochází z meristémů (kmenové buňky)
- (5) nemají pravou zárodečnou dráhu, tranzice vývoje vegetativního na generativní
- (6) výrazný regulativní vývoj, mezibuněčnými signály jsou mj. nízkomolekulární hormony
- (7) cytoplazmatické kanálky (plasmodesmata) spojují sousední buňky skrze stěny
- (8) jedním z mechanismů diferenciace je i asymetrické buněčné dělení
- (9) jakákoli buňka dává vznik novému jedinci – totipotence: únik z determinovaného stavu?
- (10) dvě nezávislé skupiny strukturně odlišných homeotických genů odpovídají za specifikaci květních částí (MADS-boxové) a stonku i listů (homeoboxové), kolinearita genů neplatí

DIVERZITA ROSTLIN



... jednobuněčná
zelená eukaryota :




Chlamydomonas
a Volvox



Chlamydomonas reinhardtii


- eukaryotická, ale jde s ní manipulovat mikrobiologickými technikami
- snadná kultivace – fotosyntetická či heterotrofní
- mobilní, vykazuje rysy jednoduchého chování
- lze pěstovat v synchronní či asynchronní kultuře
- má rychlý mitotický cyklus, podrobuje se pohlavnímu rozmnožování
- propracovaná genetika – jaderné, plastidové i mitochondriální genomy mají vhodné markery
- všechny tři genomy mohou být transformovány
- dostupné knihovny mutantů a klonů DNA
- možné skladování v tekutém dusíku




Ruth Sager

February 7, 1918 — March 29, 1997

Ruth Sager







životní cyklus

Chlamydomonas

Evoluce mnohobuněčných organizmů



Vlastnosti modelu váleče


- ♣ studium ontogeneze a fylogeneze mnohobuněčnosti a buněčné diferenciace
- ♣ základní tělní plán: asi 2000 biflagelátních somatických buněk a 16 asexuálních reprodukčních buněk (gonidia)
- ♣ diferenciace je buněčně autonomní
- ♣ centrálním rysem diferenciace je asymetrická mitóza (*cell size determines cell fate, large vs. small*)
- ♣ buněčná stěna *Chlamydomonas* se vyvinula ve strukturovanou extra-celulární glykoproteinovou matrix, která spojuje buňky do kolonie (spheroid)
- ♣ bičíkaté somatické buňky (specializované k pohybu, fototaxi a chemotaxi) se podrobují programované smrti
- ♣ neobvyklá kombinace rostlinných (fotoautotrofie) a živočišných (pohyb a časná diferenciace zárodečné dráhy) znaků
- ♣ pozorování Antoni van Leeuwenhoeka (1700), kultivace *in vitro* a životní cyklus - Bill Darden (1966), identifikovány odlišné sexuální formy
- ♣ asexuální životní cyklus řízen světlem, trvá 2 dny a vzniká 16 nových jedinců → izogenní linie
- ♣ nepohlavní embryo tvořené na konci rýhování má už své vlastní somatické a zárodečné buňky
- ♣ pohlavní reprodukce je iniciována teplem, které vyvolá syntézu glykoproteinového feromonu v somatických buňkách: dormantní diploidní zygota
- ♣ vrchol „volvocinní“ věte zelených řas, jednobuněčná bičíkatá *Chlamydomonas*, koloniální *Eudorina* a *Pleodorina*, buněčně diferencovaný *Volvox*



**Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723)**




**David L. Kirk
St. Louis**




asexuální životní cyklus váleče (*Volvox globator*)
- asymetrická mitóza definuje zárodečnou dráhu
- 16 gonidií a asi 2 000 bičíkovců, programovaná smrt


Model řízení diferenciace zárodečné dráhy u *Volvox*

geny *gls* způsobují asymetrické dělení vedoucí ke tvorbě velkých (geny *lag* zapnuty, *regA* vypnuty) a malých buněk (*regA* zapnuty, *lag* vypnuty)




Acetabularia : jednobuněčný model regenerace a posttranskripční regulace






Řízení diferenciace na úrovni translace



Vliv stávající cytoplasmy a syntézy nových mRNA na morfologii regenerované čepičky



mnohobuněčné nižší rostliny:




chaluhy






BLADDER WRACK~ *Fucus vesiculosus*

Životní cyklus modelové mnohobuněčné řasy: *Fucus vesiculosus*



Fucus: model studia polarity zygoty




játrovka




Marchantia polymorpha

porostnice mnohotvará (dvoudomá)



$$n = 8A + X$$



Y



$$n = 8A + Y$$




A close-up photograph of a Physcomitrium patens moss colony. The image shows several green, rounded sporangia (spore capsules) attached to the moss. Long, thin, reddish-brown setae (stems) extend from the base of some sporangia. The background is dark and out of focus.


Mechy – zkrutek
Physcomitrium patens

Physcomitrium patens

n = 27 chrs, C = 0,46 pg DNA

haploidní „tělo“
cílená integrace genů
zelený model 21. st.







The moss *Physcomitrella patens*: a new tool for plant science



Didier G. Schaefer
U de Lausanne



Izolace mutací s fenotypovým projevem




Ceratopteris richardii

„C-fern“

kapradina rohatec

n = 39 chrs, C = 10 pg



model hormonální sex-determinace (feromon ceratopterin)





Stan Roux


UT School of Biological Sciences
Molecular Cell and Developmental Biology







DIPLOIDNÍ SVĚT



řasy

houby



mechy

kapradiny

kvetoucí rostliny

nahosemenné rostliny


... *Pinus taeda*, *Picea abies*
 $C > 15 \text{ pg DNA}$!



A close-up photograph of several small, vibrant purple flowers with five petals each, growing on a thin green stem. The background is filled with more green foliage and similar flowers, though slightly out of focus.


krytosemenné rostliny
dvojděložné

Střídání generací u krytosemen-ných rostlin



Rostliny mají segmentované tělo:

FYTOMERY







Tabák

...a další rostliny z
čeledi Solanaceae



Růstové faktory rostlin či fytohormony


- pleiotropní účinky, tvořeny v jednom pletivu a transportovány do jiného
- nízká koncentrace, velké účinky
 - 6 µg auxinu / 1 kg ananasu
 - jehla na 20 metrů krychlových sena
- funkce jako stimulátor
 - pozitivní či negativní účinek
- stejné hormony mohou vyvolávat odlišné reakce – rozdíly v citlivosti







Řízená organogeneze ve tkáňové kultuře tabáku





Folke Skoog
(1908-2001)



Hlavní skupiny rostlinných hormonů



Růstové regulátory rostlin s pleiotropními účinky: cytokininy – hormony dělení buněk a mladosti




**Ric Amasino
(Wisconsin 1995)**










Apikální dominance řízená auxinem

auxin tvořený v apikálu se šíří stonkem dolů, inhibujíce vývin úžlabních pupenů

koncentrace auxinu klesá směrem dolů, kde axilární pupeny se uvolňují z inhibice a vytvářejí laterální prýty






ROSTLINNÉ BUŇKY JSOU TOTIPOTENTNÍ





Reprodukce bez sexu - klonování

vegetativní množení *in vitro* provázeno somaklonální variabilitou










TOMATO + **POTATO** = **POMATO**


rajče brambor brajče






Agrobacterium



Agrobacterium tumefaciens



Nicotiana benthamiana



Petunia

Petunia transposon biology & technology




Self-Incompatibility

Genetics of floral development

Genetics of inflorescence architecture

Biotic and abiotic stress

Mycorrhiza-plant interactions



Floral pigmentation





Ecology & taxonomy:
Pollination syndromes
Speciation/adaptation

Petal senescence



Floral Volatiles

Genetics of branching

Adventitious root formation




Lotus japonicus



Hledík – model květního vývoje


Antirrhinum majus





Linaria


Vznik a dědičnost rostlinných monster: (epi)mutace



Carl Linnaeus
(1707–1778)



Jean-Baptiste Lamarck
(1744–1829)



Charles Darwin
(1809–1882)




Enrico Coen
(1999)

Linnaeus ... pelorie u lnice, historicky první
doložená mutace? (1744)

Lamarck ... dědičnost získaných znaků
(*Philosophie Zoologique* 1801)


Darwin ... křížení normálních a pelorických forem
v F2 127:37 (*Variation of Animals and Plants
under Domestication* 1868)

Coen ... hypermetylase homologu genu *cycloidea*



Meiotický přenos epigenetického stavu (fenotypu) aneb environmentální indukce dědičných změn

- genotrofy u Inu (vliv podnebí a hnojení na větvení)



„Ice Plant“

Mesembryanthemum crystallinum

(kosmatec krystalový, 2děložné, ř. Caryophyllales)

- studium abiotického stresu, odolnosti vůči soli, fotosyntézy
- v různých fázích života a za odlišných vnějších okolností mění morfotyp i fyziologii
- model flexibility
- C = 0,39 pg DNA,
n = 9 chrs





semenáček, fotosyntéza C3,
sukulentní kotyledony,
nízká tolerance k NaCl,
jádra 2C



juvenilní, fotosyntéza C3,
vyšší tolerance k NaCl,
velké primární listy,
jádra 2C-16C



dospělá, přechod fotosyntézy z C3 na CAM, vysoká
tolerance k NaCl, měchýřkové buňky,
velké primární listy,
jádra 2C-32C



kvetoucí, fotosyntéza CAM, měchýřkové buňky,
vysoká tolerance k NaCl, malé sekundární listy, jádra
2C-64C



semena-plodící, fotosyntéza CAM, jen měchýřkové
buňky, vysoká tolerance k NaCl, žádné listy, jádra
2C-256C



epidermální měchýřkové buňky
(epidermal bladder cells)
jádra 256C



dospělá rostlina
po 2týdenním solném stresu,
dosud velké primární listy



dospělá rostlina
po 5týdenním solném stresu,
tvoří úzké sekundární listy




John Cushman
Nevada



Craterostigma plantagineum

(*Scrophulariaceae*,
dvojděložné)



- studium tolerance
k desikaci
(znovuvzkřízení)