


Fylogeneze a diverzita řas a hub: 5. přednáška

Glaucophyta, Rhodophyta, Chlorophyta


Barbora Chattová



Systém




Endosymbiotická teorie




Přehled systému superskupiny Archaeplastida

- Větev **Biliphytae**
- Odd. Glaucophyta
- Odd. Rhodophyta
- Větev **Chloroplastida**
- Vývojová linie Chlorophytæ
- Odd. Chlorophyta
- Vývojová linie Streptophytæ
- Odd. Charophyta
- Odd. Anthocerotophyta
- Odd. Marchantiophyta
- Odd. Bryophyta
- Odd. Cormophyta



Chloroplastida



Glaucophyta



- **Cyanely**
- Sladkovodní bičíkovci
- Rozmnožování: autospory, zoospory
- 18 S rRNA – monofyletické, příbuzné s Cryptophyta a Rhodophyta
- *Cyanophora paradoxa* - plankton

Glaucoctysis nostochinearum



Rhodophyta




- Buněčná stěna - **polygalaktany (agar, karagen)**
- Kalcifikace buněčné stěny
- Rhodomorfin - glykoprotein
- Chlorofyl a, (d)
- Chloroplasty mají dvě obalné membrány
- Zeaxantin, lutein, karoteny
- Thylakoidy-fykobilizomy- fykobiliproteiny (fykocyanin, fykoerythrín)
- Florideový škrob (v plazmě)
- Floridozid - sacharid, osmoregulace
- **Žádné bičíky!**
- Potravinářský, farmaceutický průmysl



Rozmnožování ruduch

- Nepohlavní: monosporami
- Pohlavní: oogamie – vaječná b. (karpogon) je oplozena nepohyblivou samčí gametou (spermacií, které se tvoří v spermatangiích)

Typy stélek ruduch



Ekologie

- Tropická moře, mangrove, sladké čisté vody i polární oblasti
- **U nás ohrožená skupina**
- Některé druhy endolitické, aerofytické, epifytické nebo parazitické
- Často kalcifikované


Systém

- Třída Rhodophyceae

Podtřída: **Bangiophycideae** (starší polyfyletická), jednodušší, převážně jednobuněčné nebo vláknité typy, jediná ploše listovitá stélka u rodu *Porphyra*

Podtřída: **Florideophycideae** (mladší monofyletická), mnohobuněčné a makroskopické stélky, **karpogony s trichogynem**

Porphyridium cruentum



<http://ccala.butbn.cas.cz>

Batrachospermum sp.




<http://protist.i.hosei.ac.jpg>

Lemanea sp.



<http://cfb.unh.edu>



Audouinella sp.



Porphyra (Nori)



<http://www.fao.org>


Chloroplastida (Viridiplantae)

- 1,5 mld. let staré
- Suchozemské rostliny - 700 mil. let
- Monofyletický původ (sekvence aminokyselin aktinu, enzymu Rubisco a nukleotidů 18S rRNA)
- **2 sesterské vývojové linie**
- Chlorophytæ - odd. Chlorophytæ
- Streptophytæ - odd. Charophytæ, Bryophytæ, Cormophytæ

Chlorophyta


- **Slepá vývojová linie**
- Všechny typy stélek (téměř)
- **Chlorofylly a, b, β-karoten** (karotenoidy někdy velmi výrazné)
- BS zpravidla celulózní (občas glykoprotein)
- Lutein, zeaxantin, violaxantin, neoxantin
- Pyrenoid
- Stigma v chloroplastu
- **Fykoplast v mitóze**
- **Škrob** (chloroplasty, leukoplasty, povrch pyrenoidu)

Chloroplastida




Chlorophyta

- Bičíkový aparát 9+2
- Tubulin
- Dynein (kontraktile)
- Mikrotubulární kořeny
- DO-orientace (12/6)
- CCW-orientace (11/5)
- CW-orientace (1/7)



Nepohlavní rozmnožování

- Bičíkovci: **schizotomie**
- Jednobuněční: sporulace, tzv. **cytogenie** (dceřinné nebo rozmnožovací buňky vznikají uvnitř mateřské buněčné stěny. Vzniknou buď 2-4 bičíkaté zoospory nebo nepohyblivé autospory)
- Typy žijící v coenobiích se rozmnožují dceřinými **coenobii**
- Vláknité typy se vegetativně dělí tzv. **cytotomií**, kdy se v mateřské buňce vytvoří příčná přehrádka, vzniknou dvě buňky dceřiné a část stěny mateřské buňky je zachována i pro dceřinou buňku.




Pohlavní rozmnožování

- **izo-, anizo- , oogamie**
- Většina zelených řas má ortomitózu – je vytvořeno bipolární vřeténko od pólu k pólu, v metafázi jsou chromozómy uspořádány v ekvatoriální destičce.
- Dva typy ortomitózy, podle stupně rozpadu jaderné membrány:
- **uzavřená** ortomitóza: jaderná blána zůstává zachována
- **otevřená** ortomitóza: je klasický typ, kdy se jaderná membrána rozpadá

Mikrotubulární systémy v cytokinezi

- Oddělení dceřiných buněk
- Dva typy: fykoplast, fragmoplast
- **Fykoplast:** mitotické vřeténko se úplně rozpadne, vytvoří se nová struktura kolmo na jeho původní směr (primitivnější způsob)
- **Fragmoplast:** vzniká z pozůstatků mitotického vřeténka, zakládá se buněčná destička (odvozenější, mají ho vyšší rostliny)

Chloroplastida



Systém, třídy


Důležité znaky:

1. sekvence SSU rDNA
2. Morfologie stélek, povrch buněk
3. Způsob rozmnožování
4. Postavení bazí bičíků

- Prasinophyceae (většinou bičíkovci s organickými šupinami na povrchu)
- Ulvophyceae (vláknité až sifonální stélky a CCW konfigurace)
- Cladophorophyceae
- Bryopsidophyceae
- Dasycladophyceae
- Trentepohliophyceae
- Trebouxiophyceae (většinou jednobuněční s CCW konfigurací)
- Chlorophyceae (mnoho typů stélek, stěna je polysacharidová ev. glykoproteinová (chlamys), bičíkatá stádia mají DO a CW)

Odd.: Chlorophyta

Třída: PRASINOPHYCEAE



<http://www.mbari.org>

Bičíkovci

Bičíky 1-2-8

1 chloroplast s
pyrenoidem

Prasinoxantin

Schizotomie


Hologamie

Micromonas sp.

Odd.: Chlorophyta

Třída: Ulvophyceae

- CCW-poloha
- Šupiny
- Uzavřená mitóza
- Celulóza
- Mannan, xylan




Odd.: Chlorophyta Třída: Ulvophyceae
Řád: Ulvales



<http://mkalty.org/>

Ulva lactuca



<https://s10.lite.msu.edu>

Odd.: Chlorophyta Třída: Ulvophyceae
Řád: Ulvales

Enteromorpha sp.



Třída: Cladophorophyceae

- **Sifonokladální stélka**
- Krystalická celulóza
- Chloroplast s pyrenoidem obaleným dvoudílným škrobovým obalem
- Uzavřená mitóza
- Haplo-diplontní životní cyklus
- Izomorfní rodozměna
- CCW-orientace

Odd.: Chlorophyta Třída: Cladophorophyceae Řád: Cladophorales



Cladophora aegagropila
Řasokoule ☺



Cladophora glomerata

Třída: Bryopsydophyceae

- **Cenocyt**
- Centrální vakuola
- Celulóza, xylan, mannan, glukan
- Heteroplastické druhy - amyloplasty
- Sifonein, sifonoxantin
- Haplo-diplontní cyklus
- Izogamie
- **Makroskopický, mnohojaderný gametofyt**
- CCW-orientace
- Invazní řasy - agresivní druhy - *Caulerpa taxifolia*

Odd.: Chlorophyta Třída: Bryopsidophyceae Řád: Bryopsidales



<http://www.aquaportal.com/>

Caulerpa taxifolia


Odd.: Chlorophyta Třída: Bryopsidophyceae
Řád: Bryopsidales



<http://www.natuurlijkmooi.net/>

Codium sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Bryopsidophyceae Řád: Bryopsidales



<http://www.virtual-geology.info/>

Halimeda sp.

Třída: Dasycladophyceae

- **Cenocyt**
- Osní část s přesleny bočních větévek
- Víceletá stélka
- Proudění cytoplazmy
- Inkrustace stélky CaCO_3
- Celulóza, mannan
- Škrob a fruktan i v cytoplazmě
- **Haplontní cyklus**
- **Makroskopický, mnohojaderný gametofyt**
- **Sporofyt jenom zygota**
- CCW-orientace

Odd.: Chlorophyta Třída: Dasycladophyceae
Řád: Dasycladales




Acetabularia acetabulum

Odd.: Chlorophyta Třída: Dasycladophyceae
Řád: Dasycladales



<http://www.natuurlijkmooi.net>



<http://deptsec.ku.edu>

Dasycladus sp.

Třída: Trentepohliophyceae

- **Diskovitá nebo vláknitá stélka**
- Fragmoplast
- **Hematochrom** - sekundární karotenoidy a β -karoten
- Životní cyklus: haplontní, haplo-diplontní
- **Aerické řasy**

Odd.: Chlorophyta Třída: Trentepohliophyceae Řád: Trentepohliales



<http://www.bioref.lastdragon.org/>

Trentepohlia sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Trentepohliophyceae Řád: Trentepohliales




<http://www.discoverlife.org/>

Phycopeltis arundinacea

Třída: Trebouxiophyceae

- Jednobuněčné a vláknité řasy
- Nahé zoospory, gamety
- Kinetozom - CCW konfigurace
- Mitóza uzavřená
- Fykoplast
- Aplanospory, autospory
- **Často tvoří symbionty v lišejnících**

Odd.: Chlorophyta Třída: Trebouxiophyceae
Řád: Trebouxiales




Trebouxia sp.

Trebouxia sp. - lichenizovaná




Odd.: Chlorophyta Třída: Trebouxiophyceae
Řád: Chlorellales



Chlorella sp.


Odd.: Chlorophyta Třída: Trebouxiophyceae Řád: Oocystales

Oocystis




A after Prescott (1951)

B, C, D, E after Entwistle et al. (1997)



Odd.: Chlorophyta Třída: Trebouxiophyceae
Řád: Prasiolales



<http://www.seaweedsofalaska.com/>

Prasiola sp.

Třída: Chlorophyceae


- Bičíkovci, kapsální, kokální, vláknité řasy
- Zoospory, spermatozoidy
- Kinetozom - CW konfigurace převládá (DO u některých)
- Bičíky bez mastigonem, stejně dlouhé
- **Chlamys**
- Sporopolenin (*Scenedesmus*, *Pediastrum*) - fosilizace
- Aplanospory, hemiplanospory, autospory
- Mitoza uzavřená
- **Cenobium**

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae Řád: Chlamydomonadales

Chlamydomonas




<http://web.mst.edu>




http://cronodon.com/BioTech/Algal_Bodies.html

Chlamydomonas sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae
Řád: Volvocales




<http://www.microscopy-uk.org.uk>



Volvox sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae Řád: Chlorococcales



Scenedesmus




<http://cfb.unh.edu/phycokey>


http://cronodon.com/BioTech/Algal_Bodies.html

Desmodesmus sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae Řád: Chlorococcales



<http://protist.i.hosei.ac.jp>



<http://cfb.unh.edu/phycogkey>

Pediastrum sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae
Řád: Microsporales



<http://protist.i.hosei.ac.jp>

Microspora sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae
Řád: Oedogoniales


Iniciální stadium



<http://protist.i.hosei.ac.jp>

Oedogonium sp.

Odd.: Chlorophyta Třída: Chlorophyceae Řád: Oedogoniales



Oedogonium sp.

© orig. Hájková L.

Děkuji za pozornost

