

Evoluční ekologie interagujících druhů

Ekologie interagujících druhů

- ▶ Kompetice o běžné zdroje, druh je potravou jiného druhu, jeden druhu může být prospěšný pro jiný nebo několik dalších druhů
- ▶ Adaptace ke kompetici
- ▶ Predace – úspěšné strategie získávání kořisti, kořist strategie úniku
- ▶ Parazitismus – adaptace parazitů k překonání obranných mechanizmů hostitele, hostitel strategie úniku parazitovi

Kompetice

- ▶ Kompetice mezi jedinci je mechanismem, který zvyšuje adaptivní znaky mezi druhy (Darwin)
- ▶ G. F. Gause (1934) – experimentální studie kompetice mezi prvky
- ▶ Role kompetice v přírodní selekci (vliv na abundanci a distribuci druhů)
- ▶ Druhy kompetují o zdroje různých způsobem
- ▶ Kompetice jako mechanismus koexistence
- ▶ Některé faktory favorizují zvyšování kompetiční schopnosti, jiné evoluci znaků, které redukují kompetici





Ekologické a evoluční procesy kompetice

- ▶ nevyhnutelný důsledek zvyšování populační velikosti a limitace zdrojů
- ▶ redukuje přežívání a/nebo fekunditu
- ▶ Interspecifická versus intraspecifická
- ▶ redukce nebo eliminace interspecifické kompetice – u jednoho druhu se vyvine znak, který zamezí kompetici mezi 2 druhy
- ▶ Soutěživá (scramble) kompetice - nějak se podělí
- ▶ Soubojová (contest) kompetice - vítěz bere vše, asymetrická kompetice – kompetice o prostor, teritorialita, hlídat území něco stojí: výhody musí přesáhnout náklady






Ekologické a evoluční procesy kompetice

- ▶ Zdánlivá kompetice
- ▶ predátorem zprostředkovaná kompetice
- ▶ Dva druhy se vzájemně negativně ovlivňují, přičemž mezi nimi nedochází k přímé kompetici

	Competition	Apparent competition		
Trophic level	(a) Interference: a direct interaction	(b) Exploitation: indirect interaction, via a shared resource	(c) Indirect interaction, via a shared enemy	(d) Indirect interaction via other species on same trophic level
Natural enemies (E) (herbivores, parasites, pathogens)				
Consumers (C)				
Limiting resources (R) (light, water, minerals, vitamins, etc.)				




Kompetice o zdroje mezi jedinci ovlivňuje fitness

- ekologicky: zapříčiněná limitací zdrojů
- evolučně: schopnost získat adekvátní zdroje ovlivňuje fitness
- Geneticky podmíněné rozdíly ve schopnosti kompetice můžou vést k evoluci zvyšování této schopnosti




Podzemní struktury rostlin jsou v kompetici o mikroorganizmy, vodu a důležité živiny

► Kompetice u rostlin




Změna směru kompetice v důsledku parazitace

- ▶ Interakce rostlin s houbami – někdy prospěšné, jindy patogeny
- ▶ Rzi (Uredinales, Pucciniales) - parazitické stopkovýtrusné houby




Změna směru kompetice v důsledku symbiotické interakce

- ▶ Mykorhiza = symbióza hub a kořenů vyšších rostlin, rostlina houbě: sacharidy houba rostlině: minerální látky (fosfor a draslík)





jílek vytrvalý

medyněk vlnatý




Evoluce kompetiční schopnosti

- ▶ Je schopnost kompetice ovlivněná přírodní selekcí?
 1. schopnost kompetice ovlivňuje přežívání = fitness
 2. genetická variabilita pro schopnost kompetice
- ▶ Genetické rozdíly v populaci – výsledek přírodní selekce nebo genetického driftu
- ▶ Př. Experiment evoluce kompetiční schopnosti u drozofily




Predace

Predátor x kořist
Populační dynamiky propojené




Lotka-Voltera model pro dynamiku predátor-kořist predikuje cykly


- ▶ Predikuje nestabilní cykly, co neodpovídá reálným populacím



$$\Delta V = rV$$




$$\Delta P = -dP$$



$$\Delta V = rV - cVP$$




$$\Delta P = kVP - dP$$



Více realistický model inkorporuje na hustotě závislou dynamiku kořisti a nasycení predátora

- ▶ 1. Populace kořisti roste exponenciálně, v případě absence predátora na hustotě závislý růst
- ▶ 2. Predátor je kořistí saturován nebo kořist zpracovává
= cykly jsou stabilní, po perturbaci se vrátí v čase k původním cyklům

$$\Delta V = rV \left[1 - \frac{V}{K} \right] - cVP$$



Více realistická funkční odpověď

Jak být predátorem?

- ▶ Predátor je konfrontován s mnoha rozhodnutími
 - impakt na přežívání vlastní i potomků
 - predátor může mít nepřítele -> minimalizuje čas pro získávání potravy s cílem redukce možné expozice nepřítelovi
 - kterou potravu bude ignorovat a o kterou bude usilovat?





Hledají predátoři potravu optimálně?

- ▶ Optimálně = 1. minimalizace času hledání potravy
nebo 2. získání maximální energie z úsilí věnovaného hledání potravy
- ▶ Potravní chování – výsledek přírodní selekce – zvyšování fitness
- ▶ Některé faktory brání optimálnímu chování....
- ▶ 1. Genetické zákonitosti (př. Mendelovská segregace)
- ▶ 2. fitness je determinováno více faktory (evoluce potravního chování s evolucí reprodukčního chování a kompetiční schopnosti)

Optimalizovat energii získanou za jednotku času nebo minimalizovat čas strávený hledáním potravy?

► Strategie minimalizace času

- Čas čekání = čas mezi setkání s kořisti
- Doba manipulace = chycení a konzumace kořisti




	P _A	P _B
Case 1	5.0	1.0
Case 2	0.5	0.1

Optimalizovat energii získanou za jednotku času nebo minimalizovat čas strávený hledáním potravy?

- ▶ Strategie maximalizace energie získané za jednotku času
- ▶ Modifikace selekce kořisti ve směru získání největší energie za jednotku času






konipas bílý
Motacilla alba



Získáš více potravy, čím dále cestuješ

- ▶ Čas strávený z centrálního místa na místo získávání potravy
 - určuje strategii minimalizace času nebo maximalizace energie



Merops apiaster (vlha pestrá) cílevědomě mění potravu se vzdáleností od hnízda

Jak předejít tomu, že se organismy stanou kořistí?

- ▶ **Setkání** – aktivita kořisti v jinou dobu než u predátora, nenápadná pro predátora, odejít dříve než predátor
- ▶ **Detekce** – morfo struktury nebo barvy podkladu, náhlé a neočekávané pohyby pro predátora
- ▶ **Identifikace** – kořist produkuje nebo konzumuje/akumuluje toxické látky – nejedlá pro predátora (u některých pouze mimikry)



Jak předejít tomu, že se organismy stanou kořistí?

- ▶ **Přiblížení** – kořist rychlejší než predátor, agresivní postoj
- ▶ **Podmanění kořisti** - skořápky, sliz, žihadla, trny, odhazování částí těla, „nechutná pro predátora“
- ▶ **Požití kořisti** – již bez možnosti úniku, ale negativní vliv na zdraví predátora -> přírodní selekce favorizuje vyhýbání se kořisti




Kořist může předcházet predaci: je obtížné ji najít

- ▶ Kryptické zbarvení – zbarvení podkladu, neviditelný pro predátora
- ▶ Aposematické zbarvení – barvy černá, červená, žlutá = indikace nejedlosti
- ▶ zvukové nebo pachové signály



Umbronia crassiformis

- ▶ Predátor - nápadně zbarvená kořisti vs. krypticky zbarvená




Kořist může předcházet predaci: má vzhled nejedlé kořisti

- ▶ Predátor se vyhýbá podobně vypadajícím druhům kořisti, protože jedna byla nejedlá
- ▶ **Múllerianské mimikry** – oba druhy jsou stejně nechutné a stejně běžné
- ▶ **Batesianské mimikry** – jeden je jedlý (imitátor), druhý nejedlý (model)




Interakce rostlina - herbivor



- ▶ Strategie obrany vůči herbivorům:
- ▶ 1. rezistence – toxické složky, není redukováno fitness
- ▶ 2. tolerance poškození – květy a plody i po poškození, fitness redukováno
- ▶ Kompenzační schopnost = rozdíl mezi fitness poškozené a nepoškozené rostliny
- ▶ Někdy efekt herbivorů pozitivní
– lepší reprodukce



Kompromis mezi schopnosti rezistence a tolerance herbivorů u rostlin



Experiment *Brassica rapa* –
linie s různou rezistencí – toxické glykosidy
Vysoká míra rezistence = redukovaná tolerance




Prokelisia marginata
P. dolus (Hemiptera)

Býložravci využívají různé strategie, aby předešli obraně rostlin

- ▶ Morfologické, fyziologické a behaviorální adaptace, které zvyšují reprodukční úspěch herbivora
- ▶ Enzymatická detoxikace toxických komponentů produkovaných rostlinami – enzymy součástí cytochrom P-450 systému




Tetranychus urticae
sviluška chmelová



Býložravci využívají různé strategie, aby předešli obraně rostlin


► Morfologické adaptace



Rhopalidae (Hemiptera)
Jadera haematoloma
jedinečný příklad
rychlé evoluce
= evoluce v procesu



mýdelníkovité (*Sapindaceae*)






Parazitismus

Parazit - žije po celý život nebo část svého života na těle nebo uvnitř těla jiného organizmu (=hostitele)


- ▶ užitek pro parazita a poškození pro hostitele (redukce přežívání a fertilita)
- ▶ Někdy hostitel nepřežívá (troficky přenosní parazité)
- ▶ Jednoduché vs. složité vývojové cykly
- ▶ Parazit specificky vázán na hostitele (**specialista**) nebo bez preference hostitele (**generalista**)

Evolučně-ekologické vymezení parazita

- ▶ Počet napadených obětí během života parazita
- ▶ Vliv parazita na biologickou zdatnost hostitele
- ▶ Vztah mezi intenzitou nákazy a mortalitou hostitele
- ▶ Výhodnost smrti hostitele pro parazita



Velkost konzumenta versus kořisti: predátor vs. parazit




Efekt parazita na dynamiku hostitele

- ▶ Redukce počtu parazitu snižuje míru populační fluktuace hostitele




Lagopus lagopus scotica
bělokur skotský



Paraziti/parazitoidi nemůžou být efektivní ve vyhledávaní hostitele, pokud chtějí předejít extinkci

- ▶ Dynamika parazitoid-hostitel podobná parazit-hostitel
- ▶ Rozdíl přímý vztah mezi reprodukci parazitoida a smrtí hostitele
- ▶ Důležitá je nerovnoměrná (agregovaná) distribuce parazitoida pro koexistenci obou partneru interakce



In



to



{host b}



Parazitiú/parazitoidi nemůžou být efektivní ve vyhledávaní hostitele, pokud chtějí předejít extinkci



Parazitoidi nemůžou být efektivní ve vyhledávaní hostitele, pokud chtějí předejít extinkci



- ▶ Př. Parazitoid *Cyzenis albicans* (Tachinidae) u piďalky podzimní



Cyzenis albicans




Operophtera brumata - píďalka podzimní




Paraziti jsou často specializování z hlediska habitatů a vývojových cyklů


- Extremní specializace je spojená s vývojovými cykly



Trematoda
Dicrocoelium dendriticum



Cestoda
Diphyllobothrium latum



Evoluční úspěšnost parazita

- ▶ Strategie vyhledávaní hostitele
- ▶ Strategie vniknutí do hostitele a uchycení
- ▶ Adaptace vůči nepříznivému hostitelskému prostředí
- ▶ Schopnost uživit se
- ▶ Schopnost bránit se imunitnímu systému
- ▶ Schopnost reprodukce v hostiteli a schopnost disperze

- ▶ => pro parazita může být složité u více hostitelských druhů
- ▶ => geneticky diferencované populace v rámci generalistů mají strategie specialistů

Někdy parazit generalista představují různě specializované populace

- ▶ *Echinoparyphium recurvatum* (Trematoda)
- ▶ *Lymnaea peregra* a *Valvata piscinalis* – dva mezihostitelé





FIGURE 14.3B Distribution of Parasites in the Intestines of Ducklings
The red bars show the distribution for worms from the secondary host *L. peregra*. The green bars show worms from *V. piscinalis*.



Hostitel vyvíjí genetickou rezistenci vůči parazitům, parazit vyvíjí strategii vůči rezistenci




Systém gen pro gen (alely rezistence versus alely virulence)

Nebylo by lepší, kdyby parazit vyvinul alely pro virulenci pro každý lokus?

Nebylo....

Koevoluce hostitelů a parazitů závisí taky na ekologických faktorech



- introdukce králíků do Austrálie, přemnožení, introdukce *Myxoma* viru v 1950




FIGURE 14.5B Field Samples indicate that as rapidly, the most virulent viruses are from dead hosts, the frequency and

Mutualistické interakce

- ▶ Někdy jednostranné využití bez vlastních investic = komensalismus
- ▶ Potravní mutualismus - Transportní mutualismus - Ochranný mutualismus
- ▶ čistící ryba příležitostně požírá hostitelskou tkáň, hostitelská ryba příležitostně zkonzumuje čističe, orchideje napodobují nektar - produkující rostliny



Mutualismus může zahrnovat reciprokovou výměnu důležitých živin

- ▶ Dusík fixující bakterie (diazotrofie)
- ▶ Mykorhiza
- ▶ Lišejníky (lichenismus)
- ▶ Mravenci *Attini* a zahrádky hub, role bakterie *Streptomyces* inhibující škodlivou houbu *Escovopsis* v zahrádkách



Mutualismus může zahrnovat transport jedinců nebo gamet

- ▶ Transport gamet – opylovači



- ▶ Transport semen př. *Garrulus glandarius*



- ▶ Transport organismů př. *Nicrophorus humator*




Mutualismus může poskytnout ochranu vůči predátorům a kompetitorům

- ▶ Parazitická interakce: vlhovcovití (Icteridae): *Psarocolius* parazitovaný *Molothrus* – mimetické vajíčka
- ▶ Mutualistická interakce: v přítomnosti parazita (střečci) – nemimetické vajíčka hostitele, strategie akceptace parazitických mláďat hostitelem z důvodu zvýšení přežívání mláďat






Mutualismus se často vyvíjí jako přímý důsledek negativní interakce mezi více druhy

- ▶ Mnoho mutualistických interakcí se vyvíjelo původně jako antagonistické interakce
- ▶ Mnoho mutualistických interakcí začleňuje 3 a více druhů, včetně antagonistického páru
- ▶ Př. Evoluce mutualismu mezi motýlem (skvrnovníčkovití) a jukou (chřestovité)



Evoluce mutualismu je usnadněná, když se reprodukce hostitele a symbionta shodují

- ▶ Různé způsoby transmise symbionta



Evoluce mutualismu je usnadněná výběrem shodné reprodukční strategie hostitele a symbionta

- ▶ Hostitelské fitness – hostitel vybírá stejnou strategii jak symbiont
- ▶ Fitness symbionta s nepřímým přenosem – symbiont atakuje
- ▶ Fitness symbionta s přímým přenosem – symbiont spolupracuje

