

# M1130 — Příklady ze cvičení a domácí úlohy na procvičení

Aktuální verze sbírky ze dne 22. listopadu 2023.

## 11 Oprava 2. písemky, goniometrické funkce

Cvičení konaná 27. a 28. 11. 2023.

**Příklad 11.1:** Odvod'te základní vztahy:

1.  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$
2.  $\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x,$
3.  $\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x,$
4.  $\sin x = \sin(\pi - x) = -\sin(\pi + x) = -\sin(2\pi - x),$
5.  $\cos x = -\cos(\pi - x) = -\cos(\pi + x) = \cos(2\pi - x), \quad \operatorname{tg} x = -\operatorname{tg}(\pi - x).$
6.  $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2} - x), \quad \sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x).$

**Příklad 11.2\*:** Předpokládejme, že platí  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ , kde  $x$  je libovolné reálné číslo. Dále předpokládejme, že pro umocňování reálného čísla  $e$  na komplexní čísla platí obvyklé vlastnosti pro umocňování. Odvod'te součtové vzorce

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Součtových vzorců využijte k odvození vzorců (e) a (f) z předchozího příkladu.

**Příklad 11.3:** Odvod'te dále vztahy:

1.  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$
2.  $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2},$
3.  $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}, \quad \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

*Ná pověda: V částech 2. a 3. napište  $x = \alpha + \beta$  a  $y = \alpha - \beta$  a použijte součtové vzorce.*

**Příklad 11.4:** Za předpokladu, že výrazy dávají smysl, dokažte následující rovnosti. Popište, pro které hodnoty tyto rovnosti platí.

$$1. \operatorname{tg}(x+y) = \frac{\operatorname{tg}x + \operatorname{tg}y}{1 - \operatorname{tg}x \operatorname{tg}y},$$

$$2. \operatorname{tg}(x-y) = \frac{\operatorname{tg}x - \operatorname{tg}y}{1 + \operatorname{tg}x \operatorname{tg}y},$$

$$3. \operatorname{tg}x \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -1.$$

Návod: 1) Ve vztahu  $\operatorname{tg}(x+y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)}$  použijte součtové vzorce pro  $\sin(x+y)$  a  $\cos(x+y)$ . 2) Ve vztahu  $\operatorname{tg}(x-y) = \frac{\sin(x-y)}{\cos(x-y)}$  použijte součtové vzorce pro  $\sin(x-y)$  a  $\cos(x-y)$ . 3) Ve výrazu  $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$  použijte vzorce pro  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$  a  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ .

**Příklad 11.5:** Odvod'te následující vztahy (a promyslete, pro které hodnoty  $x \in \mathbb{R}$  platí):

$$1. \sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$2. \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$3. \operatorname{tg} x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

Návod: Ve všech případech na pravé straně použijte  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}$  a následně upravte složený zlomek.

**Příklad 11.6:** a) Za předpokladu, že výrazy na obou stranách rovnosti dávají smysl, dokažte:

$$\sin 2x = \frac{4 \operatorname{cotg} 2x}{\operatorname{cotg}^2 x - \operatorname{tg}^2 x}.$$

b) Určete, pro která reálná čísla  $x$  mají výrazy smysl.

**Příklad 11.7:** Za předpokladu, že výrazy na obou stranách rovnosti dávají smysl, dokažte:

$$1. \frac{\sin x + \cos x}{\cos^3 x} = 1 + \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^3 x,$$

$$2. \frac{1 + \sin 2x}{\cos 2x} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right),$$

$$3. \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} x} = \frac{3 - \operatorname{tg}^2 x}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 x},$$

$$4. \frac{1 - \cos 2x + \sin 2x}{1 + \cos 2x + \sin 2x} = \operatorname{tg} x,$$

$$5. \cos^6 x - \sin^6 x = \frac{1}{4}(3 + \cos^2 2x) \cos 2x,$$

$$6. \sin x \cos(y-x) + \cos x \sin(y-x) = \sin y.$$

*Návod: 1) Na pravé straně použijte  $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ , upravte na společný jmenovatel a použijte vztah  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ . 2) Použijte součtový vzorec pro  $\operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{4})$ , upravte složený zlomek a pak porovnejte s levou stranou. 3) Použijte součtový vzorec pro  $\operatorname{tg}(3x) = \operatorname{tg}(x + 2x)$ , pak znova pro  $\operatorname{tg}(2x) = \operatorname{tg}(x+x)$  a upravte složený zlomek. 4) Použijte vzorce pro  $\sin(2x)$  a  $\cos(2x)$  a také  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ; výsledný zlomek pak zjednodušte. 5) Použijte vztah  $a^6 - b^6 = (a^2 - b^2)(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$ . Přitom zde  $a^2 + b^2 = 1$  a  $1 - a^2b^2 = 1 - \frac{1}{4}\sin^2 2x$ . 6) Použijte součtové vzorce.*

**Příklad 11.8:** Vypočtěte bez kalkulačky:

1.  $\cos 15^\circ$ ,
2.  $\operatorname{tg} 75^\circ$ ,
3.  $\operatorname{tg} 20^\circ + \operatorname{tg} 40^\circ + \sqrt{3} \operatorname{tg} 20^\circ \operatorname{tg} 40^\circ$ ,
4.  $\sin 160^\circ \cos 110^\circ + \sin 250^\circ \cos 340^\circ + \operatorname{tg} 110^\circ \operatorname{tg} 340^\circ$ ,
5.  $\sin \frac{3\pi}{10} \sin \frac{\pi}{10} - \sin \frac{3\pi}{5} \sin \frac{2\pi}{5} + \sin \frac{7\pi}{10} \sin \frac{3\pi}{10}$ .

*Návod: 1)  $15 = 45 - 30$ . 2)  $75 = 45 + 30$ . 3) použijte vztah 11.4-1 pro argumenty  $20^\circ$  a  $40^\circ$ . 4) použijte vztahy z příkladu 11.1 na posunutí argumentů do základního intervalu. Potom součtový vzorec na součet prvních dvou členů a vzorec z 11.4-3 na třetí sčítanec. 5) použijte poslední vzorec z 11.3-3 v opačném směru.*

**Příklad 11.9\*:** Dokažte, že pro vnitřní úhly  $\alpha, \beta, \gamma$  trojúhelníka platí:

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}.$$

**Příklad 11.10:** Řešte v  $\mathbb{R}$  následující rovnice. Vždy určete počet řešení v intervalu  $[0, 2\pi]$ .

1.  $\sin 2x = \sqrt{2} \cos x$ ,
2.  $2 \sin^2 x + 7 \cos x - 5 = 0$ ,
3.  $2 \cos x \cos 2x = \cos x$ ,
4.  $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 2$ ,
5.  $\sin 3x + \sin x = \sin 2x$ ,
6.  $\sin 5x \cos 3x = \sin 6x \cos 2x$ ,

$$7. \sin 2x + \cos 2x = \sin x + \cos x.$$

Návod: 1) Použijte 11.3-1). 2) Nahradíte  $\sin^2 x$  (pomocí goniometrické jedničky) výrazem  $1 - \cos^2 x$  a řešte kvadratickou rovnici v proměnné  $y = \cos x$ . 3) Po převedení na levou stranu, lze  $\cos x$  vytknout. 4) Podělte 2 a použijte 11.2 zprava doleva. 5) Použijte 11.3-2) na levou stranu. 6) Použijte 11.3-2) zprava doleva. 7) Použijte 11.1-6) a 11.3-2).

**Příklad 11.11:** Řešte graficky v  $\mathbb{R}$  následující nerovnice.

1.  $\sin x > \frac{1}{2}$ ,
2.  $\sin x < \cos x$ ,
3.  $\operatorname{tg} x \leq -\sqrt{3}$ .

**Příklad 11.12:** Řešte v  $\mathbb{R}$  následující nerovnice.

1.  $\sin 3x < \sin x$ ,
2.  $2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 \geq 0$ ,
3.  $\sin x + \cos x < \frac{1}{\cos x}$ ,
4.  $\sin 2x + \sin x \leq 0$ ,
5.  $1 - \cos x \leq \operatorname{tg} x - \sin x$ ,
6.  $\sin x + \sin 2x + \sin 3x < 0$ ,
7.  $\sin 3x > 4 \sin x \cos 2x$ .

Návod: 1) Použijte 11.3-3). 2) Použijte substituci  $y = \cos x$  a řešte kvadratickou nerovnici. 3) Pronásobte  $\cos x$  a použijte 11.1-1). Potom lze dělit  $\sin x$ , ovšem pozor na znaménka při násobení a dělení. 4) Použijte 11.3-2). 5) Pravá strana je součin levé strany a  $\operatorname{tg} x$ . 6) Sečtěte (dle 11.3-2))  $\sin x + \sin 3x$ . 7) Vyhádřit obě strany pomocí  $\sin x$  (za použití 11.2, resp. 11.3-1), s přihlédnutím k 11.1-1).