

# Diferenciální počet funkcí více proměnných

## Lokální a absolutní extrémy

Petr Liška

Masarykova univerzita

25.10.2024

# Lokální extrémy

## Definice

Řekneme, že funkce  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  nabývá v bodě  $[x_0, y_0]$  *lokálního maxima (minima)*, jestliže existuje okolí tohoto bodu takové, že pro všechny body z tohoto okolí platí  $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ , resp.  $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$ .

Jsou-li nerovnosti v těchto vztazích pro  $[x, y] \neq [x_0, y_0]$  ostré, mluvíme o *ostrých* lokálních maximech a minimech.

(Ostrá) lokální maxima a minima nazýváme souhrně (*ostré*) *lokální extrémy*.

## Definice

Nechtě  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Řekneme, že bod  $[x_0, y_0]$  je *stacionární bod funkce*  $f$ , jestliže v bodě  $[x_0, y_0]$  existují obě parciální derivace prvního řádu funkce  $f$  a platí

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

## Věta (Fermat)

Nechť funkce  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  má v bodě  $[x_0, y_0]$  lokální extrém. Pak všechny parciální derivace funkce  $f$ , které v tomto bodě existují, jsou rovny nule.

## Věta

Nechť funkce  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  má v bodě  $[x_0, y_0]$  a nějakém jeho okolí spojité parciální derivace druhého řádu a nechť  $[x_0, y_0]$  je její stacionární bod. Jestliže

$$D(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0,$$

pak má funkce  $f$  v  $[x_0, y_0]$  ostrý lokální extrém. Je-li  $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ , jde o minimum, je-li  $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ , jde o maximum.

Jestliže  $D(x_0, y_0) < 0$ , pak v bodě  $[x_0, y_0]$  lokální extrém nenastává.

# Absolutní extrémy

## Definice

Nechť  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $M \subset D(f)$ . Řekneme, že bod  $[x_0, y_0] \in M$  je bodem *absolutního minima (maxima)* funkce  $f$  na  $M$ , jestliže  $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$  ( $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ ) pro každé  $[x, y] \in M$ . Jsou-li nerovnosti pro  $[x_0, y_0] \neq [x, y]$  ostré, mluvíme o *ostrých absolutních extrémech*.

## Věta

Nechť  $M \subset \mathbb{R}^2$  je kompaktní množina a funkce  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá na  $M$ . Pak  $f$  nabývá svých absolutních extrémů buď v bodech lokálního extrému ležících uvnitř  $M$ , nebo v některém hraničním bodě.