



PRVNÍ POMOC

Pokousání zvířaty

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
MUDr. et Bc. Barbora Zuchová
Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Pokousání zvířaty

- Kousnutí způsobuje hluboké rány
- Riziko infekce (např. vzteklna, tetanus)

Zdroj: <http://www.findyourhomeli.com/misc/aggressive.jpg>

První pomoc

- Ránu vymýt, dezinfikovat
- V případě potřeby volání ZZS 155

Riziko neočkovaných, neznámých zvířat (nejen pes, ale také např. srna, kůň, veverka)



Kousnutí klíštětem

Riziko přenosu infekčních chorob, které jsou obsaženy v trávícím ustrojí klíštěte (Lymeská borelióza, encefalitida)

První pomoc


- Klíště co nejdříve odstranit (*speciální pinzeta, háček*)
- Ránu vydezinfikovat
- Při teplotách, zarudnutí rány, bolestech kloubů hlavy **ihned** návštěva lékaře!

Možná aplikace *Ixoderm* masti

- mast klíště znehybní a usmrtí
- oblast desinfikuje
- napomáhá k snadnějšímu odstranění klíštěte



Kousnutí klíštětem – odstranění




Nanesení masti



Znehybnění klíštěte



Úplná destrukce klíštěte
po cca 15 minutách



Zdroj:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_kl%C3%AD%C5%A1t%C4%9Bte_h%C3%A1n%C4%8Dkem.png/220px-Odstra%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_kl%C3%AD%C5%A1t%C4%9Bte_h%C3%A1n%C4%8Dkem.png

Uštknutí hady

- V ČR je jedovatá pouze zmije obecná
- Ojediněle jedovatí hadi z chovů

První pomoc

- postiženou oblast zafixovat
- volat ZZS, sledovat životní funkce

Riziko vzniku alergické reakce
až anafylaktického šoku

Ránu nevysávat, nenařezávat, nechladit!

Zdroj: http://nd01.jxs.cz/656/293/71bced0736_21715404_o2.jpg



Kontrolní otázky

- Jaká jsou rizika u pokousání zvířaty?
- Jak odstraníte klíště?
- Jak budete postupovat při uštknutí hadem?