

Historie a současnost organelové DNA



Jana Řepková
Ústav experimentální biologie



- 1. Historie poznatků organelové DNA**
- 2. Charakteristika organelové DNA**
- 3. Dědičnost u různých organizmů**
- 4. Aplikační oblasti organelové DNA**

Genetická informace organizmů (eukaryota)

- Jaderná
- Mitochondriální
- Chloroplastová




Jaderná genetická informace

- **Mendelistická dědičnost**
Mendelovy zákony
 - **Předpověď fenotypu podle několika principů:**
 - 1) dominantní a recesivní vztahy alel,
 - 2) genové interakce,
 - 3) vliv pohlaví,
 - 4) vazba genů.
 - **Nemendelistická dědičnost**
maternální efekt, epigenetika
-

Organelová DNA

- 1) Evoluční původ genomů**
 - 2) Odlišnosti v genetickém složení**
 - 3) Způsob přenosu (DNA, genů) na potomstvo**
 - 4) Charakter dědičnosti u různých organismů**
-

1) Genomy mitochondrií a chloroplastů jsou vyvinuté z endosymbiotických vztahů



- **1883 Andreas Schimper** (1856-1901)
- plastidy vznikly z endosymbiotického vztahu mezi cyanobakteriemi a eukaryotickou buňkou.
- **1922 Ivan Wallin** (1883-1969)
endosymbiotický původ mitochondrií
- **1967 Lynn Margulis (*1938)**
The Origin of Mitosing Eukaryotic Cells
1981 Symbiosis in Cell Evolution



2) Mitochondrie a chloroplasty obsahují kružnicové chromozomy s mnoha geny

r. 1951 Y. Chiba


Barvení barvivem specifickým pro DNA

Izolace organelové DNA


Elektronová mikroskopie

70. a 80. léta 20. st.


Sekvenování organelové DNA



Jádro




Chloroplasty



Struktura DNA


Mitochondrie




AAAGTCTGACGACATGCTCGAAGTCGGATCGAA
TTTCAGACTGCTGTACGAGCTTCAGCCTAGCTT

Microsatellite

3) Přenos DNA do dceřiných buněk je náhodné a na potomstvo ...




Nuclear DNA is inherited from all ancestors.





Člověk
dědičnost maternální

Mitochondrial DNA is inherited from a single lineage.



Další poznatky

Rozmístění DNA v organele



Depiction of a typical mitochondrion. Note the circular pieces of DNA.

Další poznatky

Sekvenování organelové DNA

Mitochondriální 6070 genomů eukaryot

- # **Houby** **321 genomů**

*Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe,
Candida albicans*

- # Živočichové Savci

5309 genomů 758 genomů

- # Rostliny a řasy 277 genomů

Chloroplastový 718 genomů eukaryot

Rostliny

588 genomů

Řasy

56 genomů

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/?report=5>

Další poznatky

Velikost DNA

Mitochondriální

- Řasy a protista** střední genom

Saccharomyces cerevisiae 75 kb

- Živočichové** malý genom 16 – 17 kb
(méně než 1% bakteriálního chromozomu)


- Rostliny** velký genom
200 – 2600 kb

Chloroplastová

- Řasy** *Chlamydomonas* 200 kb
 - Rostliny** 120 až 160 kb
-

4) Charakter dědičnosti organelové DNA - mutace


Carl Correns pigmentace u nocenky *Mirabilis jalapa*



Chloroplasty se dědí přes cytoplazmu vaječné buňky, ne přes cytoplazmu spermatických buněk. Dědí se náhodně.

Dědičnost uniparentální, maternální


Kvasinky *Saccharomyces cerevisiae*



Boris Ephrussi (1901 -1979)



Normální kolonie




Petitové kolonie



Zakladatel mitochondriální genetiky
„There are two kinds of genetics – nuclear
and unclear“


Typ dědičnosti

Štěpení mendelistické petity SEGREGUJÍCÍ




Mutace v jaderných genech
Mendelistické štěpení
1:1 (2:2)

Štěpení nemendelistické petity VEGETATIVNÍ NEUTRÁLNÍ SUPRESIVNÍ




Podílejí se jiné geny než jaderné
Potomci získají standardní mtDNA


Dědičnost biparentální



Plíseň chlebová *Neurospora crassa*




1952 Mary B. Mitchell a Hershel K. Mitchell
Mutace *poky* = *mi-1* (*maternal inheritance*)
Pomalý růst kolonií




wt x poky
kolonie **wt**

Dědičnost uniparentální – maternální



poky x wt
kolonie **poky**



Aska a askospory

Molekulární podstata snížené mitochondriální funkce: defekty v mt genech pro cytochromy, které jsou nezbytné pro transport elektronů na vnitřní membráně

Zelená řasa

Chlamydomonas reinhardtii

1954 Ruth Sager

2 pohlavní typy mt^+ a mt^-

Mutace – rezistence

ke streptomycinu sm^r


citlivost ke streptomycinu sm^s

Potomstvo:

genetická informace rodiče mt^+

genetická informace rodiče mt^- degeneruje


Dědičnost uniparentální



Způsob dědičnosti mitochondrií a plastidů se liší u různých druhů

Druh	organela	dědičnost
Savci	mitochondrie	maternální
Mlži	mitochondrie	biparentální
<i>S. cerevisiae</i>	mitochondrie	biparentální
Plísně	mitochondrie	obvykle maternální, <i>Allomyces</i> – paternální
<i>Chlamydomonas</i>	mitochondrie	po rodiči <i>mt</i> ⁻
<i>Chlamydomonas</i>	chloroplasty	po rodiči <i>mt</i> ⁺
Rostliny Angiosperma m.	a plastidy	maternální (u některých druhů i biparentální)
Gymnosperma m.	a plastidy	obvykle paternální


Molekulární organizace a genové produkty cpDNA




2 invertované repetice

Velká oblast jednokopiových genů


Malá oblast jednokopiových genů




Molekulární organizace a genové produkty mtDNA



Kukuřice






Lidská mtDNA

16 569 pb


**2 geny pro rRNA pro translaci
22 tRNA pro translaci**

13 genů pro polypeptidy
NADH dehydrogenáza (7 genů)
Cytochrom C oxidáza (3 geny)
ATP syntáza (2 geny)
Cytochrom b (1 gen)

Vlastní replikační aparát mitochondrií
Replikace → Transkripce → Translace



Aerobní oxidace – přenos elektronů mitochondriální mutace




Aerobní oxidace – přenos elektronů mitochondriální mutace

Aminokyseliny, mastné kyseliny a glukóza vstupují do mitochondrií a jsou oxidovány

za tvorby acetyl CoA (acetyl koenzymA). Acetyl CoA vstupuje do Krebsova cyklu, kde probíhá oxidační kaskáda. Její výtěžek je vázán ve formě redukovaného koenzymu NADH (nicotinamid adenin dinukleoid).

NADH přenáší své redukční ekvivalenty na 5 enzymových komplexů CI až CV.

Silné šipky ukazují tok elektronů v respiračním řetězci, který probíhá na vnitřní mitoch. membráně.



NADH dehydrogenáza

Sukcinyldehydrogenáza

Cytochrom C oxidoreduktáza

Cytochrom C oxidáza

ATP syntáza

Aerobní degradace
1glukóza = 38 molekul ATP
Anaerobní glykolýza
2 molekuly ATP

Aplikační oblasti organelové DNA

Vzácné lidské choroby


Forenzní vědy

**Chloroplastové genové
inženýrství**

**Samčí sterilita ve šlechtění
rostlin**

Vzácné lidské choroby

Mutace mtDNA a heteroplazmie



Zygota

získává velký počet organel
prostřednictvím vajíčka
Organely s mutací – černé
Organely bez mutace – bílé

Tkáně

Organely se množí autonomně
Dospělý jedinec má buňky s různou směsí normálních a abnormálních organel

Heteroplazmie 10 až 20%

V případě mutací způsobujících choroby mohou mít různé tkáně různé množství mutantní a normální mtDNA. Děti jedné matky tak mohou mít odlišné fenotypy v závislosti na množství mutantní mtDNA v jednotlivých tkáních


Historie

- **1962** První zpráva o lidské chorobě v důsledku narušené energetické aktivity mitochondrií. Symptomy **demence**.
- **Souvislosti mezi poruchou energetické aktivity mitochondrií a degenerativními postiženími mozku, myokardu i kosterních svalů, ledvin a žláz s vnitřní sekrecí.**
Názor, že příčinou jsou **mutace jaderných genů**.
- **80. léta 20. st.** prokázáno, že **mutace mitochondriálních genů** způsobují poruchy syntézy proteinů, jejichž prostřednictvím je tvořena H⁺-ATPáza. **Důsledek** narušení účinnosti komplexu respiračních reakcí, neboli tvorby energie v buňce.
- **Choroby způsobené dysfunkcí mitochondrií jsou popisovány až od roku 1988.**

Typy genových defektů mitochondriálních chorob

□ **Velká přeuspořádání mtDNA**

1988 Holt a kol. koexistence normální a mutantní mtDNA s jednou velkou delecí (především) ve svalstvu pacientů.



Diagnostika podle délky fragmentů mtDNA

Ctr mtDNA standard
P1 mtDNA standard + mtDNA s delecí (kratší fragment)
P2, P3 vícenásobné delece
P2 30 let
P3 60 let = s věkem se zvyšuje množství mutantní mtDNA

Bodové mutace mtDNA

Diagnostika - všechny tkáně včetně leukocytů

Mutace genu pro 12S rRNA, nukleotid 1555, A-G. homoplazmie, hluchota.

22 genů tRNA – identifikována řada substitucí

tRNA pro Leu, nt 3243 A-G

Onemocnění MELAS

Příznaky: opakování záchvaty mrtvice před dosažením 40 let, často již v dětství, demence, hluchota. Asi 1-2% pacientů s diabetes mellitus má tuto bodovou mutaci v genu pro tRNA.

Analýza mtDNA - diagnostika

Histologické preparáty svalových vláken (barvení na cytochrom c oxidázu a sukcinyldehydrogenázu)

Sekvenování

Amplifikace fragmentů mtDNA a restrikční analýza






FIGURE 2 | Laboratory investigation of novel mt-tRNA variants based on a previously published m.15967G>A MTTP mutation.⁶⁵ Two muscle fibers (highlighted by an asterisk) are shown in a sequential series of transverse muscle sections from the patient highlighting the following

Důsledky mitochondriálního defektu



Projevy poškození orgánů

- Poruchy vedení srdečního vzruchu
- Kardiomyopatie¹
- Diabetes mellitus
- Šedý zákal
- Laktátová acidóza²
- Poškození ledvinných glomerulů
- Poškození sluchu
- Poškození jater
- Poškození slinivky břišní
- Intestinální pseudoobstrukce³
- Epizodické zvracení
- Pancytopenie⁴
- Deprese

¹Úbytek a ochabování příčně pruhovaného svalstva.

²Nadbytek kyseliny mléčné v séru. Laktát je syntetizován při anaerobní glykolýze a při oxidativním aerobním metabolismu je rychle odbouráván. Defekty mitochondrií vedou k poruchám oxidativního metabolismu a tím k hromadění laktátu.

³Poruchy vyprazdňování střeva

⁴Současný pokles všech typů krevních tělisek.

Neurologické příznaky mitochondriálních chorob

- Obrna okohybných svalů
 - Poškození zrakového nervu
 - Mozková mrtvice u mladého člověka
 - Křeče
 - Svalové poškození
 - Únava, neschopnost fyzické zátěže
 - Ataxie – porucha koordinace pohybů
 - Demence
 - Periferní neuropatie – potížení nervů
vlivem nedostatečného cévního zásobování nervů
 - Kalcifikace bazálních ganglií
-

Chronická externí oftalmoplegie

CPEO

- Genetický základ – bodové mutace v genech pro tRNA
 - Paralýza okohybných svalů (oftalmoplegie)
 - V pokročilejším stádiu i svalů dolních končetin
 - Mikroskopické vyšetření - svalová vlákna se jeví jako „potrhaná“
-

Kearns-Sayrův syndrom

KSS

- Genetický základ - delece v různých pozicích mtDNA
 - V dětském věku - žádné symptomy, objevují se až v dospělosti (po 20. roku)
 - Ztráta vidění- choroba retinis pigmentosa. Sítnice nefunguje jak má – nejdříve jsou nefunkční okrajové buňky tyčinky (špatné vidění za šera, v noci). Později jsou zasaženy i čípky = zrakové buňky ve středu oka = narušení barevného vidění.
 - Ztráta sluchu
 - Srdeční choroby – vady
 - Demence, malý vzrůst
 - Ataxie
 - Čím větší je podíl mtDNA s delecí, tím rozsáhlejší jsou symptomy = neuromuskulární choroba
-

Leberova dědičná oční neuropatie

LHON

- Mutace v mt genech pro respirační proteiny:
ND1, ND2, ND4, ND5, ND6, CO1, cytb
 - Přes 50% případů je způsobeno v určité pozici genu kódujícího jednu podjednotku NADH dehydrogenázy
 - Postihuje oční nerv, náhlá ztráta zraku u jednoho nebo obou očí Průměrný věk ztráty vidění je 27 let
 - Srdeční dysrytmie
 - Výskyt vzácný 1: 50000
 - Maternální dědičnost **X** většinou zjištěna u **mužů**, druh interakce genů vázaných na X-chromozom s mtDNA
-

Leighův syndrom

- Mutace genu *ATPasa6* pro podjednotku mitochondriální ATP syntetázy
 - Projevy již v dětském věku, nemoc je letální:
 - Progresivní ztráta motorických a verbálních schopností
 - Postupná degenerace bazálních ganglií
 - Neurogenní svalová slabost
-


Mitochondriová encefalomyopatie, laktátová acidóza

MELAS

- geny pro tRNA pro leucin a lysin

Symptomy v dětském věku:

- Pomalý vzrůst, záchvaty a zvracení.
- Svalová slabost. Ochrnutí očních víček, poruchy sluchu a dýchání. Ztrata schopnosti řeči.
- Poškození mozku (spongionální degenerace), laktátová acidóza, křeče, mozková mrtvice u mladého člověka.
- Duševní retardace, demence
- Mutace současně příčinou cca. 1,5% případů diabetu - Langerhansovy ostrůvky nemají dostatek energie, ztrácejí schopnost tvorby inzulínu.



Maternálne dědičná myopatie a kardiomyopatie

MMC

- Myopatie - skupina chorob projevující se postupným úbytkem a ochabováním příčně pruhovaného svalstva
 - Kardiopatie - trvalé poškození srdečního svalu, zbytnění a rozšíření komor a srdeční slabost
-



Myoklonická epilepsie s “potrhanými” svalovými vlákny

MERRF

- Poruchy centrální nervové soustavy, kostry a srdeční činnosti
 - Epileptické křeče, svalové záškuby
 - Ataxie – nedostatečná koordinace svalů
 - Hluchota, demence
 - Při mikroskopickém vyšetření vypadají svalová vlákna jako “potrhaná”.
-

MERRF

- Mutace genu pro tRNA pro lysin, tranzice A-G
- Tato záměna zněmožňuje plnou kapacitu translace mtDNA v organele, což vede krůzným projevům poruchy.



RRF = ragged red fiber = potrhaná vlákna

Diagnostika ve vzorku tkáně svalu po biopsii: RRF obklopují normální svalová vlákna. Ultrastruktura mitochondrií je změněna: jsou zvětšené, zvyšuje se jejich počet, mají defektní systém krist.

Neurogenní svalová ochablost s ataxií a *retinis pigmentosa*

NARP

- Neuromyopatie, ataxie a *retinis pigmentosa* degenerace retinálního neuroepitelu,
 - atrofie zrakového nervu
 - pigmentové změny na sítnici
-

Získané poruchy mitochondriálního genomu

- Postupné hromadění mutací mitochondriálního genomu s následnou poruchou funkce mitochondrií bylo označeno za možnou příčinu **Alzheimerovy nebo Parkinsonovy nemoci** a jiných degenerativních chorob stáří.
 - Mutace postihující gen pro tRNA řídící transport glutaminu je považována za příčinu vzniku asi 5% případů Alzheimerovy choroby v evropské populaci.
-

AIDS

- Antivirové přípravky = substráty virové DNA-polymerázy, zabudování do virového genomu, poruchy replikace viru
- Vedlejší účinky léků na mtDNA
- Lék **zidovudin** – u pacientů myopatie
zalcitabin – neuropatie
didanosin – zánět slinivky (u 23% pacientů)
- Zabíjecí lék: **fialuridin** - hepatopatie (jaterní choroby)
- **Lamivudin** – nezpůsobuje poškození mitochondrií, minimum nežádoucích účinků

Mitochondrie a smrt buňky


- Mitochondriální stárnutí
 - 10x častější vznik mutací než v jaderné DNA
 - Oxidativní stres, nadbytek volných radikálů, oxidace lipidů
 - Degenerativní choroby
 - Stárnutí organismu
poruchy paměti, sluchu, zraku, pokles vitality a obranyschopnosti
-

Mt DNA a forenzní vědy

□ Výhody



- Vysoký počet kopií mtDNA (kvantita)
 - Nedochází k rekombinaci (stabilita)
 - Maternální dědičnost
 - **Využití:** rutinní analýzy mtDNA starých kostí, zubů, částí vlasů a chlupů (lidské i zvířecí)
 - **Hypervariabilní oblasti**
 - **HV1** (nt 16024–16365) a **HV2** (73–340)
-

Analýza hypervariabilních oblastí mt genomu, testy identity



Využití

Kriminalistika, genealogie, archeogenetika




Mt DNA a cytoplazmatická samčí sterilita (CMS) u rostlin

- CMS kódována mitochondriálním genomem
- **150 druhů, 20 čeledí**
- Kukuřice – 3 plazmotypy **cmsT**, **cmsS**, **cmsC**,
- více jaderných genů obnovy **Rf1**, **Rf2**, **Rf3**, **Rf4** až **Rf8**
- Mt gen *URF-13* tvoří aldehydy toxické pro mitochondrie buněk tapeta
- *Rf2* tvorba alkoholdehydrogenáz odstraňuje toxické látky

Využití samčí sterility ve šlechtění

- Výroba hybridního osiva
- Heterózní šlechtění



Chloroplastové genové inženýrství rostlin

Historie

- **1980** První introdukce izolovaných chloroplastů do protoplastů
 - Biolistická metoda transformace (bombardování mikroprojektily)
 - **1988** První plastidová transformace zelené řasy *Chlamydomonas reinhardtii*
 - Mutant v genu *atpB* po bombardování mikroprojektily s DNA wt *atpB* genu = introdukovaný gen opravil původní nefunkční gen
atpB – gen pro podjednotku ATP syntázy
 - Úspěšná komplementace, stabilní integrace do plastidového genomu
-


Plastidy rostlin jsou ideálními kandidáty pro genové inženýrství

Výhody


- 1. Vysoká úroveň exprese plastidových genů
 - Kolik kopií každého genu je obsaženo v 1 buňce potenciálně transformované?*
 - 2. Maternální dědičnost
 - 3. Absence pozičního efektu – viz způsob introdukce transgenů homologní rekombinací
 - 4. Absence epigenetických vlivů – nedochází ke změnám v regulaci genů a k jejich umlčování
-

Introdukce transgenů do cpDNA homologní rekombinací

Inaktivace cp genu pro fotosyntézu
Transformací (gen Rubisco)



Regenerace rostlin Bílé sektory –
po transformaci homoplazmie
-organogeneze
-somatická embryogeneze
podmínky *in vitro*



aadA – kóduje rezistenci k antibiotiku spektomy-
cinu a streptinomycinu

Místo začlenění transgenu

až



Tvorba funkčního proteinu

- Poznatky plastidové genomiky – sekvenování cpDNA, nezbytnost pro tvorbu vektoru
- Vektory pro transformaci – univerzální vektor neexistuje
- Efektivní regenerace rostlin somatickou embryogenezí
- Vyloučení genů pro antibiotika z vektoru
- Stabilní integrace a stabilní exprese genu
- Tvorba funkčního proteinu
- Ekonomická produkce cizích proteinů

?Bezpečnost - rizika?

Rezistence k antibiotiku u transgenních rostlin

Sója



Potomstvo F1
transgenní x wt wt x transgenní

Praktické aspekty chloroplastového inženýrství

Cíle

Zlepšení agronomických vlastností

- Rezistence k hmyzu
 - Rezistence k herbicidům
 - Rezistence k chorobám – původci bakterie, houby
 - Tolerance k suchu
 - Tolerance k zasolení
 - Fytoremediace
-

Terapeutické proteiny

Biomateriály

Průmyslové enzymy

Spektrum druhů

- Tabák terapeutické proteiny
- Mrkev jedlé vakcíny
- Bavlník
- Sója

Plastidy jako bioreaktory farmakologických látek

Lidský somatotropin

- Léčba trpasličího vzrůstu u dětí, Turnerova syndromu, chronického selhání ledvin
- Gen *hST*
- 7% tsp

Albumin lidského séra

- Tvoří 60% proteinů krevního séra. Náhrada krve při traumatických stavech
- Gen *HSA*
- 11,1% tsp

Antimikrobiální peptidy

- MSI-99
- Efektivní i vůči lidským patogenům, efektivní i vůči bakteriím rezistentním k řadě léčiv (*Pseudomonas aeruginosa*)
- Po transformaci tabáku buněčný extrakt účinný vůči rezistentním bakteriím
- 21,5% tsp

Lidský interferon

- Glykoprotein produkovaný bílými krvinkami jako odpověď na napadení organizmu virem.
- Funkce jako léčivo při virových infekcích, leukemii i proti nádorům (ledvin, kůže, sarkomu, malignímu lymfomu, mnohočetným myelomům aj.)
- Účinek – tlumí metabolismus některých buněk, tlumí projevy genů odpovědných za nádorovou přeměnu buňky
- Transgenní tabák
Interferon α 19% tsp
IFN α 2b léčba leukemických buněk
Interferon γ 6% tsp

Monoklonální protilátky

- Imunoglobuliny (Ig)
- Chrání tělo proti toxickým látkám a pronikajícím patogenům
- Protilátka Guy's 13 účinná vůči *Streptococcus mutans*
- psbA regulační sekvence + gen Guy 13 – exprese IgA-G

Výhoda - cena

Bioreaktory pro vakcíny

- Vakcína cholery
Gen - podjednotka toxinu cholery CTB β
Původce *Vibrio cholerae*
- Vakcína antraxu – snět slezinná, původce *Bacillus anthracis*
- Vakcína moru
Původce *Yersinia pestis*
- Zvířecí vakcíny – psí parvovirus

Využití Produkty ve fázi klinických testů

Produkt	Rostlina
Lidský somatotropin léčba trpasličího vzrůstu u dětí Turnerova syndromu	tabák
Albumin lidského séra Náhrada krve při traumatických stavech Dow AgroSciences	tabák
Lidský interferon a 2b Funkce jako léčivo při virových infekcích, leukemii i proti nádorům Biolex Therapeutics Inc	okřehek
Pankreatická lipáza cystická fibróza doplněk stravy Meristem Therapeutics	kukuřice
Protilátky proti zubnímu kazu Planet Biotechnology Inc. (CaroX™) schváleno pro EU, ještě není na trhu	tabák
Vakcína psích parvovirů Large Scale Biology Corp.	tabák

Komerční produkty na trhu

Produkt		Rostlina
Avidin	Prodigene	kukuřice
β-glukuronidáza	Prodigene	kukuřice
Trypsin	Prodigene	kukuřice
Lidský lakoferin	Meristem Therapeutics	kukuřice, rýže
Lidský lysozym	Ventria Bioscience	rýže
Lipáza	Meristem Therapeutics	kukuřice
α-amyláza	Syngenta	kukuřice, tabák

**Děkuji za pozornost
Dotazy !**
