

Drsná matematika I – 8. přednáška

Lineární zobrazení

Jan Slovák

Masarykova univerzita
Fakulta informatiky

17. 4. 2007

Obsah přednášky

- 1 Literatura
- 2 Lineární zobrazení
- 3 Opět souřadnice
- 4 Více souřadnic

Plán přednášky

- 1 Literatura
- 2 Lineární zobrazení
- 3 Opět souřadnice
- 4 Více souřadnic

Kde je dobré číst?

- vlastní poznámky, texty současného nebo předcházejícího přednášejícího, GOOGLE, atd.

Kde je dobré číst?

- vlastní poznámky, texty současného nebo předcházejícího přednášejícího, GOOGLE, atd.
- Pavel Horák, Úvod do lineární algebry, MU Brno, skripta.
- Luboš Motl, Miloš Zahradník, Pěstujeme lineární algebru, 3. vydání, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 348 stran (elektronické vydání také na <http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/>).
- Riley, K.F., Hobson, M.P., Bence, S.J. Mathematical Methods for Physics and Engineering, second edition, Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0 521 89067 5, xxiii + 1232 pp.
- František Šik, Lineární algebra zaměřená na numerickou analýzu, MU, 1998, 176 s. ISBN 80-210-1996-2.

Plán přednášky

- 1 Literatura
- 2 **Lineární zobrazení**
- 3 Opět souřadnice
- 4 Více souřadnic

Nechť V a W jsou vektorové prostory nad týmž polem skalárů \mathbb{K} .
Zobrazení $f : V \rightarrow W$ se nazývá **lineární zobrazení**
(**homomorfismus**) jestliže platí:

- 1 $f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in V$
- 2 $f(a \cdot u) = a \cdot f(u), \forall a \in \mathbb{K}, \forall u \in V.$

Nechť V a W jsou vektorové prostory nad týmž polem skalárů \mathbb{K} . Zobrazení $f : V \rightarrow W$ se nazývá **lineární zobrazení (homomorfismus)** jestliže platí:

- 1 $f(u + v) = f(u) + f(v), \forall u, v \in V$
- 2 $f(a \cdot u) = a \cdot f(u), \forall a \in \mathbb{K}, \forall u \in V.$

Samozřejmě, že jsme taková zobrazení již viděli ve formě násobení matic:

$$\mathbb{K}^n \ni x \mapsto A \cdot x \in \mathbb{K}^m$$

s maticí typu m/n nad \mathbb{K} .

Obraz $\text{Im} f := f(V) \subset W$ je zjevně vektorový podprostor. Stejně tak je vektorovým podprostorem množina všech vektorů $\text{Ker} f := f^{-1}(\{0\}) \subset V$. Nazývá se **jádro lineárního zobrazení** f . Lineární zobrazení, které je bijekcí nazýváme *izomorfismus*.

Obraz $\text{Im } f := f(V) \subset W$ je zjevně vektorový podprostor. Stejně tak je vektorovým podprostorem množina všech vektorů $\text{Ker } f := f^{-1}(\{0\}) \subset V$. Nazývá se **jádro lineárního zobrazení** f . Lineární zobrazení, které je bijekcí nazýváme *izomorfismus*.

Theorem

Nechť $f : V \rightarrow W$ je lineární zobrazení. Pro všechny $u, u_1, \dots, u_k \in V, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{K}$ platí:

- 1 $f(0) = 0$
- 2 $f(-u) = -f(u)$
- 3 $f(a_1 \cdot u_1 + \dots + a_k \cdot u_k) = a_1 \cdot f(u_1) + \dots + a_k \cdot f(u_k)$
- 4 *pro každý vektorový podprostor $V_1 \subset V$ je jeho obraz $f(V_1)$ vektorový podprostor ve W .*
- 5 *Pro každý podprostor $W_1 \subset W$ je množina $f^{-1}(W_1) = \{v \in V; f(v) \in W_1\}$ vektorový podprostor ve V .*

Jednoduché důsledky

- 1 Složení $g \circ f : V \rightarrow Z$ dvou lineárních zobrazení $f : V \rightarrow W$ a $g : W \rightarrow Z$ je opět lineární zobrazení.
- 2 Lineární zobrazení $f : V \rightarrow W$ je izomorfismus právě když $\text{Im } f = W$ a $\text{Ker } f = \{0\} \subset V$. Inverzní zobrazení k izomorfismu je opět izomorfismus.
- 3 Pro podprostory V_1, V_2 a lineární zobrazení $f : V \rightarrow W$ platí $f(V_1 + V_2) = f(V_1) + f(V_2)$, $f(V_1 \cap V_2) \subset f(V_1) \cap f(V_2)$.
- 4 Zobrazení "přiřazení souřadnic" $\underline{u} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ dané libovolně zvolenou bází $\underline{u} = (u_1, \dots, u_n)$ vektorového prostoru V je izomorfismus.
- 5 Dva konečněrozměrné vektorové prostory jsou izomorfní právě když mají stejnou dimenzi.
- 6 Složení dvou izomorfismů je izomorfismus.

Plán přednášky

- 1 Literatura
- 2 Lineární zobrazení
- 3 Opět souřadnice**
- 4 Více souřadnic

Uvažujme libovolné vektorové prostory V, W nad \mathbb{K} s $\dim V = n$, $\dim W = m$ a mějme lineární zobrazení $f : V \rightarrow W$. Pro každou volbu bází $\underline{u} = (u_1, \dots, u_n)$ na V , $\underline{v} = (v_1, \dots, v_m)$ na W , máme k dispozici příslušná přiřazení souřadnic:

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{f} & W \\
 \underline{u} \downarrow \simeq & & \simeq \downarrow \underline{v} \\
 \mathbb{K}^n & \xrightarrow{f_{\underline{u}, \underline{v}}} & \mathbb{K}^m
 \end{array}$$

Přitom je každé lineární zobrazení jednoznačně určeno svými hodnotami na libovolné množině generátorů, zejména tedy na bázi \underline{u} .

Jestliže za V i W zvolíme tentýž prostor, ale s různými bazemi, a za f identické zobrazení, vyjadřuje náš postup vektory báze \underline{u} v souřadnicích vzhledem k \underline{v} . Označme výslednou matici T . Když pak zadáme vektor u

$$u = x_1 u_1 + \cdots + x_n u_n$$

v souřadnicích vzhledem k \underline{u} a dosadíme za u_i , obdržíme souřadné vyjádření \bar{x} téhož vektoru v bázi \underline{v} . Stačí k tomu přeskládat pořadí sčítanců a vyjádřit skaláry u jednotlivých vektorů báze. Podle výše uvedeného postupu musí vyjít $\bar{x} = T \cdot x$. Tuto matici nazýváme *matice přechodu* od báze \underline{u} k bázi \underline{v} . Matice T zadávající transformaci souřadnic z báze \underline{u} do báze \underline{v} je tedy maticí identického zobrazení $\text{id}_V : V \rightarrow V$:

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V \\
 \underline{u} \downarrow \simeq & & \simeq \downarrow \underline{v} \\
 \mathbb{K}^n & \xrightarrow{(\text{id}_V)_{\underline{u}, \underline{v}}} & \mathbb{K}^n
 \end{array}$$

Theorem

Matici T přechodu (od báze \underline{u} k bázi \underline{v}) získáme tak, že souřadnice vektorů báze \underline{u} v bázi \underline{v} napíšeme do sloupců matice T .

Theorem

Matici T přechodu (od báze \underline{u} k bázi \underline{v}) získáme tak, že souřadnice vektorů báze \underline{u} v bázi \underline{v} napíšeme do sloupců matice T .

Funkce matice přechodu je taková, že známe-li souřadnice x vektoru v v bázi \underline{u} , pak jeho souřadnice y v bázi \underline{v} se obdrží vynásobením sloupce x maticí přechodu (zleva). Protože inverzní zobrazení k identickému je opět totéž identické zobrazení, je matice přechodu vždy invertibilní a její inverze je právě matice přechodu opačným směrem, tj. od báze \underline{v} k bázi \underline{u} .

Plán přednášky

- 1 Literatura
- 2 Lineární zobrazení
- 3 Opět souřadnice
- 4 Více souřadnic**

Nyní snadno vidíme, jak se skládají souřadná vyjádření lineárních zobrazení. Uvažme ještě další vektorový prostor Z nad \mathbb{K} dimenze k s bází \underline{w} , lineární zobrazení $g : W \rightarrow Z$ a označme příslušnou matici $g_{\underline{v}, \underline{w}}$. Pro matice těchto zobrazení dostáváme čímž jsme odvodili:

$$g_{\underline{v}, \underline{w}} \circ f_{\underline{u}, \underline{v}}(x) = B \cdot (A \cdot x) = (B \cdot A) \cdot x = (g \circ f)_{\underline{u}, \underline{w}}(x)$$

pro všechny $x \in \mathbb{K}^n$. Všimněte si, že isomorfismy odpovídají právě invertibilním maticím.

Stejný postup nám dává odpověď na otázku, jak se změní matice zobrazení, změníme-li báze na definičním oboru i oboru hodnot:

$$\begin{array}{ccccccc}
 V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V & \xrightarrow{f} & W & \xrightarrow{\text{id}_W} & W \\
 \underline{u}' \downarrow \simeq & & \underline{u} \downarrow \simeq & & \simeq \downarrow \underline{v} & & \simeq \downarrow \underline{w}' \\
 \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\quad T \quad} & \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\quad f_{\underline{u}, \underline{v}} \quad} & \mathbb{K}^m & \xrightarrow{\quad S^{-1} \quad} & \mathbb{K}^m
 \end{array}$$

kde T je matice přechodu od \underline{u}' k \underline{u} a S je matice přechodu od \underline{v}' k \underline{v} . Je-li tedy A původní matice zobrazení, bude nová dána jako $A' = S^{-1}AT$.

Stejný postup nám dává odpověď na otázku, jak se změní matice zobrazení, změníme-li báze na definičním oboru i oboru hodnot:

$$\begin{array}{ccccccc}
 V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V & \xrightarrow{f} & W & \xrightarrow{\text{id}_W} & W \\
 \downarrow \underline{u}' \simeq & & \downarrow \underline{u} \simeq & & \downarrow \underline{v} \simeq & & \downarrow \underline{w}' \simeq \\
 \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\quad T \quad} & \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\quad f_{\underline{u}, \underline{v}} \quad} & \mathbb{K}^m & \xrightarrow{\quad S^{-1} \quad} & \mathbb{K}^m
 \end{array}$$

kde T je matice přechodu od \underline{u}' k \underline{u} a S je matice přechodu od \underline{v}' k \underline{v} . Je-li tedy A původní matice zobrazení, bude nová dána jako $A' = S^{-1}AT$.

Ve speciálním případě lineárního zobrazení $f : V \rightarrow V$ vyjadřujeme zpravidla f pomocí jedné báze \underline{u} prostoru V , to je přechod k nové bázi \underline{u}' bude znamenat změnu na $A' = T^{-1}AT$.