

Modelování biologických systémů

Radek Pelánek

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Modelování v biologických vědách

typický cíl: pomocí modelů se snažíme pochopit, jak biologické systémy fungují

- **model** zahrnuje naše chápání
- **simulace** ukazuje, zda model odpovídá realitě

Výhody výpočetního modelování

- nutí ujasnit detaily, ukazuje mezery v porozumění
- možnost „manipulovat“ s časem a prostorem, vyzkoušet mnoho různých variací
- nikdo při tom neumírá ani netrpí
- levné (relativně vůči experimentům)

samozřejmě však: nutné kombinovat s reálným sběrem dat, experimenty, ...

Příklady: na úrovni buněk, organismů

- vývoj:
 - růst organismů
 - formování vzorů
 - diferenciacce buněk
 - vliv parametrů (např. teploty) na procesy
- chování tvorů, strategie:
 - výběr lovišť
 - výběr partnera

Příklady: na úrovni druhu

- populační dynamika:
 - predátor-kořist
 - věková struktura
 - imigrace, emigrace
- sociální chování: hejna, stáda, organizace mraveniště
- epidemie

Příklady: na úrovni ekosystému

- evoluce: zkoumání evolučních mechanismů
- znečištění: šíření znečištění, vliv znečištění na biologické procesy, ozónová díra
- prostorové modely: vývoj krajiny, porostu (propojení s GIS)


Bioinformatika

„využití počítačů v biologickém výzkumu“

dva základní směry:

- objevování znalostí:
 - získávání a analýza rozsáhlého množství dat
 - např. sekvenování genomu
- modelování a simulace:
 - vytváření a analýza modelů
 - srovnávání výstupů simulací s realitou


Systémová biologie



Vývoj vulvy u *C. elegans*

- *Computational insights into Caenorhabditis elegans vulval development*
- studium vývoje buněk – genetická informace je ve všech buňkách stejná, to jak se buňka vyvine závisí na „signálech“, které si vyměňuje s okolními buňkami
- *Caenorhabditis elegans* – malý červ
- oblíbený objekt studia v biologii (modelový organismus)
 - asi 1000 „invariantních“ buněk, zmapován osud každé buňky
 - sekvenován genom

C. Elegans (vulva)




Vývoj vulvy

- 6 buněk (vulval precursor cells)
- každá z nich se adaptuje na jednu ze **tří možností** (fate): primární (1'), sekundární (2'), ternární (3')
- o tom, jaká možnost nastane se rozhoduje pomocí **mezibuněčných signálů** (tři druhy signálů)

Vývoj vulvy

- **normální** okolnosti \Rightarrow rozhoduje vzdálenost od „anchor cell“ (AC)
 - standardní „konfigurace“ buněk
 - 3', 3', 2', 1', 2', 3'
- **mutace** (změna genů, odstranění AC) \Rightarrow jiné konfigurace


C. Elegans (vulva)



Klasické biologické modely

- biologické experimenty s různými mutacemi → pozorování → model
- statické diagramy bez přesné sémantiky
- znázorňují vztahy (umožnění/zakázání)
- neumožňují simulaci


C. Elegans (vulva)



Model pomocí statecharts

- **statecharts** – formalismus pro modelování počítačových systémů (zejména design), součást UML
- **formalizace** biologického modelu: spustitelná, simulovatelná
- nutno **doplnit** chybějící details, skryté hypotézy
- vede k objevení **nesrovnalostí** mezi modelem a biologickými pozorováními, k upřesnění modelu, doplnění temporálních vztahů

C. Elegans (vulva)



Model vývoje vulvy: poznámka

- při absenci AC dochází k vzniku konfigurace 1', 2', 1', 2', 1', 2'
- původní model vede ke konfiguraci 1', 1', 1', 1', 1', 1'
- u reálného (biologického) systému buňky nikdy nejsou současně primární (1')
 - „vzájemné vyloučení“

Genetic regulatory networks

regulační sítě genové exprese

- geny se projevují tvorbou proteinů
- proteiny ovlivňují míru s jakou se geny projevují
- složité sítě vzájemných vztahů, **zpětné vazby**
- analýza poměrně složitá; hojné využití modelů

Základy

DNA	nese genetickou informaci
RNA	přenos informace mezi DNA a proteiny
proteiny	vykonávají většinu užitečné práce v buňce např. přenos kyslíku, katalyzace, ... regulace přepisu DNA, tj. regulace exprese genů





Figure 5.2

The genetic signaling network. The solid lines refer to information flow from primary sources (DNA, mRNA). The broken lines correspond to information flow from secondary sources back to the primary source (Somogyi and Sniegowski 1996).



Modely



boolean networks binární stavy pro vyjádření stavu (exprese genů, přítomnost proteinů), synchronní
~ modely hardwaru

kinetické modely diskrétní stavy (žádná exprese, mírná exprese, ...), asynchronnost
~ modely protokolů

diferenciální rovnice proměnné = koncentrace proteinů, míra exprese genů
~ systémové modely

hybridní modely kombinace diskrétních a spojitých prvků, stochastické jevy, ...
~ modely vestavěných systémů

Příklad: stavový prostor




Chemotaxe bakterií

- chemotaxe = pohyb organismu dle výskytu chemikálií v jeho okolí
- chemotaxe bakterií – pohyb směrem k nejvyšší koncentraci potravy

Model struktury lesa


- prostorový model březového lesa
- mřížka, každé pole reprezentuje pole 15x15 metrů
- rekonstrukce mozaikovitého charakteru lesa
- reakce na mimořádné události (bouře)

Jedno pole




Stav simulace

232



Hledání teritoria



(a)

