

Matematika II – 10. přednáška

Nekonečné řady

Michal Bulant

Masarykova univerzita
Fakulta informatiky

19. 11. 2008

Obsah přednášky

1 Nekonečné řady

- Řady absolutně a relativně konvergentní

2 Posloupnosti a řady funkcí

- Močninné řady
- Taylorovy a Maclaurinovy řady

Doporučené zdroje

- Martin Panák, Jan Slovák – **Drsná matematika**, e-text.
- Roman Hilscher – MB102, e-text.

Doporučené zdroje

- Martin Panák, Jan Slovák – **Drsná matematika**, e-text.
- Roman Hilscher – MB102, e-text.
- Zuzana Došlá, Roman Plch, Petr Sojka – **Nekonečné řady s programem Maple**, CD, e-text a videozáznamy,
<http://www.math.muni.cz/~plch/nkpm>.

Plán přednášky

1 Nekonečné řady

- Řady absolutně a relativně konvergentní

2 Posloupnosti a řady funkcí

- Močninné řady
- Taylorovy a Maclaurinovy řady

Řady absolutně a relativně konvergentní

Nejprve si všimněme, že pokud konverguje řada absolutních hodnot, potom konverguje původní řada.

Věta

Jestliže konverguje řada $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$, potom konverguje také řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Řady absolutně a relativně konvergentní

Nejprve si všimněme, že pokud konverguje řada absolutních hodnot, potom konverguje původní řada.

Věta

Jestliže konverguje řada $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$, potom konverguje také řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Důkaz.

Zřejmě pro každé n platí nerovnosti

$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$, $\Rightarrow 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$. Tedy pokud $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konverguje, konverguje také řada $\sum_{n=0}^{\infty} 2|a_n|$ (podle pravidla konstantního násobku). A dále, podle srovnávacího kritéria,

konverguje také řada $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + |a_n|)$. A protože platí rovnost $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$, máme

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$, odkud dostáváme řadu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ jako rozdíl dvou konvergentních řad. Tedy tato řada také konverguje podle pravidla rozdílu. \square



Poznámka

Opačná implikace ve větě zřejmě neplatí, protože např. alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje ale příslušná řada absolutních hodnot je harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, která diverguje k ∞ ,

Poznámka

Opačná implikace ve větě zřejmě neplatí, protože např. alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje ale příslušná řada absolutních hodnot je harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, která diverguje k ∞ ,

Definice

Řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konverguje absolutně (je absolutně konvergentní), pokud konverguje příslušná řada absolutních hodnot, tj. pokud konverguje řada $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$.

Jestliže nekonečná řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konverguje, ale nekonverguje absolutně, potom říkáme, že tato řada konverguje relativně (je relativně konvergentní).

Příklad

- ① Alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje relativně.

Příklad

- ① Alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje relativně.
- ② Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ konverguje absolutně, protože příslušná řada absolutních hodnot $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konverguje.

Příklad

- ① Alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje relativně.
- ② Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ konverguje absolutně, protože příslušná řada absolutních hodnot $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konverguje.

Příklad

- ① Alternující harmonická řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ konverguje relativně.
 - ② Nekonečná řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ konverguje absolutně, protože příslušná řada absolutních hodnot $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konverguje.

Rozdíl mezi absolutně a relativně konvergentní řadou je zejména v tom, že členy absolutně konvergentní řady můžeme libovolně přeskládávat a nejenže dostaneme opět konvergentní řadu, ale tato nová přeskládaná řada bude mít stejný součet jako řada původní. Naproti tomu členy relativně konvergentní řady nelze přeskládávat vůbec. Lze totiž jednoduše ukázat, že různým přeskládáním též relativně konvergentní řady lze vytvořit řadu divergující k $\pm\infty$, konvergující k libovolně předem zvolenému reálnému číslu, či řadu oscilující. To vyplývá z toho, že v relativně konvergentní řadě musí být součet všech kladných členů ∞ a součet všech záporných členů $-\infty$, a při tom musí členy samotné konvergovat k nule.

Příklad

Uved'me jako příklad relativně konvergentní alternující harmonickou řadu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$

Příklad

Uved'me jako příklad relativně konvergentní alternující harmonickou řadu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$.

Nejprve si všimněte, že součet všech kladných členů je nekonečná řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots = \infty,$$

která skutečně diverguje k ∞ (např. podle integrálního kritéria).

Dále součet všech záporných členů je nekonečná řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2n} \right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} - \dots = -\infty,$$

která skutečně diverguje k $-\infty$.

Příklad (pokr.)

Potom vhodným přeskládáním členů alternující harmonické řady lze získat nekonečnou řadu, která:

- ① diverguje k ∞ :

- Vezměme nejprve jeden kladný člen, tj. součet je roven $1 \geq 1$.
 - Přidejme nyní jeden záporný člen a tolik kladných členů, aby byl součet ≥ 2 , tj. součet je pak

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{41} \approx 2.004063454 \geq 2.$$

(K tomu je zapotřebí k té 1 přidat 20 kladných členů.)

- Potom přidejme další (druhý) záporný člen a tolik kladných členů, až je součet ≥ 3 .
 - Potom přidejme další (třetí) záporný člen a tolik kladných členů, až je součet ≥ 4 .
 - ...

- ② diverguje k $-\infty$: obdobně.

Příklad (dokončení)

- ① konverguje k předem zvolenému reálnému číslu: Zvolme si nejprve nějaké číslo $s \in \mathbb{R}$, ke kterému má přerovnaná řada konvergovat.
 - Nejprve vezměme tolik kladných členů, až je jejich součet $\geq s$.
 - Přidejme nyní tolik záporných členů, až je výsledný součet $\leq s$.
 - Přidejme nyní tolik dalších kladných členů, až je výsledný součet $\geq s$, ...

Uvědomme si, že kladných či záporných členů je vždy dostatek, abychom překročili stanovenou hranici s , protože součet kladných členů je ∞ a součet záporných členů je $-\infty$. A protože přidáváme stále se (v absolutní hodnotě) zmenšující se členy, výsledný součet po takových krocích přeskakuje zvolenou hodnotu s a současně se k číslu s nekonečně blíží. Současně tímto způsobem vyčerpáme všechny členy původní řady. Tedy takto přerovnaná řada konverguje právě k číslu s .

- ② osciluje mezi zvolenými $a, b \in \mathbb{R}, a < b$: podobně jako výše.

Součin řad

Příklad

V tomto příkladu si ukážeme, že i když obě řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergují, potom řada $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot b_n)$ konvergovat nemusí.

Uvažujme nekonečné řady, kde $a_n = b_n := (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Potom jsou příslušné nekonečné řady konvergentní, což plyne z Leibnitzova kritéria, zatímco řada součinů

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverguje k ∞ .

Příklad

Na druhou stranu může nastat i situace, že takováto řada součinů $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot c_n)$ konverguje, přestože jedna z řad $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nekonverguje. Vezměme si např. řadu

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}},$$

která diverguje k ∞ , zatímco řada součinů

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot c_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

konverguje

Plán přednášky

1 Nekonečné řady

- Řady absolutně a relativně konvergentní

2 Posloupnosti a řady funkcí

- Močninné řady
- Taylorovy a Maclaurinovy řady

Posloupnosti a řady funkcí

V matematice hrají důležitou roli řady, jejichž členy jsou funkce $f_n(x)$. V takovém případě hovoříme o řadách funkcí, jejichž součtem je funkce $f(x)$.

Posloupnosti a řady funkcí

V matematice hrají důležitou roli řady, jejichž členy jsou funkce $f_n(x)$. V takovém případě hovoříme o řadách funkcí, jejichž součtem je funkce $f(x)$.

Přirozené dotazy jsou:

- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ spojité v nějakém bodě $x_0 \in [a, b]$, je spojitá i funkce $f(x)$ v bodě x_0 ?

Posloupnosti a řady funkcí

V matematice hrají důležitou roli řady, jejichž členy jsou funkce $f_n(x)$. V takovém případě hovoříme o řadách funkcí, jejichž součtem je funkce $f(x)$.

Přirozené dotazy jsou:

- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ spojité v nějakém bodě $x_0 \in [a, b]$, je spojitá i funkce $f(x)$ v bodě x_0 ?
- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ diferencovatelné v $a \in [a, b]$, je v něm diferencovatelná i funkce $S(x)$ a platí vztah $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$?

Posloupnosti a řady funkcí

V matematice hrají důležitou roli řady, jejichž členy jsou funkce $f_n(x)$. V takovém případě hovoříme o řadách funkcí, jejichž součtem je funkce $f(x)$.

Přirozené dotazy jsou:

- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ spojité v nějakém bodě $x_0 \in [a, b]$, je spojitá i funkce $f(x)$ v bodě x_0 ?
- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ diferencovatelné v $a \in [a, b]$, je v něm diferencovatelná i funkce $S(x)$ a platí vztah $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$?
- Jsou-li všechny funkce $f_n(x)$ integrovatelné na intervalu $[a, b]$, je integrovatelná i funkce $f(x)$ a platí vztah $\int f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n(x)dx$?

Ukážeme si na příkladech, že odpovědi na všechny tři takto kladené otázky jsou NE!. Později uvedeme jednoduché dodatečné podmínky na konvergenci řady, které naopak platnosti všech tří tvrzení zajistí. Řady funkcí tedy obecně moc zvladatelné nejsou, nicméně si umíme vybrat velikou třídu takových, se kterými se už pracuje velmi dobře. Mezi ně budou patřit mocninné řady.

Ukážeme si na příkladech, že odpovědi na všechny tři takto kladené otázky jsou NE!. Později uvedeme jednoduché dodatečné podmínky na konvergenci řady, které naopak platnosti všech tří tvrzení zajistí. Řady funkcí tedy obecně moc zvladatelné nejsou, nicméně si umíme vybrat velikou třídu takových, se kterými se už pracuje velmi dobře. Mezi ně budou patřit mocninné řady.

Příklad


Uvažme funkce $f_n(x) = (\sin x)^n$ na intervalu $[0, \pi]$. Hodnoty těchto funkcí budou ve všech bodech $0 \leq x \leq \pi$ nezáporné a menší než jedna, kromě $x = \frac{\pi}{2}$, kde je hodnota 1. Proto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro všechna } x \neq \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{pro } x = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Zjevně tedy je limita posloupnosti funkcí f_n nespojitou funkcí.

Příklad ((ne)spojitost řady funkcí)


Tentýž jev umíme najít i pro řady funkcí, protože součet je limitou částečných součtů. Stačí tedy v předchozím příkladě vyjádřit f_n jako n -tý částečný součet. Např. $f_1(x) = \sin x$, $f_2(x) = (\sin x)^2 - \sin x$, atd. Obrázek vykresluje funkce $f_{n^3}(x)$ pro $n = 1, \dots, 10$.



Příklad ((ne)diferencovatelnost řady funkcí)

Obrázek vykresluje $f_n(x) = x(1 - x^2)^n$ na intervalu $[-1, 1]$ pro hodnoty $n = m^2$, $m = 1, \dots, 10$.

Na první pohled je zjevné, že $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, všechny funkce $f_n(x)$ jsou hladké, ale v bodě $x = 0$ je jejich derivace $f'_n(0) = (1 - x^2)^n - 2nx^2(1 - x^2)^{n-1}|_{x=0} = 1$ nezávisle na n . Limitní funkce pro posloupnost f_n přitom má samozřejmě všude derivaci nulovou!



Příklad ((ne)integrovatelnost řady funkcí)

Protipříklad k třetímu tvrzení jsme už viděli. Charakteristickou funkci $\chi_{\mathbb{Q}}$ racionálních čísel můžeme vyjádřit jakou součet spočetně mnoha funkcí, které budou očíslovány právě racionálními číslami a budou vždy všude nulové, kromě množiny bodů, podle které jsou pojmenovány, kde jsou rovny 1. Riemannovy integrály všech takových funkcí budou nulové, jejich součet ale není Riemannovsky integrovatelnou funkcí.

Stejnoměrná konvergence

Důvodem neúspěchu ve všech příkladech byla různá *rychlosť* bodové konvergence v jednotlivých $x \in \mathbb{R}$. Zmíněnou dodatečnou podmínkou pak bude silnější pojem konvergence.

Definice

Říkáme, že posloupnost funkcí $f_n(x)$ konverguje stejnoměrně na intervalu $[a, b]$ k limitě $f(x)$, jestliže pro každé kladné (malé) číslo ε existuje (velké) přirozené číslo $N \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq N$ a všechna $x \in [a, b]$ platí

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Stejnoměrná konvergence

Důvodem neúspěchu ve všech příkladech byla různá *rychlosť* bodové konvergence v jednotlivých $x \in \mathbb{R}$. Zmíněnou dodatečnou podmínkou pak bude silnější pojem konvergence.

Definice

Říkáme, že posloupnost funkcí $f_n(x)$ konverguje stejnoměrně na intervalu $[a, b]$ k limitě $f(x)$, jestliže pro každé kladné (malé) číslo ε existuje (velké) přirozené číslo $N \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq N$ a všechna $x \in [a, b]$ platí

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Řada funkcí konverguje stejnoměrně na intervalu, jestliže stejnoměrně konverguje posloupnost jejích částečných součtů.

Graficky si definici můžeme představit tak, že do pásu vzniklého posunutím limitní funkce $f(x)$ na $f(x) \pm \varepsilon$ pro libovolně malé, ale pevně zvolené kladné ε , vždy padnou skoro všechny funkce $f_n(x)$.



Následující tři věty lze stručně shrnout tvrzením, že všechna tři obecně neplatná tvrzení platí pro stejnoměrnou konvergenci (pozor ale na jemnosti u derivování).

Věta

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost funkcí spojitých na intervalu $[a, b]$, která na tomto intervalu stejnoměrně konverguje k funkci $f(x)$. Pak je také $f(x)$ spojitá funkce na intervalu $[a, b]$.

Následující tři věty lze stručně shrnout tvrzením, že všechna tři obecně neplatná tvrzení platí pro stejnoměrnou konvergenci (pozor ale na jemnosti u derivování).

Věta

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost funkcí spojitých na intervalu $[a, b]$, která na tomto intervalu stejnoměrně konverguje k funkci $f(x)$. Pak je také $f(x)$ spojitá funkce na intervalu $[a, b]$.

Důkaz.

Chceme ukázat, že pro libovolný pevný bod $x_0 \in [a, b]$ a jakékoli pevně zvolené malé $\epsilon > 0$ bude $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ pro všechna x dostatečně blízká k x_0 . Z definice stejnoměrné spojitosti je pro naše $\epsilon > 0$ $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ pro všechna $x \in [a, b]$ a všechna dostatečně velká n .

Následující tři věty lze stručně shrnout tvrzením, že všechna tři obecně neplatná tvrzení platí pro stejnoměrnou konvergenci (pozor ale na jemnosti u derivování).

Věta

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost funkcí spojitých na intervalu $[a, b]$, která na tomto intervalu stejnoměrně konverguje k funkci $f(x)$. Pak je také $f(x)$ spojitá funkce na intervalu $[a, b]$.

Důkaz.

Chceme ukázat, že pro libovolný pevný bod $x_0 \in [a, b]$ a jakékoli pevně zvolené malé $\epsilon > 0$ bude $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ pro všechna x dostatečně blízká k x_0 . Z definice stejnoměrné spojitosti je pro naše $\epsilon > 0$ $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ pro všechna $x \in [a, b]$ a všechna dostatečně velká n . Zvolme si tedy nějaké takové n a uvažme $\delta > 0$ tak, aby $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \epsilon$ pro všechna x z δ -okolí x_0 (to je možné, protože všechny $f_n(x)$ jsou spojité). Pak

$$|f(x) - f(x_0)| < |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < 3\epsilon$$



Věta (R-integrovatelnost limity stejnoměrně konvergentních funkcí)

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost Riemannovsky integrovatelných funkcí na konečném intervalu $[a, b]$, které stejnoměrně konvergují k funkci $f(x)$. Pak také $f(x)$ je integrovatelná a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Věta (R-integrovatelnost limity stejnoměrně konvergentních funkcí)

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost Riemannovský integrovatelných funkcí na konečném intervalu $[a, b]$, které stejnoměrně konvergují k funkci $f(x)$. Pak také $f(x)$ je integrovatelná a platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Pro příslušný výsledek o derivacích je třeba zvýšené pozornosti ohledně předpokladů:

Věta (diferencovatelnost limity stejnoměrně konvergentních funkcí)

Nechť $f_n(x)$ je posloupnost funkcí diferencovatelných na intervalu $[a, b]$, která na tomto intervalu stejnoměrně konverguje k funkci $f(x)$. Dále nechť jsou všechny derivace $g_n(x) = f'_n(x)$ spojité a nechť konvergují na témže intervalu stejnoměrně k funkci $g(x)$. Pak je také funkce $f(x)$ diferencovatelná na intervalu $[a, b]$ a platí zde $f'(x) = g(x)$.



Test pro stejnoměrnou konvergenci

Nejjednodušším způsobem pro zjištění stejnoměrné konvergence funkcí je porovnání s absolutní konvergencí vhodné posloupnosti. Říkává se tomu často Weierstrassův test.

Předpokládejme, že máme řadu funkcí $f_n(x)$ na intervalu $I = [a, b]$ a že navíc známe odhad

$$|f_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R}$$

pro vhodné nezáporné konstanty a_n a všechna $x \in [a, b]$.

Pokud je řada konstant $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní, pak bude řada funkcí $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konvergentní stejnoměrně

Test pro stejnoměrnou konvergenci

Nejjednodušším způsobem pro zjištění stejnoměrné konvergence funkcí je porovnání s absolutní konvergencí vhodné posloupnosti. Říkává se tomu často Weierstrassův test.

Předpokládejme, že máme řadu funkcí $f_n(x)$ na intervalu $I = [a, b]$ a že navíc známe odhad

$$|f_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R}$$

pro vhodné nezáporné konstanty a_n a všechna $x \in [a, b]$.

Pokud je řada konstant $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní, pak bude řada funkcí $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konvergentní stejnoměrně

Příklad

Rozhodněte, je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ stejnoměrně konvergentní na \mathbb{R} .

Mocninné řady

V části věnované diferenciálnímu počtu jsme ukázali, jak k dané funkci $f(x)$ přiřadit Taylorův polynom stupně n (se středem v daném bodě x_0), který approximuje funkci $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

Definice

Mocninná řada se středem v bodě $x_0 = 0$ je nekonečná řada tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Podobně, nekonečná řada tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

se nazývá mocninná řada se středem v bodě x_0 .

Mocninné řady

V části věnované diferenciálnímu počtu jsme ukázali, jak k dané funkci $f(x)$ přiřadit Taylorův polynom stupně n (se středem v daném bodě x_0), který approximuje funkci $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

Definice

Mocninná řada se středem v bodě $x_0 = 0$ je nekonečná řada tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Podobně, nekonečná řada tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

se nazývá mocninná řada se středem v bodě x_0 .

Bod x_0 se nazývá střed mocninné řady a čísla a_k její koeficienty.

Příklad (geometrická řada)

Pokud vezmeme všechny koeficienty $a_n = 1$ a $x_0 = 0$, dostaneme mocninnou řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Tato řada je geometrická s počátečním členem $a = 1$ a kvocientem $q = x$ a konverguje pro $|x| < 1$, přičemž její součet je $\frac{1}{1-x}$.

Příklad (geometrická řada)

Pokud vezmeme všechny koeficienty $a_n = 1$ a $x_0 = 0$, dostaneme mocninnou řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Tato řada je geometrická s počátečním členem $a = 1$ a kvocientem $q = x$ a konverguje pro $|x| < 1$, přičemž její součet je $\frac{1}{1-x}$.

Příklad

Mocninná řada s $a_n = \frac{(-1)^n}{2^n}$ a středem $x_0 = 2$, která je také geometrická s počátečním členem $a = 1$ a kvocientem $q = -\frac{x-2}{2}$.

Ta podle tvrzení o konvergenci geometrické řady tato řada konverguje pro $\left|-\frac{x-2}{2}\right| < 1$, tj. pro $x \in (0, 4)$, přičemž její součet je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (x-2)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{x-2}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{2+x-2}{2}} = \frac{2}{x} \quad \text{pro } x \in (0, 4).$$



Při studiu konvergence mocninných řad budeme používat kritéria konvergence číselných řad s nezápornými členy, která aplikujeme na příslušnou řadu absolutních hodnot. Zřejmě takto získáme informaci o absolutní konvergenci dané mocninné řady.

Příklad

Určete, pro které hodnoty x konverguje mocninná řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Při studiu konvergence mocninných řad budeme používat kritéria konvergence číselných řad s nezápornými členy, která aplikujeme na příslušnou řadu absolutních hodnot. Zřejmě takto získáme informaci o absolutní konvergenci dané mocninné řady.

Příklad

Určete, pro které hodnoty x konverguje mocninná řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Řešení

Podle podílového kritéria je

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\frac{1}{n+1} x^{n+1}}{\frac{1}{n} x^n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad \text{pro } n \rightarrow \infty.$$

A tedy pro $|x| < 1$ tato řada konverguje (absolutně) a pro $|x| > 1$ nekonverguje (zřejmě pro $x < -1$ diverguje k $-\infty$ a pro $x > 1$ osciluje).

Při studiu konvergence mocninných řad budeme používat kritéria konvergence číselných řad s nezápornými členy, která aplikujeme na příslušnou řadu absolutních hodnot. Zřejmě takto získáme informaci o absolutní konvergenci dané mocninné řady.

Příklad

Určete, pro které hodnoty x konverguje mocninná řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Řešení

Podle podílového kritéria je

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\frac{1}{n+1} x^{n+1}}{\frac{1}{n} x^n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad \text{pro } n \rightarrow \infty.$$

A tedy pro $|x| < 1$ tato řada konverguje (absolutně) a pro $|x| > 1$ nekonverguje (zřejmě pro $x < -1$ diverguje k $-\infty$ a pro $x > 1$ osciluje). Pro $x = -1$ se jedná o zápornou harmonickou řadu která diverguje k $-\infty$. A pro $x = 1$ se jedná o alternující harmonickou řadu, která konverguje (relativně).

Příklad

Určete, pro které hodnoty x konverguje mocninná řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

Příklad

Určete, pro které hodnoty x konverguje mocninná řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

Řešení

Podle podílového kritéria je

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}}{\frac{1}{n!} x^n} \right| = \frac{n!}{(n+1)!} |x| = \frac{1}{n+1} |x| \rightarrow 0 \text{ pro } n \rightarrow \infty.$$

A tedy tato řada konverguje (absolutně) a pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Zřejmě jste již odhadli, že součet této mocninné řady je funkce e^x .

Každá mocninná řada konverguje ve svém středu, protože pro $x = x_0$ se jedná o nulovou řadu. Dále ze srovnávacího kritéria plyne následující.

Věta

Uvažujme mocninnou řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

- ① *Jestliže tato mocninná řada konverguje pro nějaké $x = c$, potom konverguje absolutně pro všechna $|x| < |c|$. Z Weiestrassova kritéria pak plyne dokonce stejnoměrná konvergence na každém uzavřeném intervalu $[a, b] \subseteq (-c, c)$.*
- ② *Jestliže tato řada nekonverguje (tj. diverguje k $\pm\infty$ nebo osciluje) pro nějaké $x = d$, potom nekonverguje pro všechna $|x| > |d|$.*

Poloměr konvergence

Pro každou mocninnou řadu tedy nastává právě jedna z následujících možností:

- Existuje číslo $R > 0$ takové, že tato mocninná řada konverguje absolutně pro $|x - x_0| < R$, tj. pro $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ a nekonverguje pro $|x - x_0| > R$, tj. pro $x < x_0 - R$ a pro $x > x_0 + R$. Řada může a nemusí konvergovat v každém z krajních bodů $x = x_0 - R$ a $x = x_0 + R$.
- Tato mocninná řada konverguje absolutně pro všechna $x \in \mathbb{R}$ (v tomto případě klademe $R := \infty$).
- Tato mocninná řada konverguje pouze pro $x = x_0$ a nekonverguje pro všechna $x \neq 0$ (v tomto případě $R := 0$).

Poloměr konvergence

Pro každou mocninnou řadu tedy nastává právě jedna z následujících možností:

- Existuje číslo $R > 0$ takové, že tato mocninná řada konverguje absolutně pro $|x - x_0| < R$, tj. pro $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ a nekonverguje pro $|x - x_0| > R$, tj. pro $x < x_0 - R$ a pro $x > x_0 + R$. Řada může a nemusí konvergovat v každém z krajních bodů $x = x_0 - R$ a $x = x_0 + R$.
- Tato mocninná řada konverguje absolutně pro všechna $x \in \mathbb{R}$ (v tomto případě klademe $R := \infty$).
- Tato mocninná řada konverguje pouze pro $x = x_0$ a nekonverguje pro všechna $x \neq 0$ (v tomto případě $R := 0$).

Číslo R mající výše popsané vlastnosti nazýváme poloměr konvergence mocninné řady. Pokud je $R > 0$ (tj. pokud nastane první nebo druhá z výše uvedených možností), potom hovoříme o intervalu konvergence.

Příklad

- Pro mocninné řady $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ je poloměr konvergence $R = 1$.

Příklad

- Pro mocninné řady $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ je poloměr konvergence $R = 1$.
- Pro mocninnou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ je poloměr konvergence $R = \infty$.

Příklad

- Pro mocninné řady $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ je poloměr konvergence $R = 1$.
- Pro mocninnou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ je poloměr konvergence $R = \infty$.
- Pro mocninnou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ je poloměr konvergence $R = 0$.

Pro poloměr konvergence R mocninné řady platí následující.

Věta

Pokud existuje limita (vlastní nebo nevlastní)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a, \quad \text{případně} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = a,$$

potom poloměr konvergence mocninné řady je

$$R = \begin{cases} \frac{1}{a}, & \text{pro } a > 0, \\ \infty, & \text{pro } a = 0, \\ 0, & \text{pro } a = \infty. \end{cases}$$

Důkaz.

Vztah pro poloměr konvergence R plyne z podílového kritéria resp. z odmocninového kritéria. Pokud totiž existuje příslušná limita z všety, potom je

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \sqrt[n]{|x - x_0|^n} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0| \\ \rightarrow a \cdot |x - x_0| \quad \text{pro } n \rightarrow \infty$$

Důkaz.

Vztah pro poloměr konvergence R plyne z podílového kritéria resp. z odmocninového kritéria. Pokud totiž existuje příslušná limita z všety, potom je

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \sqrt[n]{|x - x_0|^n} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0| \\ \rightarrow a \cdot |x - x_0| \quad \text{pro } n \rightarrow \infty$$

Tedy mocninná řada konverguje (absolutně), pokud je $a \cdot |x - x_0| < 1$, a nekonverguje, pokud je $a \cdot |x - x_0| > 1$. Pro $a \cdot |x - x_0| = 1$ konvergovat může i nemusí.

Důkaz.

Vztah pro poloměr konvergence R plyne z podílového kritéria resp. z odmocninového kritéria. Pokud totiž existuje příslušná limita z všety, potom je

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \sqrt[n]{|x - x_0|^n} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0| \\ \rightarrow a \cdot |x - x_0| \quad \text{pro } n \rightarrow \infty$$

Tedy mocninná řada konverguje (absolutně), pokud je $a \cdot |x - x_0| < 1$, a nekonverguje, pokud je $a \cdot |x - x_0| > 1$. Pro $a \cdot |x - x_0| = 1$ konvergovat může i nemusí.

To znamená, že pokud je $a > 0$, řada konverguje pro $|x - x_0| < \frac{1}{a}$ a nekonverguje pro $|x - x_0| > \frac{1}{a}$, neboli $R = \frac{1}{a}$.

Pokud je $a = 0$, je $a \cdot |x - x_0| = 0 < 1$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, a tedy řada konverguje pro všechna $x \in \mathbb{R}$, neboli $R = \infty$.

A pokud je $a = \infty$, je $a \cdot |x - x_0| = \infty > 1$ pro všechna $x \neq x_0$, neboli řada nekonverguje pro všechna $x \neq x_0$, neboli $R = 0$. □

Poznámka

Předpoklad existence limity ve větě je příliš silný. Lze ukázat, že stačí místo limity použít limitu superior (která existuje vždy), tj.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a, \quad \text{případně} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = a.$$

Poznámka

Předpoklad existence limity ve větě je příliš silný. Lze ukázat, že stačí místo limity použít limitu superior (která existuje vždy), tj.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a, \quad \text{případně} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = a.$$

Může nastat situace, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a$ existuje, zatímco $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ neexistuje (opačně nikoliv!). Je tedy vidět, že stačí vždy počítat poloměr konvergence pomocí vzorečku s $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = a$ (pokud tedy tato limita existuje jako vlastní nebo jako nevlastní).

Vlastnosti mocninných řad

Mocninné řady (jakožto polynomy nekonečného stupně) sdílejí s polynomy všechny důležité vlastnosti. Zejména, že stejnoměrné konvergence mocninné řady na libovolném uzavřeném podintervalu intervalu konvergence plnye, že:

- součet mocninné řady je spojitá funkce,

Vlastnosti mocninných řad

Mocninné řady (jakožto polynomy nekonečného stupně) sdílejí s polynomy všechny důležité vlastnosti. Zejména, že stejnoměrné konvergence mocninné řady na libovolném uzavřeném podintervalu intervalu konvergence plnye, že:

- součet mocninné řady je spojitá funkce,
- mocninnou řadu můžeme derivovat člen po členu, přičemž se nemění poloměr konvergence,

Vlastnosti mocninných řad

Mocninné řady (jakožto polynomy nekonečného stupně) sdílejí s polynomy všechny důležité vlastnosti. Zejména, že stejnoměrné konvergence mocninné řady na libovolném uzavřeném podintervalu intervalu konvergence plnye, že:

- součet mocninné řady je spojitá funkce,
- mocninnou řadu můžeme derivovat člen po členu, přičemž se nemění poloměr konvergence,
- mocninnou řadu můžeme integrovat (neurčitým i určitým integrálem) člen po členu, přičemž se nemění poloměr konvergence.

Příklad

Určete poloměr konvergence a součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots$$

Příklad

Určete poloměr konvergence a součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots$$

Řešení

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 = a, \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{a} = 1.$$

Tedy řada konverguje pro $x \in (-1, 1)$ a zřejmě nekonverguje v krajních bodech tohoto intervalu.

Příklad

Určete poloměr konvergence a součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots$$

Řešení

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 = a, \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{a} = 1.$$

Tedy řada konverguje pro $x \in (-1, 1)$ a zřejmě nekonverguje v krajních bodech tohoto intervalu.

Protože je $n x^{n-1} = (x^n)'$, součet této řady určíme z věty o derivaci mocninné řady

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n x^n &= x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)' \\ &= x \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

Příklad

Určete součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

a tedy pro $x = 1$ také součet alternující harmonické řady.

Příklad

Určete součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

a tedy pro $x = 1$ také součet alternující harmonické řady.

Řešení

Tato mocninná řada konverguje pro $x \in (-1, 1]$. Protože je $\frac{x^{n+1}}{n+1} = \int x^n dx$, součet této řady určíme z věty o integraci mocninné řady.

Příklad

Určete součet mocninné řady

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

a tedy pro $x = 1$ také součet alternující harmonické řady.

Řešení

Tato mocninná řada konverguje pro $x \in (-1, 1]$. Protože je $\frac{x^{n+1}}{n+1} = \int x^n dx$, součet této řady určíme z věty o integraci mocninné řady.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \int x^n dx \right) = \\ &= \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \right) dx = \int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) + C, \text{ pro } x \in (-1, 1). \end{aligned}$$



Pokud se v Taylorově polynomu budou brát členy se stále vyššími derivacemi (až do nekonečna), dostaneme Taylorovu řadu příslušnou k dané funkci $f(x)$.

Definice (Taylorova a Maclaurinova řada)

Nechť $f(x)$ je funkce, která má na nějakém intervalu (obsahujícím bod x_0 jakožto vnitřní bod) derivace všech řádů. Taylorova řada se středem v bodě x_0 příslušná k funkci $f(x)$ je mocninná řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 +$$

Tzn. Taylorova řada je mocninná řada se středem v bodě x_0 a koeficienty $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

Pokud je $x_0 = 0$, potom se Taylorova řada nazývá Maclaurinovou řadou příslušnou k funkci $f(x)$.



Příklad

- Protože má funkce $f(x) = \sin x$ derivace všech řádů a hodnoty funkce $\sin x$ a jejích derivací v bodě $x_0 = 0$ jsou postupně $0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$, Maclaurinova řada pro funkci $\sin x$ je tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \dots$$

Její poloměr konvergance je $R = \infty$.

Příklad

- Protože má funkce $f(x) = \sin x$ derivace všech řádů a hodnoty funkce $\sin x$ a jejích derivací v bodě $x_0 = 0$ jsou postupně $0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$, Maclaurinova řada pro funkci $\sin x$ je tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \dots$$

Její poloměr konvergence je $R = \infty$.

- Protože má funkce $f(x) = e^x$ derivace všech řádů a hodnoty funkce e^x a jejích derivací v bodě $x_0 = 0$ jsou všechny rovny 1, Maclaurinova řada pro funkci e^x je tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{4!} x^4 + \frac{1}{5!} x^5 + \dots$$

Její poloměr konvergence je $R = \infty$.



Příklad

Funkce

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{pro } x \neq 0, \\ 0, & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

je spojitá a má derivace všech řádů na celém \mathbb{R} . V bodě $x_0 = 0$ toto lze ukázat pomocí výpočtu jednostranných derivací $f'_-(0)$ a $f'_+(0)$, $f''_-(0)$ a $f''_+(0)$. Zejména jsou všechny tyto derivace v bodě $x_0 = 0$ rovny 0. Tedy příslušná Maclaurinova řada je tvaru

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 + 0 \cdot x + \frac{0}{2} x^2 + \frac{0}{3!} x^3 + \cdots = 0.$$

Tedy jedná se o nulovou řadu, která samozřejmě konverguje pro všechna $x \in \mathbb{R}$ k nulové funkci $s(x) \equiv 0$, která není rovna původní funkci $f(x)$.

Otázku, kdy Taylorova (Maclaurinova) řada funkce $f(x)$ konverguje k funkci $f(x)$, zodpovídá následující tvrzení, které je bezprostředním důsledkem obdobné věty o Taylorově polynomu.

Věta (o konvergenci Taylorovy řady)

- ① Taylorova řada funkce $f(x)$ konverguje na svém konvergenčním intervalu I k funkci $f(x)$, tj. platí rovnost

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \text{pro všechna } x \in I,$$

$$\Leftrightarrow \text{pro posloupnost Taylorových zbytků } \{R_n(x)\}_{n=0}^{\infty} \text{ platí} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \text{pro všechna } x \in I.$$

Otázku, kdy Taylorova (Maclaurinova) řada funkce $f(x)$ konverguje k funkci $f(x)$, zodpovídá následující tvrzení, které je bezprostředním důsledkem obdobné věty o Taylorově polynomu.

Věta (o konvergenci Taylorovy řady)

- 1 Taylorova řada funkce $f(x)$ konverguje na svém konvergenčním intervalu I k funkci $f(x)$, tj. platí rovnost

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \text{pro všechna } x \in I,$$

\Leftrightarrow pro posloupnost Taylorových zbytků $\{R_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ platí $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ pro všechna $x \in I$.

- 2 Zejména, pokud jsou všechny derivace $f^{(n)}(x)$ stejně ohraničené na intervalu I , potom Taylorova řada konverguje k $f(x)$.

Maclaurinovy řady elementárních funkcí

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}.$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n \quad \text{pro } x \in (-1, 1].$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{pro } x \in (-1, 1).$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{pro } x \in (-1, 1).$$