

IV107 Bioinformatika I

Přednáška 2

Katedra informačních technologií
Masarykova Univerzita Brno

Jaro 2011



Před týdnem

Bioinformatika

- ▶ zpracování hromadných molekulárně–biologických dat
- ▶ posledních cca. 30 let
- ▶ data: genomika a proteomika
 - ▶ sekvence
 - ▶ struktury
 - ▶ interakce a jiné funkce
 - ▶ expresní data
- ▶ anotace cca 1000 prokaryotických genomů
(<http://www.cbs.dtu.dk/services/GenomeAtlas/>)
- ▶ Galerie sekvenovaných genomů
(<http://www.genomenewsnetwork.org/>)




<http://www.dnaftb.org/dnaftb/>

- ▶ Klasická genetika
- ▶ Genetické molekuly
- ▶ Organizace a řízení genetických procesů
- ▶ Princip rakoviny

<http://www.dnalc.org/home.html>



Hierarchie biologických struktur



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Kořeny genetiky

Gregor J. Mendel

V pokusech s rostlinami si všiml, že potomství dvou rodičů nezávisí na jejich vzhledu **/fenotyp/**, nýbrž na jakýchsi symbolicky popsaných faktorech, které do značné míry odpovídají dnešnímu označení gen **/genotyp/**








Molekula DNA

- ▶ Objevena 1869 , považována za příliš jednoduchou
- ▶ Polymerická molekula, monomerem je:
 - ▶ deoxyribonukleotid /DNA/
 - ▶ ribonukleotid /RNA/
- ▶ Symbolické značení A,C,G,T,U
- ▶ Spirálovitá prostorová struktura



Nukleotidy



Zastoupení nukleotidů v různých organismech


| Organizmus | %A | %G | %C | %T | $\frac{A+G}{T+C}$ | $\frac{A+T}{G+C}$ |
|--------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| E.coli | 24.7 | 26.0 | 25.7 | 23.6 | 1.03 | 0.93 |
| S.lutea | 13.4 | 37.1 | 37.1 | 12.4 | 1.04 | 0.35 |
| S.cerevisiae | 31.3 | 18.7 | 17.1 | 32.9 | 1.09 | 1.79 |
| H.sapiens | 30.9 | 19.9 | 19.8 | 29.4 | 1.00 | 1.52 |

Dedukce: Nukleotidy se vyskytují v párech

From A.L.Lehninger (1970), Biochemistry, Worth Publishers, New York



Difrakce na molekule DNA



Difrakce krystalické DNA z roku 1952 od Rosalind Franklin
Svědčí o periodicitě 0.3nm a 3.4nm



Struktura DNA




Tento obrázek a jedna stránka textu pomohli autorům k Nobelově ceně. Přínos Rosalind Franklin ve formě pečlivého zkoumání krystalů v té chvíli oceněn nebyl.




Poštovní známka k 50. výročí objevení struktury DNA

Struktura DNA



Struktura DNA



Uspořádání DNA v jádře

| Uspořádání | Počet nukleotidů | Relativní délka k jádru |
|------------|------------------|-------------------------|
| Lineární | 10000 | 600000 |
| Plošné | 25 mil | 240 |
| Prostorové | 62.5 mld | 0.1 |

Prostorové uspořádání DNA se 12000000 nukleotidy v jádře o rozměrech 0.0034 mm (rozměry jednoho páru nukleotidů dle modelu Watsona a Cricka jsou $1.36 \times 0.34\text{nm}$).



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů


Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Základní pravidla

- ▶ DNA → RNA → protein
 - ▶ retroviry: RNA → DNA
- ▶ jeden gen → jeden protein
 - ▶ RNA geny kódují RNA
 - ▶ alternativní sestřih umožňuje tvorbu několika proteinů
 - ▶ post-translační modifikace umožňují vznik různých forem jednoho typu proteinu



Exprese genů



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů


Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Replikace DNA

| | |
|---------------|--------------------------|
| Hlavní enzymy | helikáza, DNA polymeráza |
| Templát | DNA |
| Substrát | deoxyribonukleotidy |
| Produkt | DNA |



Replikace DNA



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů


Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Transkripce

| | |
|---------------|---------------------|
| Hlavní enzymy | RNA polymeráza |
| Templát | DNA |
| Substrát | deoxyribonukleotidy |
| Produkt | DNA |



Transkripce přenáší část genetické informace z DNA na mobilní mRNA



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů





Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Translace


| | |
|---------------|-----------------------------|
| Hlavní enzymy | ribozom |
| Templát | RNA |
| Substrát | aminokyseliny |
| Produkt | protein (bílkovina, peptid) |





Translace probíhá na ribozomech



Triplety nukleotidů kódují jednotlivé aminokyseliny



Kód sprostředkovává tRNA



Kontrolní otázky

1. DNA určitého organizmu obsahuje 17% tymínu (T). Jaký je obsah cytozínu (C)?
2. Jaká je komplementární sekvence k sekvenci 5'-ACGT-3'? Co je na těchto sekvencích zajímavé? Jaké vlastnosti by mohl mít protein, který se váže na DNA s takovou sekvencí?



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Struktura proteinů

| | |
|------------|---|
| Primární | sekvence aminokyselin |
| Sekundární | hlavně α -helix a β -struktura |
| Terciární | 3-D uspořádání |
| Domény | jedna nebo víc na protein |
| Kvartérní | komplexy skládající se z více podjednotek |




Skládání proteinů a druhý kód

Mnoho čerstvě syntetizovaných proteinů se poskládá do své finální podoby bez pomoci dalších faktorů.


- ▶ demonstrováno na konkrétním proteinu (Anfinsen, 1966, ribonukleáza A)
- ▶ terciární struktura je zakódována v primární struktuře (kód dodnes neobjeven!)



Protein folding





Fyzikálně–chemické vlastnosti aminokyselin



Amino Acids

- A alanine (ala)
- R arginine (arg)
- N asparagine (asn)
- D aspartic acid (asp)
- C cysteine (cys)
- Q glutamine (gln)
- E glutamic acid (glu)
- G glycine (gly)
- H histidine (his)
- I isoleucine (ile)
- L leucine (leu)
- K lysine (lys)
- M methionine (met)
- F phenylalanine (phe)
- P proline (pro)
- S serine (ser)
- T threonine (thr)
- W tryptophan (trp)
- Y tyrosine (tyr)

Aminokyseliny můžou být vůči sobě různě orientovány





Torzní úhly: ϕ, ψ, ω

cis ($\omega = 0^\circ$)
trans ($\omega = 180^\circ$)



Ramachandranův diagram




α -helix




(A)





(B)




β -skládaný list




Otočky nebo smyčky (angl. turns)




Disulfidický (cysteinový) mostík




Zobrazení 3-D struktury proteinu




wire-frame



ball and stick




space-filling



surface




C_α representation



α/β schematic

Kvarterní struktura hemoglobinu




Dílčí funkce proteinů


- ▶ Enzymy
 - ▶ katalyzátory znižují energetický práh reakcí
 - ▶ substrát se proměňuje v produkt
 - ▶ aktivní místo
- ▶ Interakce protein-protein
- ▶ Interakce protein-DNA
- ▶ Interakce protein-ligand
- ▶ Transdukce signálu, regulace
- ▶ Strukturní proteiny (vlákna, glykoproteiny)
- ▶ Transportní
- ▶ Póry a kanály
- ▶ Pumpy
- ▶ Motory



Motory




ATPáza




(b)

Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.


Kanál umožňuje iónům proniknout membránou



Receptor cyklického AMP (dimer a DNA)



Prion ve formě PrP^c a PrP^{Sc}



Příště

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky



Outline

Dodatek



For Further Reading

Projekt SIMAP

<http://www.czechnationalteam.cz/view.php?nazevclanku=simap&cisloclanku=2007020002>

http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/321214

